





HARVARD
MEDICAL LIBRARY



IN THE
Francis A. Countway
Library of Medicine
BOSTON



Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

EPITOMES

Omniū Galeni

PERGAMENI OPER

RVM, VNIVERSAM IL-

LIVS VIRI DOCTRINAM,

& methodū, quā accu-

ratissimè continētis,

SECTIO QVARTA.

PER ANDREAM LACVNAM

Secobiensem, Doctorem Medicum, atq; ex sacro

Militum Sancti Petri apud Urbem collegio,

Auratum Equitem, summa fide

atq; studio collecta.

CAVTVMEST PONTIFICIA, CÆSAREA,

& Christianissimi Regis, Augustissimiq; Senatus

Veneti autoritate & decreto, ne quis impunè

hoc opus aut cudat, aut ab alio excusum,

quā à Hieronymo Scoto,

exponat venale.

VENETIIS M D XLVIII

Ex Libris Doct. Philippi Festari

EPITOME

Omnia Opera

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

SECTIO QVARTA

PER ANDREAM LACINAM

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

CAVTVM EST PONTIFICIS CENSURA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

PERCAMINI OPERA

VENETIIS M D XLVIII

ILLVSTRISSIMO ET REVEREN-
 disimo D. D. Petro Pacheco, Gienensi Episcopo,
 atq; S. R. Ecclesiæ Senatori Vigilantissi-
 mo, Andreas Lacuna, Secobiensis,
 Doctor Medicus, Miles San-
 cti Petri. S. P. D.



I VT corpus erectum sortitur
 homo, sic animum ad sublimia
 erigeret, ne utiquā caducarum (ut
 solet) rerum, teneretur admira-
 tione, Pater Obseruandiss. sed per
 petuò & Diuina suspiceret, et as-
 siduè in eorum exerceretur medi-
 tatione. Cæterum quum ita sit natura cõparatum mor-
 talibus, ut pars quidem uicti, ac ueluti captiui ducti à
 suis cupiditatibus, illis tantum inferuiant: pars autem,
 adeò ignaui, stupidiq; sint, ut animam habeant, nec ne,
 ignorent penitus: contingit sanè, ut per pauci eorum sur-
 sum aspicere queant (lux enim lippos maximè offēdit)
 Sed omnes ferè humi serpāt, instar crocodilorum. Id quod
 certè est in causa, ut si quādo uideant canem transilientē
 per circulum, aut tripudiantē simiam, aut deniq; fœdissi-
 mum Scythā supra funem saltātem, uniuersi, sui ipsorū
 obliti, confertim ad id genus spectacula cõfluant: atq; ea
 quidem admirentur stupefacti: negligent autem & asper-
 nētur cõditoris illius nostri opera: quæ si, ut decet, expē-
 derentur, omnium spectatorum animos in maximā admi-
 rationem sui, cõmendationemq; cõuerterent. Nam ut im-
 præsentiarū præteream ordinatas illas orbium cœlestiū

lationes, constātissimos ortus syderum, uicissitudines tēporum, animaliumq; generationes & incrementa, quæ captum humanū superāt: de ijs autem differam, quæ indies calcantur pedibus: quid obsecro admirabilius possit unq̃ contingere, q̃ ex erucæ, nasturtij, aut alio uix perceptibili semine, oriri herbam bicubitalem? ex nucleoq; aliquo exiguo, nasci prodigiosæ magnitudinis arborē? Etenim postea q̃ semē in terram, ueluti in matricem quandā, coniectum est, attracti humoris copia intumescit, intumescensq; rūpitur, ac duo de se emittit germina: unum quidem, quo terræ adhæret, ab eaq; sibi alimentū sugit: quæ est radix: alterum uerò, quod solem uersus, à quo uiuificatur, erumpens, ab uno caudice in uarios tādē ramos diuasicatur. Atq; hic sanè plantarum est ortus: quas quidem uniuerſi Philosophi & Medici, animatas esse dixerunt, neq; id iniuria: q̃ nimirum animantium ritu gignātur, crescant, uiuant, atq; senio absumantur. Primò si quidem sunt molliusculæ, ductilesq; & tractabiles, ut infantes. Dein processu tēporis adoleſcunt, suisq; articulis roborantur. Postea uerò iam consistentes, ubi crescere destiterunt, & renituntur trahenti, & solida fructuum ubertate pinguescunt: donec tandem concedentes naturæ, hominum instar senescunt, atq; fatiscentes dehiscunt. Reperitur etiam, ut in animalium generibus, sic sexus uterq; in stirpibus. Discernitur autem à fœmina masculus, q̃ folia huius prius germinent, folijsq; fœminæ sint minora. Quòd si masculus adeò coniunctus sit fœminæ, ut folijs mutuò sese contingāt: aut si ex flagrantia masculi portio aliqua ad fœminā, uentorum beneficio, puenerit, ipsius

foeminae fructus cito ad maturitatē perueniunt. Sunt au-
tem stirpes ut cæteris rebus omnibus longē amœniores
et iucundiores uisu, sic earum usus mortalium uitæ mul-
tis numeris necessarius: utpote à quibus non modò alimē-
ta ipsa, sed etiam medicamenta, quibus utimur ad profligandos morbos, multaq; alia pertinētia ad uitæ cōmodi-
tatem perficiuntur. Vnde nō immeritò Marcus Curius,
Lucius Quintius Cincinnatus, Marcus Valerius Corui-
nus, Cyrus Persarum Rex, alijq; Viri grauissimi, allecti
plantarum amœnitate, plurimum agriculturæ indulse-
runt. Quum igitur undecim cōmentarios Galeni de uiri-
bus medicamentorū simplicium: septem, de compositione
pharmacorum secundum genera: ac deniq; decem alios de
compositione medicaminum iuxta singulas nostri corpo-
ris partes (in quibus non modò uniuersæ dotes, ac facul-
tates plantarum, sed uaria etiam morborum genera, eo-
rumq; absolutæ curationes exaggerantur) superioribus
diebus ad Græcorū exemplarium fidem restituissem, re-
stitutosq; cōtraxissem in methodū ut breuiorem, sic mul-
to studiosis aptiorē, statui equidem hos ipsos uigintiocto
cōmentarios, Naturæ thesauros quosdā opulētissimos,
tibi, Antistes Reuerendissime, nuncupare: idq; non ut ex
hac ipsa dedicatione aliquid splendoris accederet tuæ Cel-
situdini, quæ iam pridem ob insignem prudētiā, uariā
eruditionem, raram incredibilemq; Clementiā, ac deniq;
summam pietatem, conciliauit sibi omnium bonorū ani-
mos, atq; extra omnē ingenij aleam est posita: sed ut tui
nominis fulgore illustrati, inirēt multo maiorem gratiā
eruditorum hominū: sub tuoq; patrocinio, ueluti sub cly

peo Aiacis, delitescentes, non tam facile impeterentur à
uirulentis quorundā morsibus, quibus alienæ samæ de=
trahere, & exercitium, & summa uoluptas est. Siquidē
quum olim summi Imperatores & Principes, aduersus
impedentes fluctus & tempestates fortunæ, cōmuniren=
tur literis: nūc ingenuæ artes et disciplinæ, ut tutò pro=
dire possint (Proh dolor) fautoribus & Mecœnatibus
egent. Cæterum si. T. C. hæc nostras lucubrationes de=
fendendas suscepit, nulla inuidia, aut calumnia, in nos
quicq̃ moliri poterit. Quod si quæ barbarorum ac sophi=
starum cohors (hi nāq; præcipui sunt, infestissimiq; bona=
rum disciplinarū hostes) accedat propius, ut facessat no=
bis negotium, cōfestim in pedes se conferet, uel solius no=
minis tui fulmine perterrefacta. Adeò siquidē heroicas
illas ac nondum satis laudatas Virtutes tuas, quadam se=
ueritate, grauitateq; prudentissima adornas (quod pas=
sim de te omnes prædicant) ut non minus tetrīs ac flagi=
tiosis hominibus, terrori ac formidini sis, q̃ ingenuis om=
nibus admirationi. Quibus quidē rebus adductus Diuus
Carolus. V. Imperator, Tridentinæ synodo te unū inter
alios omneis præfecit, ut singulari sapientia tua, Eccle=
siæ causam tuereris: sibi nimirum persuadens, te præsen=
te, nihil transactum iri, quod non pium, non æquum, non
sanctum, non deniq; uniuersæ Christianæ Reip. maxime
salutare futurum esset. Quam prouinciam adeò alacri=
ter suscepisti: eaq; fide et pietate suā pacem, religionemq;
Ecclesiæ restituendam curasti, ut. S. D. N. P. III. P. M.
te inter Purpuratos illos Patres censuerit tandem annu=
merandum: sentiens haud dubie se non minus accessu tuo

illustraturum Senatum illum Patrum Amplissimorum:
q̄ exornaturum Amplitudinem tuā tam splendida, tãq;
iusta pietatis tuæ, atq; integritatis corona. Quocirca Il-
lustrissimi illi, Reuerendissimiq; om̄es collegæ tui, su-
mo desyderio tenentur uisendæ tuæ Celsitudinis, in eaq;
suos pascēdi oculos: sed inter om̄neis præcipuē Illustris-
simus et Reuerendissimus D. D. Franciscus à Bouadilla
& Mendoza, Cardinalis Cauriēsis. meusq; Mæcenas
maximus. Qui quidem tuarum uirtutū præco, ut est stu-
diosissimus tui, iam uellet ut moram rumperes, quo lice-
ret sibi ac cæteris frui isto cōspectu tuo, splendoreq; illis
tam exoptato. Cui nec potuissē equidem (quod certò
scio) rem unq̄ gratiorem facere, q̄ si hosce labores meos,
futuros ceu testimonium quoddam arctissimæ illius ne-
cessitudinis, quam inter uos mutuò alitis, consecrarē tuo
numini: nec poterit Tua Celsitudo, q̄ si ipsos singulari
suo patrocinio dignetur. Deus, Op. M. Amplitudinem
istam tuam, Antistes Obseruandis. diu nobis q̄ florētis-
simam seruet, ut tum pietas, tum religio, tum bonarum
literarum studia, sub tali coryphæo & protectore inua-
lescant. Vale. Venetijs. Ex ædibus Illustrissimi &
Sapientissimi Viri, D. D. Ioannis Furtadi à Men-
dozza, in hac Rep. Oratoris Cæsarei
Vigilantissimi. XV. Cal. Maias.
M. D. XLVIII.

INDEX COMMENTARIORVM

qui in hac sectione quarta habentur: nominaq;
Doctissimorum uirorum, quorum uersio=
nibus sumus usi & adiuti.



E SIMPLICIVM medica=
mentorum facultatibus, lib.
xi. Theodorico Gerardo in=
terprete. *carta. 1.*

De compositione medicamento=
rum secundum genera, lib. vii.
Ioanne Guinterio Andernaco

interprete. *7. 42.*

De compositione medicamentorum secundum partes,
lib. x. Iano Cornario interprete. *7. 309.*

De theriace ad Pisonem, lib. I. Ioanne Guinterio Ander=
naco interprete. *7. 449.*

De Antidotis. lib. II. Ioanne Guinterio Andernaco in=
terprete. *7. 465.*

De ponderibus & mensuris, libellus, Andrea Lacuna,
Secobiensi, authore. *7. 479.*

De Substitutis. 7. 33.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M M E D I C A M E N T O R V M

Facultatibus liber Primus.

C A P. I.



Edicamentorum simpliciū facultates exquisitè cognoscere, quum ad uariorū compositionem, tum ad inuentorū opportūnum usum, admodū necessariū est. Porro medicamentum omne id dicimus, quod alterare nostrā naturam potest: si-
cuti nutrimentum, quicquid substantiam augere. Refertur enim utrūq; ad aliquid. At uerò medicamētum simplex, et ipsum per oppositionem ad cōpositum nūcupatur. Estq; id quod secundum naturam suam, syncerum est. At facultas, causa quædam est effectrix: eaq; partim actu, ut calefaciendi in igne: partim potētia, siue futuro tempore: quali nimirum calefacit pyrethrum. Quum autem singulis medicamentis propria quædam effectrix facultas insit, aut purgatoria, aut uomitoria, aut alterius generis alia: nosq; alibi demonstrarimus ex calido, frigido, humido & sicco, corpora uniuersa conflare, certè facultatum effectricium essentias (de quibus neq; inter Medicos, neq; inter Philosophos conuenit) tum in alijs omnibus, tum in medicamentis, has ipsas qualitates statuemus.

Simpliciū medicamētōrū cognitio ad quid conferat.

Medicamētū quid.

Nutrimentum quid.

Medicamētū simplex quid.

Facultas quid.

Facultas ē duplex, actu. f. & potentia.

Medicamētis singulis, ppria quædam facultas inest.

Essentię facultatū sunt qualitates ex quibus corpora cōstāt

Facultatis iudi-
candæ experi-
mentū sumēdū
ēē ab ea re ad
quā dicitur.

Aqua frigida
calfacit ex ac-
cidenti ut cali-
da sepe refri-
gerat.
Calida et frigi-
da facultate, q̄
dicantur.

Examini uedi-
camētorū quid
requiratur.

Tenuiū et cras-
sarū partiū, q̄
dicant esse me-
dicamenta.

Aquā esse ad
vitā maxime
necessariam.

IN primis autem ac maximè sumendum est iudicā-
dæ facultatis experimentum, ab ea re ad quam di-
citur. Nam quam uim in homine aliquod medicamen-
tū habet, in alio animali eandem nō necessariò sortietur.
Proximum est, ut quod ex accidenti est, distinguatur ab
eo quod primariò & per se. Nam aqua frigida calorē
quādoq; reuocat, cutem refrigerando, contrahēdoq;
ad quod sanè consequitur reuocatio caloris. Rursum
calida quoq; ipsa refrigerat sæpenumero, digerēdo ex
calfacientem humorem. Quæ igitur admota corpori-
bus nostris, primariò ac p se excalfaciūt, ea sanè facul-
tate dicuntur calida: si uerò contrā, refrigerēt, frigida: nō
autē q̄ alba uel rubra sint, tali facultate sunt prædita.

C A P . III.

ETenim quod ab initio ad finem usq; dum appli-
catum est, magis semper calfacit, aut refrigerat, id
non ex accidenti, sed ex sua natura est tale. Danda au-
tem opera est, ut quodcunq; medicamen in iudicium
uocare uelis, diutius hereat applicitū, omnisq; sit alie-
næ tum frigiditatis, tum caliditatis expertus: ne natiuam
facultatem illius ascititia adulteret qualitas. Porro
quædam tota substantia in sese mutuo & agunt, et pa-
tiuntur: quædam una duntaxat, aut duabus qualitati-
bus. Ad hæc, alia quidem tenuium partium sunt: alia
crassarum: tenuium quidem, quæ faciliè in tenues com-
minui partes possunt: crassarum uerò, quæ contrā.

C A P . IIII.

SIgitur primò aquam, quæ & cōmunissima uniuer-
sis hominibus, tam sanis q̄ ægris est, & ad uitam
maximè necessaria, nec frigidam insigniter, nec cali-
dam, corpori temperato applicueris: dein ijs quæ na-
tura sint intemperata: tertio, quæ aliquo affectu tenē-
tur: temperato quidem admota, plusculo tempore om-
nino ipsum refrigerabit: intemperato uerò, citius qui-

dem refrigerabis id quod frigidius natura fuerit: tardius autem quod calidius: semper tamen refrigerabit. Quum uidelicet talis existens, nequeat reuocare calorem, quem admodum summe frigida: quæ si quadrato, aut iuuenilis corporis naturæ pauculo fuerit tempore admota, caloris molietur reuocationem. Sin aliter utaris, semper refrigerabit: id quod etiam facit admota ijs qui simplici laborant affectu. Nam ubi affectus compositus fuerit, contingit aliud primario à medicamento fieri: aliud ex accideri: ut licet cernere in phlegmone, quæ calidæ copiosæque; fluxionis est soboles. Siquidem quæ modicè excalfaciant pharmaca, dum superfluitatem euacuant, id quod affectum est, protinus frigidius efficiunt. Aqua itaque potabilis utrobique uidetur frigida: id quod non licet de ijs asserere, quæ sulfureæ, bituminosæ, atque nitrosæ existunt. Immo uerò neque marina ipsa, prius quam ascititium frigus summum acceperit, admodum refrigerare conspicitur. Ergo quæ exactè ac syncerè aqua est, omnis alterius substantiæ mistione uacans, ea necessario ex sua facultate est frigida. Si qua uerò per bituminosa, sulfurea, nitrosa, aut aluminosa loca distillās, aliquid secum eius substantiæ absterferit, mista iam ea est, non autem exactè aqua. Quod si etiam ipsi aquæ potabili igneam aut essentiam, aut qualitatem adieceris, sic etiam quodammodo compositam illam effeceris. Quinetiam aqua limosa, quali apud Ægyptum utuntur, composita quadatenus est: sed ea per fictilia uasa optimè percolata, quam purissima efficitur.

C A P. V.

Iudicatur autem aqua gustu, uisu, & olfactu. Siquidem gustu est pura, si omnis qualitatis expertus uideatur. Visu, si syncera & pellucida fuerit. Sic nec odoratu, ullam præ se ferre qualitatem debet, ut sunt quædam prauitatis extremæ, quæ aut aciditatem, aut acrimoniam, aut fædinem, aut putredinē præferunt. Igi-

Aqua summe frigida in quibus calorem reuocet.

Aqua potabilis frigida existit.

Aqua omnis syncera est natura liter frigida.

Aquæ mixtæ quæ sint.

Aqua limosa apud Ægyptum utuntur.

Aqua debet iudicari gustu uisu, & olfactu.

Elemētum pu-
rū minime re-
periri.

tur aqua, quæ absq; his est omnibus, ut ad naturā cer-
tē, ne ipsa quidē adamussim syncera fuerit, sicuti neq;
aliud ullum sensibilibium elemētorum, sed ut ad sensum
& usum, syncera est. Quæ itaq; examinanda ueniēt me-
dicamina omnia, omnis extraneę qualitatis ualentis q;
aliena sumpto. C A P. VI.

Aqua oīs dul-
cis refrigerat.
Ceratū humi-
dū ablutū fri-
gida, calidos
omneis affe-
ctus refrigerať

Quod autem omnis aqua dulcis manifestō refri-
geret, hinc discas licet, quōd si cerā oleo liqua-
ueris, humidumq; ceratum confeceris, ac postea ipsum
refrigeratum, largiori q; affusione frigide ablutum ad-
moueris, ualenter eos qui febre urunt refrigeret, si hy-
pochondrijs supponatur: necnon omnem phlegmonē,
herpetes, carbunculos, erysipelata, phygethla, & bre-
uiter omnes calidos morbos: id quod non continge-
ret illi per aliquam nuper dictarum aquarum, quæ cali-
dis aduersantur affectibus, calidæ nimium quum sint.

C A P. VII.

Aqua potabi-
lis sola est hu-
mida.

Cæterū q; aqua quoq; potabilis sola sit inter p-
positas humida, ex eadē discas methodo. Nam si
ulcera supra modum sicca, hac irriges, statim admodū
humida & mollia reddentur, quum aliæ aquæ uniuersæ
ulcera desiccant: nōnullæ q; etiam ob acrimoniam
exasperēt. Quin etiam sitiēti, dulcis aqua remedio est:
cæterę uerō, acerbiores etiam sitim relinquunt. Tum
aqua inter cutem laborantibus aduersissimū est & po-
culum & lauacrum aque dulcis. Salsarum uerō, nitro-
sarum, sulfurearum, bituminosarum q; omnium, sanē
perutile. Imitari autem potes, sicuti marinam, sic alia-
rum quamlibet, substantia uidelicet admista, quæ in
quaq; uincere cernitur.

C A P. VIII.

Aquę natura.

Aquā summe
humectare.

Aquę igitur propria natura humida & frigida est.
Cæterū summē quidem humectat, siue tepida,
siue temperata ea sit: non autem calfacit summē, nisi
quę extremē ferueat. Quōd si corpus aliquod eucratū,

calida moderatè perfundas, in ipso quidem pfusionis tēpore, calidius simul, atq; humidius efficies: paulo uerò post, id seipso euadere frigidius, non tamen siccus, conspicias. Nam tātē si humores qui in uasis, alijsq; cōmunibus spatijs sunt, per id genus perfusiones, uniuersi exauriant, ipsa tamen uasorum corpora, & uniuersum genus carnosum seipso humidius redditur. Quale exēplum, quāuis ratione diuersa, licet uidere in senibus: qui quum genuinas partes, q̄p̄ adolēcentes, magis siccās fortiantur, pluribus tamen excrementis redundant. Hanc itaq; humectandi uim solam, nūq̄ aqua deponit. Neq; enim siue feruens sit, siue etiam extremē frigida, partem cui affusa fuerit, sicciorē efficit: quāq̄ ob euaporationem quē à calida perfusione excitari solet, perfusa particula nonnullis longē siccior uideatur, quum p̄sertim uapor, humor sit extenuatus.

Aqua semper humectat.

Senes p̄tibus quidem solidis sunt sicci, excrementorū autem copia humidi.

Vapor humor ē extenuatus.

CAP. IX.

NEc uerò usq; adeo absurdum fuerit, quod facile in ignem uertitur, id calidum facultate putare. Vnum quippe ex ijs quæ facultate talia dicuntur, est id quod ex propria eius quod dicitur materia, tale est facultate. Vt si quid facile in ignem uertitur, id non actu, sed facultate est ignis. Nam hoc quod est facultate, ex aduerso ei diuiditur, quod est actu: sicuti & quod est p̄ se, huic quod ex accidenti contingit.

Ignis potentia est, quod facile in ignē uertit. Facultate aliquid, ex aduerso dicitur et quod actu.

CAP. X.

AT quibus consilium est, tutò à rebus extraneis, ad corpora transire animalium, uidere primum debent, an tenuis sit essentia, an crassa, quod explorandum uenit. Secundò, an sibi continuum, densumq; ac solidum: an interuallis interceptum, an rarum.

CAP. XI.

EOrum autem quæ in confesso est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos calfacere, prius q̄p̄ in tenuia sit cōminutum. Nam si quis piper integrū

Calida potestate, ut nos calfacere possint, debent prius in tenuia comminui.

cuti inspergat, nullam planè caliditatem percipiet: si uerò pollinis instar cuti inspergatur aut linguæ, excalescet utiq; ac potissimum si fricueris. Quare multa quidem facultate sunt calida, facileq; in ignem ueruntur, quæ nos tamen haud facile excalescunt. Ignis siquidè, ut qui omnium tenuissimus & calidissimus sit, minimo negotio penetrat illa, atq; uincit. Nostra autem caliditas, præter q̃ quod crassæ est essentiæ, halituosaq; adeo existit infirma, ut ægrè quod contingit permutet.

Piper calfacit. Ignis omnium tenuissimus & calidissimus ē, ob idq; facile penetrat.

Caliditas nostra crassæ est essentiæ.

Calfacientia corpus, ab eo initiū caloris assumere.

Quare nihil eorum quæ calfacere nos uidentur, perinde ut ignis calfacere potest, sed tanquam materia quæ accenditur facilè. Siquidem mutationis principium à nostra caliditate accipiētia, ut calami aridi ab igne, nos contra recalfaciunt, & ueluti partes fiunt quædam natui caloris: ut ignis illi. Quare mirandū nō est, si quædam medicamenta primè q̃dem mutationis principium à nostro calore nacta, inde iam pergāt, eum quoq; qui mutabat, uincere & superare.

C A P. XII.

PORRò cutis omnis in primo statim ortu sibi continua quum sit, tēporis spatio pertunditur, sic ut uniuersum corpus fiat perspirabile, arteriæq; ipsæ (quæ in cutis meatus, quemadmodum uenæ, aperiūtur) unde quaq; se dilatantes, per poros attrahant, non aerem modò, halitumq; sed quicquid etiā trahi facilè potest, ac præ tenuitate sua, motum ipsius spiritus consequi. Quam obrem quicquid piperis ad exactissimum fuerit redactum pollinem, uerisimile est, simul cum ambiente aere, ab ipsis arterijs attrahi, protinusq; à calore natiuo alterari, idq; tum ob paruitatem, tum ob ingenitam ut à calore alteretur aptitudinem. Quod quidem si semel illi insit, per totum corpus, temporis progressu, perlatum, ipsum recalfaciet: prius tamen calfaciens sibi proximiores particulas. Vnde liquet, crassorū nullum, prius q̃ ad unguem comminuatur, neq; ipsum à

Corpus uniuersum esse trāspirabile.

Medicamenta oīa quo pacto ī corpore suas uires exercent.

nostro corpore quicquā perpeti, nec rursus in nos posse agere. Quod uerò in pipere adduximus, exēplum idē licet ad alia transferas, siue ea calefaciendi, siue etiam refrigerandi facultatem sortiantur.

CAP. XIII.

Consyderandum autem est, non solū crassarū ne sit partium, an tenuium, explorandorum medicamentorum substantia. uerū etiam rara ne an spissa, densaue. Voco sanē rarā, cuius partes inanibus spatijs sunt interceptę. Vbi igitur spatijs eiusmodi multis, quę plena semper sunt aere, corpus fuerit distinctum, facilius q̄ spissum accenditur; etiam si calidius illo non fuerit. Nam qui in ijs spatijs continetur aer, primo statim ignis occurſu accenditur, atque inflammatur (aer enim accensus est flamma, quemadmodum terra, carbo) unā uerò secū corpus uniuersum accēdit. Sic itaq̄ calamos aridos ignis exurit celeriter, tametsi minus alia substantia calidos, idq̄ ob meatuum multitudinē, quos prius aer occupabat, quorum argumentum sumum, calamorum leuitas est. Nam siccum natura corpus, leue esse alioqui non posset. Quęcunq̄ autem fistulosa sunt, multumq̄ uacui obtinent, pondere existunt leuia. At calamus à nostro corpore ægre calſieri potest, q̄ essentia sit crassa. Si igitur alicuius medicamenti substantia tenuis sit & continua, eandem in nos naturam ostēdet, quam prius in ignem; sin autem rara sit & crassa, fieri poterit, ut ab igne quidem alteretur per facile, non tamen à calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

CAP. XIII.

Quamuis aqua ipsa tenuis substantia sit, non tamen ob id ex sua natura nos calfacit, nec proprium est ignis nutrimentum, sed potius extinguit illum, ut quod illi sit aduersissimum. Nec mirum si cum igne tum calidissimo, tum siccissimo pugnet aqua, fri

Rara quę sint,
Rara q̄ spissa
cur accendant
facilius.

Flāma est aer
accensus
Carbo est terra
succensa.

Fistulosa oīa
sunt leuia.

Aqua igni ad-
uersissima, ni-
mirum frigida
& humida.

Oleum cur ob
scure nos cal-
faciat.

Aqua feruens
simul cū oleo,
citius q̄ illud
absumitur.

Calfaciēs actū
et potētia, unū
quodq̄ dupli-
citer dicitur.

Concreſcentia
in glaciē faci-
lius, tēperamē-
ti ſunt frigidio-
ris, ſi vtrobiq̄
eadē conſisten-
tia inſit.

Tenuia corpo-
ra prōpte inca-
leſcūt, atque re-
frigerantur.

Ignis non con-
gelatur.

gida & humida exiſtens. Porro oleum, tametſi in flam-
mam uertatur facile, non tamen admodum celeriter,
nec manifeſtē nos calfacit, ob lentorem ſubſtātiæ, quo
tenaciter inhæret ijs, quæ ſemel contigit: neq̄ ab am-
biente facile aut extenuari, aut augeri ualēs, nec prom-
ptē intus in corpus tranſumi. Aqua uerò, & celerrimē
in halitum ſoluitur, & expedite digeritur. Quod ſi in
idem uas coniectam aquam, oleumq̄ decoquas, prior
aqua abſumetur. C A P. XV.

V T autem calfacientium, aliud eſt ſimpliciter cali-
dum, ut ignis; aliud exuperātia, ut qui in nobis eſt
calor: ſic eorum quæ facultate ſunt calida, aliud quidē
ad id qđ primò & abſolutē eſt calidū: aliud uero ad id
qđ per exuperantiā refertur. Non ergo quod citius ac-
cendit, protinus ad nos ſimpliciter apparet calidius.

C A P. XVI.

S Ed neq̄ citra limitationem, ex eo qđ aliquid in gla-
ciem cogatur, debemus frigidum eſſe colligere.
Nam in ijs quæ eandem habent aut tenuitatē aut craſ-
ſitudinem conſiſtentiæ, quod ocuſus à frigore conge-
latur, temperamenti eſt frigidioris. Si uerū alterum ſit
tenuius, puta exempli gratia, uinum: alterum craſſius,
ut oleum: non eſt neceſſe aut citius, aut magis concre-
ſcere quod eſt frigidius: niſi frigiditatis exceſſus, q̄ huic
ineſt, exceſſum craſſitudinis, quæ ineſt alteri, ſuperet.

C A P. XVII.

E St autem refrigerari, frigidam qualitatem recipe-
re: at congelari, dureſcere eſt præ frigore. Quæ-
cunq̄ igitur corpora tenuis eſſentiæ ſunt, promptē tū
incaleſcunt, tum refrigerantur: at non æquē congelan-
tur: ut aer, & ignis. Nam hic planē non congelatur: il-
le autem, nempe aer, non perinde ut uitrum, pix, cera,
refina & bitumē: cuius quidem, tametſi calidiſſimum
ſit, terrenitas tamen craſſitiesq̄, ad congelationis cele-
ritatem adiuuat. Porro aquam quæ celeriter & incale-

sceret, & refrigeraretur, meritò leuissimā esse dixit Hipocrates. Nam quanto tenuior fuerit, tātò pati erit pròptior. Atqui quæ tenuior est, minimum habet limi ter restris. Non ergo absolutè ex materiæ passionibus ad ignē, conijcere eius ad nos facultatem oportet: quum multò securius sit hoc iudicium, quo ad nostrum corpus quippiam examinamus. Quòd lac simile nō sit, nec undequaq; sibi simile, coagulatio indicat, qua sero sæ partes à caseosis facilè separantur. In uniuersis etiā liquoribus, qui à fructibus exprimuntur, crassum defertur quippiam, quod spatio temporis subsidet: uocaturq; sæx in uino; in oleo autem amurca. In aceto uerò est eiusmodi quipiam: ac forsan ipsum est, quod caloris est particeps. Nam quod frigoris, id quod tenue est. At acetum maiori ex parte frigidius est, q̃ calidius.

CAP. XVIII.

Perperam igitur faciunt, qui usq; adeò calidum esse acetum pronunciant, ut cauterio illud assimilent: quum tamen nec tantam sensu percipiamus in aceto caliditatem, nec ipsum crustas, instar cauterij, excitet. Constat siquidem ubi per cauteria consilium est, sanguinem sistere, crustam relinqui haud exiguam, quæ ueluti operculum sit corporibus sanguinem profundentibus. Ac proinde illis cauteria planè candentia applicamus: quæ haud quidem q̃ calfaciant, sed q̃ urant, atq; subiectis partibus operculum, quā Græci uocant escharam, relinquant, fluentem sanguinē supprimunt. Itaq; acetum, haud perinde ut crusta facientia medicamenta, sed potius ut astringentia citra crustam, sanguinis fluores cohibet: qua ratione non exalfacere, sed refrigerare potius ipsum existimandum est.

CAP. XIX.

Si uerò idiotam aut plebeium aliquem (nam horum in istiusmodi rebus icorruptum est iudiciū, q̃a nuli dogmati seruiliter sunt addicti) temperato aceto ex

Aqua q̃ dicat leuissima.

Lac non esse simile.

Sæx.

Amurca.

Acetum maiori ex parte frigidius q̃ calidius, existit.

Cauteria sanguinem supprimunt, q̃ relinquant escharā.

Acetū qua ratione fluentē sanguinē sistat.

Idiotarū iudicium cur incorruptum.

spongia fouerimus, dein autē interrogauerimus, nūc calorem an frigus percipiat, fatebitur quidē se, primò sanē frigus percipere: postea autem, nempe spōgia sublata, sensim nascentis in parte quādam caloris phantasiā sentire. Vnde perspicuum est, omnino quidem frigidum esse acetum, obrinere tamen quendam calorem, qui acrimoniæ ratione per accidens successu temporis corpora calfacit: nisi fortē ubi laxus ac doloris expers tumor infestat. Si quis etiam illo ab illata thapsia utat, ardor aceto restinguitur: nō quod acrimoniam & mordacitatem obtundat, ut oleum atque rosaceū, sed quod euidenter refrigeret. Quare nisi molesta facultatis asperitas illi ineller, non alio utendum ad refrigerationem foret.

C A P. XX.

Acetū est frigidum, quod quod caloris particeps

Acetū ardorē a thapsia excitatū, sua refrigeratione restinguit.

Aceti tēperaturam non lōge a media distat

QUum autē alij ob acrimoniā ipsius, calidissimū esse acetum contendant: alij contra, maximē frigidum, quod putent ipsum grumos cōstringendo dissoluere, uerisimile est, id iuxta mediū consistere. Quippe si longē ab extremorum utroque distaret, nō tanta incideret de facultate ipsius controuersia.

C A P. XXI.

Neutra dici tripliciter.

Acetū quā ratione dicat neutrum
Rosaceū quā ratione dicat neutrum.

QUia uerò quæ neutra sunt, dicuntur tripliciter, secundum diuisionem Herophili, partim amborum extremorum participatione: partim neutrius: partim nunc illius, nunc huius: mihi sanē tum acetum, tum etiam rosaceū, utriusque extremi necessitudine, esse neutra uidentur: & quod nunc quidem sensibilibiter calface re, nunc refrigerare cernantur.

C A P. XXII.

Aeris tenuitas unde iudicetur.

Ignē oēm non esse tenuem.

QUod uerò ad aerem spectat, iudicatur eius tenuitas, ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Ceterum si ea ratione ignis sit tenuis, haud omnis ignis tenuis existimabitur, quum æs & ferrum fiat ignis, non tamen quod antea tenuius. At flammæ, quum aliud sint ignis genus, re uera tenues existunt. Quocirca non om-

nis ignis est tenuis, nec quicquid tenue, protinus & ignis fuerit. Nam pruna ignis quidem est & non tenuis: & aer tenuus, uerum non ignis.

Tenuia oia nō esse ignem.

C A P. XXIII.

Quocirca minimè concedendum arbitror, acetum, quod mordax & tenue sit, calidum continuo esse. Nec enim quicquid mordax fuerit, id & calidum est: foris uerò, nec quicquid mordax fuerit, & tenue.

Mordacia oia non eē calida.

C A P. XXIII.

Eorum igitur medicamentorum quæ uehementer aut refrigerant, aut calfaciunt, non sunt facultates ambiguæ. Verum ea de quibus dubitare cōtingit, neutra omnino esse, necesse est. Pleraque autem, ut ad sensum simplicia, expugnātibz facultatibus constant: ob quas quidem fieri potest, ut acetum uim illam obscure calfaciendi, quam ostendit, sortiatur, existens alioqui tenue, refrigeratorium, atque exiccatorium medicamentū. Etenim quidam efflorescere rubor in partibus ab acetō irritatis conspicitur.

Neutra eē de quibus dubitari cōtingit.

Aceti facultas

C A P. XXV.

Ceterum non sat est generaliter uires medicamentorum cognoscere, quod hoc uidelicet calfaciat, illud autem refrigeret, nisi etiam ipsarum facultatum excessus & gradus, accuratissimè didicerimus. In qua quidem cognitione, tum artificialis simplicium usus est constitutus, tum ratione proficiscens ac methodo compositio; ipsorumque compositorum recta usui accommodatio.

Facultatū medicamentorū excessus & gradus discendos esse.

C A P. XXVI.

Perperam autem superioris seculi homines à compositis orsi medicamentis, eorum quæ in illa ingrediuntur medicamentorum simplicium uires diiudicabant. Quum non liceat rectè composita ipsa cognoscere, prius quam simplicia sigillatim examinerimus.

Cōposita cognosci nō posse, simplicibus ignoratis.

C A P. XXVII.

Atque hi quidem, quum citra iudiciū simpliciterque

compositis omnibus facultatibus fidem habent, uel Empiricis ipsis reprehensionis locum & occasionem exhibent.

C A P. XXVIII.

Sensus cur nō sint cōtēnendī. **Q**uum autem non aliunde ignem calidum esse, ac glaciem frigidam cognoscamus, q̄ ex sensu ipso, omnino stupidi sunt, qui sensus esse contemnendos existimant.

C A P. XXIX.

Oxycrati vires.

Aquā ab aceto deduci per vniuersum corpus.

Aqua vino p̄mixta, q̄ sola, cur efficacius restingat sitim

Porrò æstiuo tempore oxycrati potu, quidam plānē refrigerantur, atq; sitis expertes permanent. At nondum constat, an id aceti causa contingat. Dixerit tamē aliquis, aquam, tardioris distributionis quum sit, ab aceto, tanq̄ uehiculo, duci digeriq; in uniuersas partes. Sic etiam si cum uino bibatur aqua, sitim efficacius extingui, q̄ si sola. Refrigerationē itaq; sitisq; sanationem ab aqua prouenire, ut quæ frigidæ humidæq; naturæ sit: cæterū ad miniculo esse, ac ueluti alas illi ad omnes corporis partes permeandas, tum uinum, tū acetum: quæ ipsa nequaq̄ frigida sunt & humida: alioqui ad restinguendam sitim, præstaret ea sola, q̄ cum aqua, exhiberi. Porro ut à uino apparet homini semper sitim increfcere, sic ab aceto epoto, interim quidem augeri, interim uerò sedari.

Vinū semper ad auget sitim

C A P. XXX.

Sitis unde exoriatur.

Quum igitur sitis, partim humoris inopia, partim caloris copia proueniat: neq; à sicca dispositione prouenientem sitim, neq; à calida & sicca, epotum sanare unquam potest acetum. At si quando in unum coeant humiditas atq; caliditas, eiusce sanē sitis, acetū medela optima existit. Siquidem humectare nequit: at refrigerare, non instrenuē. Verū sitim, quæ ex composita affectione, uidelicet calida & sicca, nascit̄, composita medela est oxycratum, quod ex aceto cōstat tenuiū partium, atq; refrigerante: & ex aqua, quæ non modo

Acetū cui sitim remedium sit.

Oxycratū ex aqua & aceto constat.

refrigerat, sed humidorum etiam omnium est humidissima. Nihil enim aqua est humidius.

CAP. XXXI.

Per se autem solum, quod iudicandum est, expendere oportet, tum in sanis temperatisque corporibus: tum etiam in intemperatis: ac præterea in ijs qui alicui sunt morbo obnoxij. In temperatis quidem, ut supra: in intemperatis autem, sicuti dixit Hippocrates. Naturis picrocholis utilissimum esse acetum: at melancholicis aduersissimum. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectus: si mixtum aliqui, necessum est, id cui miscetur, temperatura sit medium. Siquidem quod medio coniunctum fuerit, ipsum eorum quæ perficietur, existet causa. Quare si acetum simplici cerato commisceas, cerato ipso longè frigidius medicamen effeceris: eritque tibi id remedium uel optimum, ad erysipelata, phlegmonas, herpes, & carbunculos. Sin autem quod mixtum est, tanquam simplex expendas, hallucinaberis. Nam quemadmodum ærugo neque carnem producere, sed ceratum quod illam recipit, sic ulcerum glutinatorium, non acetum, sed oxycratum est. Quippe acetum per se, ulcera erodit & mordicat.

CAP. XXXII.

Iam uerò, quum liceat ex astrictoribus complura offendere, quæ minimè sanè conglutinent: sicuti ex conglutinantibus, haud etiā pauca, quæ minimè astringentia uidentur, falluntur quæ absurdissimè, qui astrictoria omnia conglutinare, conglutinantia omnia astringere proficentur.

CAP. XXXIII.

Miserè etiam hallucinantur, qui astringentia omnia refrigerare dictitant: quum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ ualenter astringunt, tantam assequuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant.

Aqua humidiorum omnium est humidissima.

Medicamenta quæ iudicare uolumus, qualiter expedere oporteat.

Acetum biliosis esse utilissimum, aduersissimum melancholicis.

Ceratum simplex aceto ablutum, contra tumores calidos optimè esse perfidum.

Oxycratum uulnèra glutinat.

Astrictoria omnia haud quæquam conglutinare, neque glutinantia omnia astringere.

Astringentia etiam haud quæquam refrigerare.

Dioscoridem
suggillat Ga-
lenus.

Caprillus ade-
ps contra suc-
cos itellina cro-
dentes, cur sit
salutare p̄fidiū
Astringentium
opus.

Herodotus autem & Dioscorides, q̄ medicamen-
ta quædam profiuujs alui, atq; dysenterijs mede-
antur, ob id astringentia ea esse colligunt: quum tamen
ne minimum quidem astrictionis sortiatur, sed potius
rarefacientia & laxantia sint. Nam exempli gratia, ca-
prinus adeps, omnibus quæ & gustu & facultate sunt
astringentia aduersissimus est: ijs tamen quæ acria &
mordacia per aluum fluunt, manifestè efficaciterq; au-
siliatur: q̄ scilicet concreascat facilè, inūgaturq; intesti-
nis, ac plurimo tempore inhærens, illa demulceat, &
foueat. Quum uidelicet condensare, cōstringere, & cō-
stipare, opus sit astringentium.

CAP. XXXV.

Tāgibiles quæ
litates.
Visui quæ sub
iiciantur.
Gustui q̄ subii-
ciantur.

V Naquæq; sensibilibus natura, priuatim subiecta
est, tactui quidē caliditas, frigiditas, durities, atq;
mollities: albedo uerò, nigredo, atq; ut summatim di-
cam, uniuersum colorū genus, uisui: amaritudo, dulce-
do, austeritas, acerbitas, aciditas, falsedo, acrimoniaq;
gustui. Planeq; demens uideatur, si quis gustu colores
iudicare tentet, aut sapes uisu, similiterq; & de alijs
sensibus. Siquidem tactu iudicandæ sunt differentiæ
tangibiles: auditu audibiles: odoratu odorabiles. Om-
nis autē inuentionis demonstracionisq; principia sunt,
quæ sensui atq; intellectui euidencia existunt.

CAP. XXXVI.

Saporū diui-
siones ex cōcū-
ta Platonis.

Porrò Plato in Timæo, sapes (quos Græci χυ-
μῶς appellant) duos primū assignat, eosq; ut spe-
ciei eiusdem, sic rōne maioris & minoris inter se diffe-
rentes. Quorum sanè alterum austum, alterum acer-
bum (quī ex illius intensiōe procedit) nominat. Secū-
dam speciem facit, eorū qui illis opposita sunt, nitro-
forum uidelicet, salforum, & amarorū. Et in his quoq;
amarus ex nitrosi prouenit intensiōe. Salsus uerò, aut
nitroso imbecillior est, aut astrictionis quoq; assumēs

aliquid. Deinde à Platone acris expositus est: mox acridus: postremo dulcis. At à Theophrasto additus est unctuosus, quem nimirum omisit Plato, ut qui ad gustum nihil attineret.

Vnctuosum saporem nihil attinere ad gustum.

C A P. XXXVII.

EXponere autē hos sapes exactē, impossibile est: quandoquidem neq; aliam ullam sensoriam passionem: eum tamen qui tali sensu cōmunicat, recordari fuerit possibile. Igitur quando quod linguæ nostræ fuerit ad morum corpus, uehementer desiccatur, contrahitur, & in multam profunditatem usq; illam exasperat, sicuti pira syluestria immatura, & corna, eiusmodi omne appellatur acerbum: ab austeris tantum intensio diuersum. At quod astringens uocamus, idem uidetur significare quod austerum, aut etiam cōmune esse genus tum huius, tum etiam acerbi. Quæ uerò linguam, dum contingunt, non contrahunt, neq; constipant, sed detergunt potius & abluunt, etiam si astringentiū quipiam permistum habeant, hæc omnia falsa cognominamus. At quæ his etiam magis detergunt, ita ut etiam molestē exasperent, amara uocantur. Porro quæ mordicā, roduntq; idq; cum ualida quadam caliditate, dicuntur acria: sin hæc absit, acida: cæterum hæc fermentandi quoq; uim obtinent. Rursus, quæ ueluti inungunt atq; implent, in statumq; suum restituunt exasperatas ac ueluti erosas linguæ particulas, hæc, si cum uoluptate manifesta cōtingant, dulcia: sin hac sine, pingua uocantur. Quid si ex calido, frigido, humido, & sicco, coeuntibus, uniuersa constent, uerisimile profectò est, dictarum quamq; qualitatum, ex horum etiam miscella conflare.

Sapores exacte exponere esse impossibile.

Acerba quæ. Astringēs esse cōmune genus austeri & acerbi.

Salsa quæ dicuntur.

Amara quæ.

Acria quæ. Acida quæ.

Dulcia quæ. Pingua quæ. Sapores oēs ex miscella quatuor qualitatum primarum nasci.

C A P. XXXVIII.

Verum non quale unumquodq; ex se sit, & ad totā naturam, sed quale secundum corpus nostrum, consideramus. Alioqui nec acetum, nec marina aqua

Medicamenta singula tali adici qualia erga nos sunt.

nos exiccare possent, sicuti nec sicca dici, quum utrūq;
illorum sit actu humidum. Ceterū si nos exiccare ap-
pareant, sicca dicentur, ad nos uidelicet, & nostram na-
turam, parē siccandi uim obtinerentia: de cæteris q; qua-
litatibus idem est ferendum iudicium. Quare faculta-
tum omnium quæ medicamentis insunt, experientia erit
certissima iudicatrix. Quam qui relinquunt, nō solum
falsa pro ueris ducūt, sed tractationis etiam utilitatem
destruunt. Idcirco prius delēdi sunt dispungendiq; om-
nes paralogismi à discipulorum animis, q̃ in uera disci-
plina imbuantur. Nam quemadmodum corpora im-
pura, quāto magis nutries, tanto magis lædes, sic quo-
que si impuris animis nutriētes sermones offeras, nō
modò nihil prodis, uerū etiam magnopere obfueris.

Experientia est
certissima iudi-
catix faculta-
tum q̃ medica-
mentis insunt.
Impuros aios,
prius esse à pa-
ralogismis pur-
gandos, q̃ ve-
ra doctrina i-
buendos.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamentorum facultatibus. Lib. II.

C A P. I.



NON desunt qui nobis, mortales quū-
simus, à sensibus auspicandum esse
contendant, ad facultates omnes exa-
minandas: in illis tamen perpetuò im-
morandum nō esse, sed ad partem di-
uiniorem accedendum, nempe ratio-
nem. Sensum quippe & animantibus inesse rationis
expertibus: rationem autem solam, hominibus esse cū
Dñs cōmunem. Qui sophistæ non sentiunt, si à sensi-
bus recedendum sit, demonstrationis primordia futu-
ra esse longè incertiora, quàm ea quæ demonstran-
da ueniunt.

Rationem solā
esse nobis cō-
munē cū Diis.
Sensus referen-
dos non esse.

C A P. II.

Quidem optarim nullas non res clarè sub sensus
nostros

nostros cadere, nec quicquam esse quod illos fugeret. Hoc enim pacto nihil ambiguum unquā aut anceps foret. Verū quoniam illos quedam effugiūt, rationem ipsis superinducere conandum est: sic tamen ut nec cōfusa, nec infinita colligamus, sed ante omnia, nominū significata diligenter definiāmus: deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separetur. Irridendi autem meritō sunt, qui de olei aut rose colore nimis anxie ratiocinantur, quum rebus ipsis uarie uti liceat, de illis q; periculum facere. Ac tales mea quidem sententia, perinde factitare uidentur, atq; ij qui ex aliqua imagine cognoscere quempiam conātur, quem etiam uiuum intueri, maximē illis est licitum.

C A P. III.

TRibus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas temperatura esse calidas, q; sint rubræ. Primum, q; non demonstrata hac propositione, omnis ignis rubet, conuertere ex hac aliam, uidelicet omne rubrum est ignis; tanquam ueram conantur. Secundō q; nesciunt, propositiones quæ ex mutuō ueris conuertuntur, non autem simpliciter conuertentes, ueras existere. Tertiō, q; etiā si mutuō conuerterentur, non tamen omne quod colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa conuersione sequatur, sed rubrum omne esse ignē: id quod minimē inuestigamus. Eodem errore tenentur, qui ex odoribus, medicaminum facultates coniiciunt. Nec enim quicquid bene redolet, calidū est: nec quicquid calidum est, bene olet. Quin etiā nec si quid graueolens est, calidum etiam fuerit, nec si calidum, etiam graueolens. Sic nec si quis quicquid grauiter oleat, frigidum dicat: nec si quicquid frigidum sit, olere grauiter, uerum dixerit. Siquidem calidorū innumera sunt, partim bene olentia: partim grauiter: partim neutra: atq; frigidorum similiter. Quāquam quid calida dico, ac frigida, cum dicere debeam nos calfacientia, & re.

Ambiguū nihil esset si oīa sub sensus caderēt. Ratio cur interponēda sensibus.

Rosas q; rubræ sint, calidas ēē dicētes, quotupliciter peccēt

Propositiones q; ex mutuo ueris cōuertunt, sunt veræ.

Odores nō indicant facultates medicamentorum,

frigerantia? Etenim aliud est facultate calidum : aliud actu. Et huius quod actu calidum est, aliud absolute dicitur calidum: aliud per exuperantiam: aliud ad symmetrum sui generis: aliud ad quiduis obuium collatum. Homo autem non absolute calidus, quemadmodum ignis, sed exuperantia calidus dicitur: quod maior in eo portio calidi sit, quam frigidi. Ergo & quęcumque ad hunc modum dicuntur calida potestate, illum dicuntur excalfacere, facileque de ipsis iudicium sumitur per experientiam solam, cui adiuxeris paucos quosdam epilogismos. Quare neque a calore, neque ab odore, neque a consistentia, aut huius generis aliquo, de medicamentorum facultatibus est opus ratiocinari.

C A P. IIII.

T Aceo sophistas minimè quidem rationibus scientificis uti, sed aut inductionibus, aut exemplis. Differt autem ex exemplis quippiam suadeas, an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, unum, aut duo generis eiusdem affert: aut certè planè paucula, plerisque cæteris præteritis. Qui uerò ex inductione, omnia comprehendere nititur, quæ per experientiam sunt cognita. Quare talis inductio uehementis est, ac plurimum persuadet.

C A P. V.

Quod uerò ad oleum spectat (quo de multa Archidamus citra demonstrationem atque ineptissime prodidit) quæ in ipso coquuntur omnia, sicca & friabilia efficit, contra quæ in aqua contingit: quæ uerò sunt illo imbuta, magis propriam humiditatem conseruant, quam si eo madidata non essent. Quin etiam scillæ & urticae morsus oleum per sanat: & quum reliquum uniuersum corpus demulceat, tantum oculos mordicat, nec non guttur exasperat. Subducit autem aluum: lassitudines tollit: tueturque inunctos a frigore, atque lora emollit, insectaque animalia perimit. Quorum omnium causam

Calidum multiplicitè dicitur
Homo non absolute, sed per exuperantiam calidus dicitur.

Color non facit ad iudicandas medicamentum vires.

Sophistæ vtuntur inductionibus et exemplis.

Inductio quæ ex pluribus validior.

Olei effectus varii.

Oleo incocta redduntur sicca.

Oleum oculos mordicat.

Oleum aluum subducit.

Oleum insecta perimit.

reddere debuisset Archidamus. Porro coci oleo tum carnes, tum pisces, interim dum assantur, oblinunt, q̃ siccæ, adustæq̃; extimæ eorum reddantur partes, si assentur citra talem unctionem. Athletas etiam oleo gymnastæ inungunt, q̃ præsentem quidem lassitudinem soluat; occurrat autem futuris; ac breuiter frictionem tum æqualem, tum mitem efficiat, corpusq̃; ad motus futuros præparet.

Oleum lassitudinem lenit.

C A P. VI.

AT Archidamus non solum quæ in multis perspicuè apparent contemnit, sed hac etiam parte iure taxandus est, q̃ dicat meliorem esse frictionem siccā, ea quæ cum oleo adhibetur, quia corpus durius & siccius ijs qui inunguntur, euadat; mollius autem ijs qui fricantur sicci. Falli præterea mihi in hoc uidetur, q̃ simili affici putet tum ea quæ in illo coquuntur: tum eos qui fricantur. Neq̃ enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepidum, aut feruens, sicuti neq̃ aquam ipsam. Nam quî obscuro simile fuerit, herbas in oleo feruente coquere, ac exercitantium corpora oleo temperato fricare. Etenim si quis uelit expendere oleum, ab omni prius aliena qualitate (à qua semper propria obscuratur) ipsum liberum reddat, atq̃ ita demum ad explorandum se accingat.

Archidami opinio cōuellitur.

Olei uires qualiter expēdēdę Qualitatem propriam ab aliena obscurant.

C A P. VII

Preparare oleum solemus, non aliter atq̃ aquam: nempe prius excalfacientes, ac deinde in aquā mergentes summè frigidā. Quòd si etiam fons in ipsum cū strepitu decidat, uasculo cui inest oleum, ante diligenter occluso, magis quoq̃ ac magis ita reddetur frigidū. Multum item frigefeceris, si præcalfactum ita in puteū demittas, ut aquam contingat. Ac sic oleum reddimus frigidum: * cōtrario autem modo, calidum. Quo sanè utimur in refrigeratis corporibus, in alueum olei calidi demittentes, quibus pars quæpiam obstupuit, aut qui

Olei refrigerandi ratio.

Olei pfusio calidi, quibus cōueniat.

Oliua.

Olea.

Oleum simpliciter & p̄ abusu dici.

tremuli sunt, aut conuulsione, aut tremore, aut motus sensus uel oblesione tentant. Porro fructus ex quo premitur oleum, oliua nuncupatur: & arbor, olea: atque hoc quidem simpliciter & primario oleum dicitur: reliqua autem omnia per abusum & translationem.

C A P. VIII.

Olei differentie complures.

Cæterum ueri olei plures sunt differentie. Secundum ætatem quidem, quum aut recens est, aut ætate uigens, aut inueteratum. Secundum præparationis modum, quum simplex atque impermixtum fuerit, aut præparatum cum sale. Secundum fructus diuersitatem, quum is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, quum ut ab initio fuit, sic relinquitur: aut candidum redditur.

C A P. IX.

Experiri quod & quomodo medicamenta debeamus.

Experiri autem solum oportet, quæ impermixta sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: eaque primum in optima corporis constitutione: deinde in intemperatis: demum in morbis simplicibus.

C A P. X.

Oleum lassitudinis confert.

At nonnulli Medicorum, non solum in explorandis medicamentorum uiribus hallucinantur, uerum etiam in opinionibus quas habent de affectibus. Nam oleum quod lassitudinis remedium sit, omnes præpeditum consentientur: cæterum quis affectus sit lassitudo, non consentiunt: ac proinde secundum ipsorum doctrinam, nihil certi de olei facultate colligi potest.

C A P. XI.

Oleum expers salis, et salium qua ratione subducant alium.

Nec uerò parum interest, an iniiciatur in uentrem pituita scatentem oleum expers salis, an quod plurimum accepit salis, in uentrem purum. Vtrumque enim alium subducit, facultatibus tamen diuersis: nempe illud quod sale uacat, in pituitoso uentre per lubricitatem: quod uerò salem habet, in puro, per acrimoniam, perinde ut muria, & marina aqua. Idcirco sanè hoc raderet,

alterum non radet.

CAP. XII.

Nonnunquam autem mordicationes ex accidenti quod saluginosum est, sanauerit, unā secum educens acres & mordaces humores, p̄inde ut cætera omnia quæ abluunt. Sed nō statim ubi immissa sunt id genus medicamenta morsus sanāt: quin potius tunc etiā magis exasperant. Siquidē euacuationis, haud mistionis ratione, sanationē moliantur. At ceratum ex rosaceo & adipe infusum, sæpenumero moribus cōtinuō succurrit, idq; cōmitionis ratione. Oleum etiam solū, sed dulcissimum, idem frequenter præstitit: sicuti certē adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratū ex oleo dulci. Nos autem sæpenumero quibus ex frigore torquebantur dolore interna, injecto oleo calido liberauimus: atq; ubi maius esse frigus coniecimus, addidimus & anethum: si uerō adhuc etiam maius, rutā quoq; et bitumen. Cæterum occurrunt interdum quædam affectiones permixtæ, ex intēperie uidelicet atq; mordicatione: in quibus consueuimus nos anethinum, aut rutæ oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adsit, saltē gallinaceo, aut aliquo aliorum, aut cera mordacitatis experte, qualis nimirū est lota. Vnūquodq; autem medicamentorum temperātium, ubi ualentius euasit humoribus mordicantibus, morsum eorum retundit. Verū si aut ualētioribus facultatibus, aut multis, paucum permixtum fuerit, unā & ipsum corrumpitur, aliq; cacochymiam. Quamobrem protinus euacuandi sunt, qui ab hīs quæ temperandi naturam habent, exasperantur.

CAP. XIII.

Sic sanē lac frequēter simul atq; sumptū fuerit, alijs acefcit, alijs in nidorem uertitur, prius q̄ probē cōcoctum, corruptionem temperet. In quibus utiq; primum cacochymix pars euacuar i debet: atq; inde sur-

*Saluginosa
ex accidētī nō
nūq̄ mordica
tiones sanant,*

*Dolentibus in
testinis q̄ so
leāt opitulari.*

*Cera elota est
mordicationis
expers.*

*Vacuandos, p
tinus esse, q̄ ab
iis q̄ rēperandī
naturā habēt,
exasperantur.*

mendus chondrus, & ptisana, & lac, & alia, q̄ ubi prò-
bè fuerint confecta, cōferunt ad boni succi generatio-
nem. Porro ptisana, ex sua propria natura, boni quidē
est succi; uerūm interdum unā cūm ijs succis, qui exci-
tant mordicationes, corrumpitur, atque ipsum auget
symptoma.

C A P.

XIIII.

Cacochyma
qua rōne mor-
dicationes fa-
ciunt.

Mordicationi-
bus cibi apti
qui sūt.

Lenientia per
se, ab ijs q̄ ex
accidēti id fa-
ciūt quatuor i-
dictis distingui
posse.

Leniētia inter-
dū a cacochy-
mis uicta, mor-
dacia reddunt

Cæterūm cacochyma, non temperando, sed id qđ
mordicat educendo, mordicationes sanant. Ac
proinde, donec uacuentur, hominem, mordicare non
desinunt; & insuper euacuata, in partibus asperū sen-
sum relinquunt, aliud medicamen desyderātem; quod
non faciunt quæ boni sunt succi & dulcis, cuiusmodi
existūt chondrus, lac, atq; ptisana, quæ in id genus af-
fectibus & edenda præbemus, et per sedem injicimus,
ubi aut melle, aut quopiam eiusmodi, quod infestabat
exterferimus Quo tēpore opportunus est, & adeps, &
ceratū dulce, & oleū dulce. Quatuor itaq; indicijs, quū
possis quod per se leniens est distinguere, ab eo quod
per accidens, faciliē cuiusq; talium medicamentorum
facultatem inuenies. Primum indicium est, an statim
mitiget, an non. Secundum, an simul cum lædentibus
euacuetur, an non. Tertium an asperitatem quandam
in corporibus ipsis relinquat, an non. Quartum, an nō
ita affectis cōmodum utileq; uideat. Nam quum nec
protinus mordicationem sanat, nec intus leniendo re-
manet, molestamq; asperitatē parti affectæ relinquit,
quam, si denuo offeratur, exasperat, argumentū est ro-
dentis, ac mordicantis ipsum esse naturæ; ex acciden-
titamen quandoq; morsus sanare. At quod conti-
nuo mitigat, & nullam excretionem prouocat, sed nec
exasperat dum intus manet, imò exasperatorum me-
dela existit, ipsum quidē natura bonum est, uerūm in-
terdum à cacochymia quæ ipsum alterat, corrūpitq;
mordax efficitur.

L Auanda porrò est nō modò cera, sed pix, resina, & oleum, omniaq; breuiter, quæ cal fieri & fundi quum possint, aquæ misceri nequeunt. Singula igitur modicè calfacta in uas latioris orificij & magnum, cuiq; insit aquæ copia qualitatis expertis, infundito. Dein tundito, et frangito, manibusq; impēsē subigito. Postea effusa priori aqua, rursus quod abluatur exal faciens, in aliam æquē synceram aquam inijcito: rursusq; in aliam, et aliam, donec aqua nullam ex eo qualitatē recipiat: quod quidem gustu datur cognoscere. At si quæ sunt lapidosa & dura, ut cadmia & æris squama, & æs ustum, ea cōminuērem exactē in tenuia plurimum terere in aqua fotana & purissima oportet, idq; sæpius aqua priori effusa, aliaq; denuò instillata, donec nihil in ea innatet, maneatq; aqua prorsus à cōtriti medicaminis qualitate immunis. Sic itaq; abluta omnia quæ elui possunt, expertia mordacitatis redduntur. Ac præter id sanè, oleum etiam candidius reddit. Mitius tamen id uerberari, q̃ alia, debet, ne uidelicet ad eò ipsi aquæ misceat, ut ægrè postea secerni possit.

CAP. XVI.

Oleum autem quod immaturum non fuerit (hoc enim astringit) nec preparatum sale, nec recens, ac ueluti etiam nū feruens, ad hæc adamussim lotum, id neq; epotum, neq; infusum, excitabit mordicationē. Quod si guttur ad tussis impetum prouocet, non ideo mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad tussim incitat: non tamen quicquid ad tussim incitat, existit mordax & acre: quā & pinguia mouere impetum ad tussim appareant. Sequitur itaq; si quid non cieat ad tussim impetum, id haudquaquē mordax existere: non tamen perinde constiterit, quicquid ad tussim impetum moueat, cōtinuò mordax esse, nec si categoricas, nec si hypotheticas cōficiamus propo-

Lauanda q̃ sunt
medicamenta
et quomodo.

Lapidosa ab-
luendi ratio.

Abluta reddi
mordacitatis
expertia,
Oleum ablutū
candidius reddi

Oleū ompha-
cinū astringit.

Tussim excita-
tia non esse ne-
cessario mor-
dacia.

Tussim mini-
me prouocātia
esse mordacia
non possunt.

sitiones: q̄ scilicet ex duabus uniuersalibus affirmatiuis, nihil concludi in secunda figura possit, nec conclusio ex necessitate sit uera.

C A P. XVII.

**Sternutationis
usus.**

Tussis usus.

Tussis causæ.

**Potionis destil-
lare semper ali-
quid in pulmo-
nes per arteriã
asperam.**

Natura hominibus sternutandi uim indidit, ut p̄sidio ipsius, q̄ in naribus infesta molestaq; sunt, propulsarent: tussendi uerò, ut quæ in gutture. Contin- git autem hæc affectio dupliciter: aut resiccata, exaspe- ratauē, quæ in arteria est membrana: aut à delato cor- pore, inæquali reddita. Hinc siue panis micula, aut alte- rius cuiuspiam edulij, nobis inuitis, in spiritus meatum decadat, tussire adigimur: seu si bibentibus affatim ip- sius potus quippiam eò influat, similiter ad tussim cõ- pellimur. Percolatur tamen per asperam arteriam per- petuò in pulmonem ipsius potus tam exile quippiam, ut protinus ab instrumentis raptū, perfacile quocunq; distribuatur, nec animal ad tussim irriteret. At ubi uel id ipsum plusculum, uel aliud quodpiam seu liquidū, seu solidum corpus, per asperam deferret arteriam, iam in- de tussire est necesse, donec à spiritus uehementia mo- lestum id excutiat. Mordacia itaq; gutturis exaspe- ratione, oleosa uerò & pinguis, illitu inæqualitatem, & ad tussim impetum faciunt. Spiritus siquidem, in emi- nentia quædam impingens, efficit inæqualem concus- sionem in gutture, ad tussimq; animal prouocat. Cete- rum non eo inficias, ex oleis esse mordicantia pleraq; qualia tum salsa, tum recentia uidentur: atq; hæc quidē non propria essentia, sed q̄ omnibus plātarum succis geminum excrementum insit, alterum crassius, tenuius alterum. Quæ ambo quum reperiuntur etiam in oleo, ad concoctionem & discretionem, tempus sanè postu- lant. Procedēte uerò tempore, quod crassum quidem est, nūcupatum amurca, subsidit: quod uerò tenuius & ueluti aquosius & ipsum compositum quodammodo est, ex acri scilicet essentia, & tenui serosa.

**Succis planta-
rum oibus du-
plex excremen-
tum inesse.**

Olei partes.

C Asterum serosum istud rufi coloris est, à crasso illo scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum, tum minimè mordax, tum candidum sua natura existit. Quapropter ubi tenue hoc excrementum secretum fuerit, candidius & dulcius reddetur. Separant autem ipsum, aut insolantes oleum, conchisq; altolles in altum; aut uasculis in quibus est oleum, calidos subijcientes cineres; aut oliuatum nucleos, aut frumentum circa ipsa apponentes; aut deniq; medicamenta in uasa ipsa iniicientes. In summa, quod aqueum est, consumunt; reliquum uero reponunt. Tale igitur oleum, si salis expers, lotumq; sit, medicamentorum omnium minimè mordax erit, maximeq; humectat et mollit, si nec summè frigidum, nec calidum applicetur. Porro cui injectus sal est, nonnulla quoque necessariò mordacitas inest. Frictio itaque ex oleo, magis quam sicca, lassitudinem tollit; emollietq; corpora, cohibens occludensq; quicquid è nobis foras effluere est natum; haud quaquam digerens & exiccans.

C A P. XIX.

Quæ autem ex oleo sit frictio, prorsus æqualis existit; inequalis uero quæ sicca. Cutim siquidem per siccam frictionem manus coadducunt, ac ueluti duplant, uiolenterq; ac præter naturam complicant. Deinde ubi non amplius prior ueluti duplicatio labentes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atque ad continuum reuellitur; manus autem semel ac uno impetu in alteram cutis partem transeunt, inferiorè transgressæ ipsius duplicationis partem; ac proinde inæqualem, durum, & laboriosam talem frictionem sentimus. Quod si læuis lubricaq; exactè sit cutis, nec duplicari facile poterit, nec inæquabiliter admittere ipsos manuum decursus. Quare externo aliquo medicamēto indiget, quod rugas impleat, manibusq; lubricitatem conciliet; quas ad res oleo nihil aptius inuenias.

Oleum reputandi ratio.

Olei dulcis natura & vires.

Frictionis ex oleo usus.

Frictionem ex oleo quidè est, lem, siccam uero inæqualem.

Oleum frictionibus accommodatissimum est.

Oleum experi-
undum esse in
hominibus.

QUum autem liceat in hominibus de ipso oleo per-
riculum facere, nescio equidē qua nam occasione
ducti complures ueteres, ad diuersa alia uertuntur, ut
illius facultates explorent.

CAP. XXI.

Experiendi rō
nes diuersæ.

AT recta experiundi ratio, in primis quidē ea est,
quæ in corporibus sit temperatis: dein ea quæ in
intemperatis: mox, ut sæpenumero antea monuimus,
quæ in simplicissimis sit, hoc est calidis, frigidis, humi-
dis, atq; siccis affectibus: distinguētib; semper nobis
id quod per se sit, ab eo quod ex accidenti. Curandum
etiam est, ut oleum de quo experimentum sumit, alie-
næ qualitatē sit expers: id quod est in omni medica-
mento obseruandum. Si igitur ita oleum adhibeas, ma-
nifestē comperies, refrigerarē ne, an sit calfacere natū.
Atq; hæc quidem summa est rationis. At opus ipsum
quod perficitur, experientia cōmonstrat. Nam qui ar-
dore tenentur, tantum abest, ut à calore liberentur, ut
etiam magis & æstuent, & processu tēporis calidiores
euadant. At algētib; ex olei inūctione, perspicua nul-
la aut noxa, aut utilitas conspicietur. Ex quo liquet, cal-
facere quidem ipsum, non tamen admodum, nec eui-
denter, ut resina, pix, & bitumen, quæ uidelicet sponte
fluunt. Nam quæ sicca sunt, ut eis inūgi non possumus,
sic nec simplicia, nec sponte nata medicamēta existūt.
Cæterū in ardoribus, si salis sit expers oleū, perfun-
daturq; frigidum, nonnullum sanē solatium adfert. In
erysipelatis autem, sicuti in omnibus quæ à pura bile
fiunt fluxionibus, quantūuis sit frigidum, uel maximē
ledere est natum. Quæ uerò ex sanguine fiunt misto cū
bile, eas fluxiones minus aliquātulo affligit: uideturq;
calorem parem eis quibus applicatur, accendere: quā-
do quidem modicē calida, calfacit mediocriter: immo-
dicē autem illa quæ magno ardore æstuant.

Medicamenta
q̄ experiri vo-
lumus, debent
eē alienę qua-
litatis expria.

Oleū calfacit
quidē, sed non
euidenter ad-
modum.

Oleū quibus
fit noxium flu-
xionibus.

Oleum uidet
calorem parē
eis quibus ap-
plicat accēdet

Igitur medicamenta omnia quæ facultate dicuntur calida, caloris sui à nobis accipientia principium, partim similiter nos recalfaciunt; partim ualētius. Atq; ex ijs sanè quæ nos æqualiter recalfaciunt, oleum esse mihi uidetur; ac proinde nec conuulsiones, nec tremores, nec sensum tum difficilem, tum deperditum magnopere aut iuuare, aut lædere potest: nisi ascititiū sibi compararit calorem. Tunc siquidem plurimū proderit. Vnde meritò ueluti materia quædam cæterorū medicaminum fuerit. Nam si frigida illi commisceas, frigidum efficietur qđ mistum erit: sin calida calidū. Quippe quod ex media tēperie est, utrisq; summis inseruit. Porro non calfacere oleum hac ratione quis dixerit, qđ caliditatem quam reperit, non augere, sed conseruare uideatur.

Medicamenta facultate calida quomōdō nos calfaciant.

Oleū est ueluti materia calida quorū medicaminum. Medium tēperie, utrisq; extremis inseruit

CAP. XXIII.

Calfacere itaq; nos dicuntur, & quæ energia, siue actū, sunt calida, ut ignis: & etiam quæ potestate. Hæc tamen partim alimenta sunt; partim medicamenta; partim tegumenta. Sed & calidum actū est, quod simpliciter calidum est ut ignis: & quod per exuperantiam, ut animal; & quod ad sui generis symmetrum cōparatur, & quod ad quiduis obuium. At quod potestate dicitur, primo quidem distinguit ab eo, quod ex accidenti est. Deinde totidē habet significationū differentias, quot actū calidum. Etenim quum sit ueluti quidam apta materia ei quod est actū calidum, partim ad ea quæ absolutè calida nuncupantur, partim ad ea quæ per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis, aut speciei deniq; & ad obuium quoduis collatū, ppria fuerit materia. Quocirca quū ea calida quæ ad hominem referunt expendimus, ut alia omnino omitantur, æquum existimamus.

Calfacere nos quæ dicuntur. Calidum facultate, & actū, utriusq; quotupliciter accipitur.

CAP. XXIII.

Oleum multifariam dicitur nos calfacere.

Vestimenta a nobis calfacta nos recalfaciunt. Olei cum vestimentis collatio.

Oleum et vestes non proprie nos calfaciunt, sed obfistentia frigori.

Similia corpora a se mutuo nullam mutationem accipiunt.

Medicamenta quomodo nos calfaciant.

Oleum corpori illitum, caloris & sudoris effluxum phibet. Oleo ungendi qui sint, & qui minime.

Accidit autem fortassis oleo, ut tanquam alimentum nos excalfaciat, ubi intrò in corpus assumitur: quum probatis medicis quibusdam uideatur, sicut ex cibis, ita ex oleo fieri corpori appositionem. Accidit etiam illi, ut tanquam medicamen, sit mediū inter nos calfacientia et refrigerantia: tum ut ipsum nos ueluti tegumentum excalfaciat. Nam quemadmodū uestimenta à nobis excalfacta, nos excalfacere cōsueuerunt, ita & oleum. Et quemadmodum illa excalfaciente corpore calidiora minimè euadunt, ita quoque neque oleum. Mediæ siquidem aeris nos ambientis temperaturæ similis est tum qui à uestimentis, tum qui ab oleo profisciscitur calor. Quam ob rem tum uestimēta ipsa, tum oleum, calfacere nos non propriè, sed per abusum dicuntur, quòd frigori obfistant. Quemadmodū si duos æquè temperatos adolescentes, qui contingantur mutuo, sese dixerimus calfacere, tametsi haudquaquē excalfaciant, sed duntaxat arceant frigus ambientis. Quæ enim similia undequaque corpora sunt, à se mutuo nullam mutationem accipiunt. Respondet itaque calidiori aeri pyrethrū, & piper: moderato autem oleum & pinguitudo: actu tamen aeres sunt calidi: potētia uerò, medicamenta. Siquidem à nobis accipientia excalfactionis principium, partim nos recalfacere sunt nata: partim plus: partim minus. Oleum igitur ex genere eorum, quæ æquè recalfaciunt nos, existēs, duplici ratione ut excalfacere uideatur euenit, quod nimirum instar uestimēti, aut munimenti illinatur: & quod meatus infarciat, prohibeatque foras effluere magnam uaporosi intus caloris partem. Hac ratione, quos largius sudare uolumus, non protinus ipsi ab initio admouemus oleum. Verum eos quidem qui morbo laborarūt, ubi sudare inceperint, tum excalfacto pfundimus: eos uerò qui etiam nū laborant, ubi abundè iam satis sudauerint. Porro sanis

quavis occasione exhaustis, inungi et ante sudorem p-
mittimus. Verum quibus cruditas inest, aut corpus la-
borat plethora, his neq; in balneo inungi cōcedimus.

C A P. XXV.

Quemadmodum inter calfacientia & refrigeran-
tia, sic oleum mihi inter humectantia nos, & sic-
cantia mediū esse uidetur. Atq; humectat quidē aqua:
exiccat uerò tum laurinum, tum cedrinum oleum. At
expers qualitatis alienæ oleum, talem seruat nostram
temperiem, qualem scilicet accepit: uaporosas omnes
expirationes uel maximè prohibens. Quòd si pluscu-
lum membra oleo frices, comparabis ascititium calo-
rem: qua ratione lassos nō parum iuuabis, q̄ uidelicet
in minutos corporis meatus pingue ingrediatur, ac sic
quæ durata sunt molliat: & q̄ acrem & subtilem hu-
miditatem, quæ latebat sub cute, per halitum digerat.
Nam quum in lassitudine similes quidem animalis
partes siccentur, spatiola autē uacua, tenui, acri, & mor-
dace humore impleantur, ea certē corpora remedijs in-
digent q̄ & siccitatē irrigent, & humorem acrem discu-
riāt. Cui negotio aqua per se sufficeret, si inherere pos-
set corporibus. Quia uerò facilē diffluit, ob id nimirū
illi cōmodissimè oleum miscetur: maximeq; ex utroq;
frictio auxiliatur siccis equalibusq; corporibus: quum
ipsius olei ratione diutius aqua adhærescat. Quare hu-
mectantium et exiccantium, sicuti calfacientium atq;
refrigerantium, oleū ueluti materia existit. Nam si exic-
canti cōmisceas, totum effeceris exiccans: sin humectā-
ti, & ipsum humectās, ac plerunq; magis q̄ antea red-
dideris: ut in aque exēplo docuimus. Quum itaq; om-
nibus quæ sibi commiscantur subseruiat oleum, recta
ratione ueluti omnium materia existit: nam licet eorū
necessariò propriam actionē retundat, ac minuat, non
tamē utilitatem: imò est ubi eā quoq; adaugeat. Quip-
pè contusa cum oleo aqua, magis auxilio est lassitudini

Oleū esse me-
dium inter hu-
mectantia & sic-
cantia.

Oleū talē ser-
uat nostrā tem-
periem, qualē
illam accepit.

Lassitudini di-
scutiendæ qua-
liā requirātur
remedia.

Frictio ex hy-
dreleo cur sic-
cis corporibus
auxiliatur.

Oleū est alio-
rū medicamen-
torū materia.

bus, q̄ si esset sola: non sanè quod intendatur uiribus,
sed q̄ ijs quibus opus est, diutius inhæreat.

C A P.

X X V I.

QUod autem nisi mediam habeat temperiem id
quod ea quæ primariò affectibus auxiliantur,
ueluti deuinciet, se penumerò ipsorū repugnabit actio-
nibus, generatim quidem ex ipsa rerum omnium na-
tura: speciatim autem, ex medicamentorum historia
licet addiscere. Etenim generatim, quoniam id quod
miscetur, si in contrarium retrahat, admisti sibi facul-
tatem medicamenti uincere interim poterit, & in alte-
ram planè speciem id quod ex ambobus miscetur,
transferre. At speciatim, sic etiam id ipsum cogno-
sces. Nam si excalfacientium resiccantiumq; medica-
mentorum cuiuspiam aquam, miscere uelis, non modò
nihil eorum quæ agere nata est, fieri uidebis, sed om-
nino obscuratam esse, perindè ac si admista non esset.
Omnino ergò constat mediam obtinere temperatu-
ram debere, quod utrisq; extremis tanquam materia
inseruiet. Quem in ordinem si oleum statuas, utiq; ni-
hil peccaueris.

C A P.

X X V I I.

QUum igitur oleum ueluti media quædam mate-
ria sit medicaminum calfacientium atq; refrige-
rantium, constetq; tantum ex oleo & rosis rosaceum
(quod saltem exactum & simplex est) utiq; & ipsum
talis temperaturæ fuerit, qualis rosarum succus exi-
stit. Quare illos qui adustione tentantur experieris ab
eo refrigerari, protinusq; aliquam utilitatem perci-
pere: qui uerò refrigerati sunt, omnes lædi. Non
tamen ualida in ipso apparebit refrigera-
tio, sed quæ in primo refrigerantium
gradu collocari mereatur.

Mediū esse de-
bere, qđ utrisq;
extremis ē
futurū materia

Rosaceum ex
oleo et rosiscō
fictur.
Rosacei tēpe-
ries est qualis
succo rosarum
inest.

Rosaceum in
primo gradu
refrigerat.

31

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamentorum facultatibus. Lib. III.

C A P. I.



CORPORVM unumquodq; aut calidum, aut frigidum, aut humidū, aut siccū, et dicitur & apparet, interim quidē ex sua natura, hoc est primariò, & per se: interim autem aduēticia qualitate assumpta, quod est per

Calidum, frigidū, humidū, siccū, quorū modis unumquodq; eorum dicat.

accidens. Porrò eorum quæ propria sua natura calida aut frigida, aut humida, aut sicca dicuntur, quædā actū siue energiea talia existunt: quædam potentia. Sed & eorum quæ actū dicuntur, aliud quidem absolutè est calidum, frigidum, humidum, siccum, ueluti elementa: aliud excessu, ut homo, equus: aliud ad symmetrū, seu generis sui, seu speciei: ut leo cum homine cōparatus, homo autem etate florens cum puero: aliud ad quiduis obuium, ut Dion ad Theonem. Quin & corpora quæ potentia talia aut talia dicuntur, unumquodq; ut ad id quod est actū relatū dici necessariò monuimus: id quidem quod facilè accēditur, ad id quod actū est absolutè calidum: hoc uerò quod alia calfacit, ad id quod per exuperantiam.

C A P. II.

INeo igitur corpore periculum est sumendum, ad quod unumquodq; tale & est & dicitur: à cæteris autem recedendum. Elementa nāq; huiusce tractationis, in primarum quatuor qualitatum, uidelicet caliditatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis cognitione consistunt. Porrò alimentum à medicamento differt, q̄ hoc quidem alteret in qualitate: illud autem substantiæ corporis assimilatur.

Alimentum a medicamento quo differat.

Alterationes
sunt duplices.

Medicamento
rum vires sub
quibus cōtine
antur alteratio
nibus.

Qualitates spe
cificæ q̄ sunt,
& cur sic di
cantur.

Verū quum duplices sint in genere alteratio
nes, aliæ specificæ, quæ propriè sanè & primariò
dicuntur alterationes: aliæ uerò quæ contundunt & cō
trahunt corporis nostri particulas, quas utiq; per abu
sionem potius q̄ propriè alterationes cognominant: in
primo sanè genere, contineri vires medicamentorum
censemus. Nec enim quicq; mutari ex specie in speciē
possit citrà excafactionem, refrigerationem, humecta
tionem, & resiccationem: etiam si constringatur, con
tundatur, conuulneretur. Dico autem mutari ex specie
in speciē, ueluti quum ex pane fit sanguis: aut ex hoc
caro. Itaq; non ab alio q̄ à calore, frigore, humiditate,
siccitateq; specificas alterationes singuli corporis
affectus accipiunt. Qua ratione quatuor ex qualitates
elementares, primæ & specificæ nominantur. Earum
igitur, quam unumquodq; medicamentum in mistu
ra pollentem sortiatur, inuestigamus.

C A P. IIII.

Quū autem totius naturæ respectu bifariam
unumquodq; dicatur calidum, frigidum, humi
dum, atq; siccum, partim absolutè, ut singula elemen
torum: partim per exuperantiam, ut homo equus, &
bos, minimè profectò nos Medici inuestigamus, an in
aqua marina humidi simpliciter plus sit quàm sicci (id
enim clarè cōspicimus) sed an corpus humanū facul
tate sua equaliter resiccare ualeat. Cuius sanè rei sume
mus periculum, si eam admoueamus corpori, per fo
menta aut emplastra: id quod ex accidenti, ab eo quod
propria medicamenti ui proficiscitur, distinguentes.

C A P. V.

Cæterū quod per exuperantiam dicitur, id Phi
losophi accipiunt dupliciter: aut enim secundum
substantiæ molem: aut secundum qualitatum effectū.
Atq; hi quidem calidum uincere in omnibus plantis,
pronunciant

pronunciāt, ob incremēta earū & germinationes id iudicātes. Quibus sanē, quū de tota natura scrutētur, rectē hęc & similia alia dicunt: Medicis autē nō rectē. Siquidem nulla planta, q̃ planta sit, calida dici debet, sed q̃ hominem calfaciat. Sic enim & salamandram, & cicutam, ad hominē frigida esse dicemus: qua ratione sunt alia omnia etiam diiudicanda. Nam cicuta non modō sturnos nō refrigerat, et enecat, uti nos, sed alit quoq̃, ob idq̃ nimirū etiam et calfacit. Insunt quippē omnibus rebus amicitia quædam, & qualitatum pugnantia. Præterea quod familiare est, promptissimē assumitur: quod uerō contrarium, ad internitionem ducit, tum animalia, tum plantas. Cæterū familiaritates illæ, à totius substantiæ proprietate exoriuntur. Porro quum acetum & rosaceum nos primariō & per se refrigerent, nemo ea calida dixerit.

CAP. VI.

Quod applicitum nobis uidetur actu esse calidū eodem gradu quo nos, aut ex cōtactu similiter calidum redditur, id ex media est temperie, nobiscum collatum: ac per se etiam calidum secundum exuperantiam, quemadmodum nos. At si quid nōdum adeo calidum est sicut nos, nec tale admodum redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcunq̃ in eo caliditas exuperet: ac proindē admotum, nostrum calorem minuet.

CAP. VII.

EA autem est cōmunis alterabilium corporum omnium natura, uti in se agant & patiantur admota: quodq̃ minus est calidū, à magis calido calidius redditur: quod uerō magis calidum, à minus calido remittitur. Nā id uel ex ipso tactu clarissimē discas. Etenim eadem subindē illi tum calida, tum frigida esse uidentur: calidiori quidem facto, frigida: frigidiori uerō calida. Quæ sanē causa est, ut in balneis quidem frigida ui-

Salamādra est frigida respectu hominis. Cicuta sturnos alit & calfacit. Cōsensus quosdam & discrepantias qualitatum inesse uersis rebus. Familiaritates unde exoriantur.

Media temperie præditū, quomodo cognoscatur.

Alterabilium omnium natura, quæ sit.

Urina cur apparet nobis frigida i balneo. Putealis aqua cur apparet rigentibus frigidula.

Tactū debere esse ab oī alie na qualitate i mune, si sensibili sit recte iudicaturus.

Medicamentorum facultates in quē modum examinētur a medicis.

Rosas rosarūq; succū, euidenter refrigerare.

Oleū esse medium tēperie. Rosaceum eē ex primo refrigeratiū ordine

Rosarū succus tepidā quandā caliditatē pos-

deatur nobis urina, foris uerò calida: quum tamē semper ipsa reddatur tepida. Similiter dum rigemus frigore, aquam ex puteo profundissimo haustam, calidā iudicamus: quæ eadē nobis in balneo, aut balneū egressis, apparet frigida. Itaq; tactum calidi frigidiq; dignoscendi normam ponentes, atq; eius dispositioni cuius iudiciū omne tribuentes, meritò sanè crebro fallimur: ut qui quod haud ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus: quod uerò calidum ex se non est, id calidū pronunciemus. Absolutè autem et urina, et aqua putealis, qualis ad nos optimè temperatos, atq; ab aliena qualitate immunes uidetur, talis profectò & est, & dici etiam potest.

C A P. VIII.

Quum igitur nec an absolutè unumquodq; calidum sit, ut ignis: nec an per exuperantiam, ut sanguis: nec deniq; an cum symmetro sui generis aut speciei collatum, cōsyderare nobis propositum sit: sed an ad hominem sit tale uel tale: nec rursus ad hūc, tantūm id quod ad aliquid aliud comparatur: sed an ad motum ipsi, eam partem quam tetigerit, reddat aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē: crē in experientia omnis iudicandi et dignoscendi consistet ratio: per quam nimirū docemur, & rosas exēpli gratia, & rosarum succū euidenter refrigerare.

C A P.

IX.

Sue enim in ijs qui inculcata sanitate fruuntur, siue in ijs qui laborant simplicissimo affectu, uidebitur tibi planè oleum quidem in media temperie existere: quod uerò componit ex ipso rosaceum, ex primo esse ordine refrigerantium. Siquidem rosarum succus frigidioris naturæ est q̃ oleum: sed non ita multò, quum tepidam quandam in se caliditatem possideat. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorem quidem tepidū attinet, linospermon: ab eo tamen haud minimū tenui-

tate relinquitur. Nam rosarum succus est exquisitè tenuis essentig; pinde q̄ celerrimè arefcit, odoresq; aliorum unguentorum exoluit. Est & chamæmelum tenuitate quidē, rosæ perfimile: calore uerò, ad olei uires magis accedens, homini tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudini, ut si quid aliud, in primis confert: doloresq; sedat. Præterea tēsa remittit & laxat: me diocriter dura emollit, constipataq; rarefacit. Ad hæc febres quæ citra uisceris inflammationem infestant, concoctas discutit, ac dissoluit: & potissimum quæ ex cutis dēfite & humoribus biliosis proueniunt: ob idq; Soli à sapientissimis Ægyptiorum est cōsecratum. Est autem hypochondrijs gratissimum. Quibus etiam lini semen est gratum: minus tamen q̄ chamæmelum, quum & minus calidum sit, & essentia crassæ. Cæterum ad ascensus, augmentaq; inflātionum, chamæmelo rosaceum præfertur: quum hæc tepida caliditate cum leui astrictione indigeāt. In principio siquidem, quæ refrigerant, atq; astringunt: per incrementa uerò tepida, & mediocriter constringentia: at in uigore ac statu inflātionum, quæcunq; tum moderatè calfacere, tum laxare possunt, magis cōpetūt: sicuti in declinationibus, quæ ualenter calfacereq; & discutere.

CAP. X.

Cæterum quæ mediæ tēperature sunt, & quæ utrāuis in partem declinant leuiter, interim calfacere uidebuntur, rursusq; refrigerare: interim talia seruare corpora, qualia in principio acceperūt. Nec mirum sanè, quum aqua tepida, urinaq; in balneis quidem frigida: algentibus uero, calidæ appareant. At rosaceum, oleo quidem, minus: succo autem rosarum, magis exstans calidum, refrigerat sanè exustos, idq; suæ caliditatis tepore: algentes uerò, paulatim etiam excalfacit: qui effectus etiam caloris est tepidi.

CAP. XI.

fidet, odoresq; aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli facultates insignes.

Chamæmelum Soli ab Ægyptiis est consecratum. Linospermum.

Inflātionum qualia medicamenta desyderent.

Urina uidet in balneo frigida

Rosaceū refrigerat & calfacit diuersa corpora.

QUocirca si aut refrigerantibus medicamentis, aut calfacientibus rosaceum indideris, sicuti nec magnoperè obfueris, ita nec admodum profueris. Nam caliditas tepida, nec est sufficiens quæ refrigerata sunt laedere, nec eadem curare potens. Siquidem quod curari debet, tanquam quod ab immoderatione ad symmetriam reducitur, non id quod probè temperatum sit postulat, verum id quod contrariam habet temperaturam, & æquè recedentem à media. Etenim si quod curari desyderat, multò frigidius sit, necessariò oportet quod ipsum curabit, multò etiam calidius existat: sin paulò frigidius, paulò etiam quod curabit calidius erit: ac de ceteris intemperaturis, pari iudicio. Porro si exquisita utamur nominum appellatione, quod medium in singulis est, id eucratum, siue temperatum dicemus: quod autem ab huius excedit modo, si ad calidius quidam, tum plus, tum minus calidum: sin ad frigidius, plus minusque frigidum: nec de alijs alia ratione. Quandoquidem igitur corpora humana, tum ijs quas ab ortu nata sunt temperaturis, tum ijs quas ab ætate postea acquirunt, tum ijs quæ ex uitæ consuetudine adueniunt, plurimum inter se differunt, ab iisdem ea medicamentis variè alterentur necesse est.

C A P. XII.

Medium ergo horum mihi quempiam intelligas, qui & natura sit temperatus, & moribus & consuetudine conuenienti, hanc ipsam eucrasiam tueatur. Deinde hos tres optimæ temperaturæ scopos concipiens animo, secundum corpus illius, ueluti secundum regulam quandam, vires omnium medicamentorum explores. Quodque similem illius temperiei caliditatem accedit, temperatum uocetur, etià si uel maximè calfacere senem refrigeratum uideatur. Quod uerò calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, illud quidem calidum, hoc uerò uocetur frigidum. Esto autem ipsorum

Reducenda ad temperiẽ, nõ me-
diocria, sed cõ-
traria, & quæ
eque a medio
recedât, p̃sidia
postulant.

Eucraton.

Temperatũ me-
dicamen quod
dici debeat.
Gradus viriũ
medicamentorũ
quomõ inueni-
endi sint.

excessuū ordo, ad frigidum quidem, primus, cuius esse dicas rosaceum: secundus, cuius sit ipsa rosa: post hūc tertius & quartus, quo ad sermone ad frigidissima p-
tigerimus: nempe cicutam, succum papaueris, mādra-
goram, hyoscyamū. Rursum ad calidum, anethum q-
dem, & foenumgræcum, prima: secūda uerò deinceps,
tertiaq; & quarta, donec ad exurentia peruentū sit. Ad
eundem modū in medicamētis humectantibus & exic-
cantibus est ineundum iudicium.

C A P. XIII.

V Erūm omnia propemodum medicamenta, licet
sensu simplicia appareant, natura tamen compo-
sita sunt, diuersissimasq; in se facultates possidēt, excer-
nendi, sistendi, incrassandi, extenuandi, atq; alias id ge-
nus uniuersas oppositiones. Nec mirum id esse debet,
quum uni eidemq; medicamento, uim calfaciēdi & re-
frigerandi esse appareat: aut exiccandi, humectandiq;.
Quæ primæ efficacissimæ uirtutes nisi hoc pacto com-
plicarentur, haud sanè quæ ex illis sequuntur, similiter
complicatæ forent. At si nos ipsi rhu succum melli mi-
sceamus, quod ex ambobus conficitur, astringendi si-
mul & abstergerendi uim possidet: sicuti & cohibendi
uentris, atq; laxandi. In lacte autem duas esse faculta-
tes, nempe sistendi uentrem atq; euacuandi, non item
concedimus: tametsi caseus quidem secretus, uentrem
sistat: serum autem resoluat.

C A P. XIII.

Quod uerò et brassica duas easq; cōtrarias in se
se facultates obtineat, neq; id quidē promptē
concedimus. Nam tametsi succum eius planè aut solū,
aut ex melle purgare cernamus, attamen quoniā quod
reliquum est, edere minimè possumus, astrictoriū esse
id diffidimus. Quāq; si bis ter ue aut quater elixam, ip-
sam brassicam edamus, cōperiemus sanè, succum eius
qui in aqua fuit relictus, purgare: ipsam uerò uentrem

Rosam esse fri-
gidam in secu-
do excessu.

Medicamenta
ppemodū oīa
esse cōposita,
cōtrariasq; in
se facultates
fortiri.

Caseus sistit
uentrem.
Sera aluena
laxat.

Brassicæ his
te rue elix. suc-
cū, vētrē solue-
te, ipsam autē
supprimere.

astringere. Eadē est ratio in betā, lente, atq; in ijs quæ
 testa pro cute integuntur: ac breuiter in omnibus fer-
 mē illis, quibus sapor aut acris, aut falsus, aut nitrosus
 inest. Gallorum etiam ueterum ius, uētre subducit,
 tametsi caro eundem sistere possit. In æris autem squa-
 ma, sicuti duplex qualitas, ita gemina quoq; facultas
 inest: nam & astringit & mordicat: cæterū si intra cor-
 pus sumatur, purgat quidem uētre, uerū non cohi-
 bet. Quippē uincitur eius astringendi facultas, ab
 acri purgatoriaq; potentia, quemadmodum si rhu luc-
 cum scāmōniæ cōmisceas. Sic enim cum mali cydo-
 nij carne, aut cum alio quopiam eorum quæ & altrin-
 gentia et grata uentriculo sint, non pauca purgantium
 medicamentorum dum mista exhibentur, gustum q-
 dem fallunt: at effectu solo quid ualeāt cōmonstrant.
 Persæpe siquidem lingua à materiæ uicta est copia: at
 actio, pro facultatis robore, uiribusq; perficitur. Itaq;
 quum substantia exigua quidem, sed ualidis prædita
 uiribus, mista alteri substantiæ plurimæ, eidemq; im-
 becillæ, corpus ingreditur, gustum quidem fallit: attra-
 men effectū, q̃ illa, efficaciorē exhibet. Porro si ab
 aloē quod purgat, ab eo quod est astringēs, eluatur (id
 quod fieri potest, per exactam lotionem) tunc certe aut
 debiliter, aut planē nihil purgabit: id quod usu etiā ue-
 nit æris squammæ, æriq; ulso. Iam uerō ipsius quoq;
 qualitatis medicaminosus sapor, primo statim gustu,
 facultatis mitionem demonstrat. Nam si unica semper
 qualitas, unicuiq; gustu astringentium medicamento
 rum inesset, haud sanē inter ipsa alia esui apta, alia me-
 dicaminosa existerent: sed tantū intensiōe aut remis-
 sione astrictiōis differrent. At non ita res habet: quū
 uideamus æris squāmam malo cydonio astringētem
 minus, gustu tamē eo longē insuauiorē existerē: quā
 gustus absurditatem proficisci: à uehementia astrictiō-
 nis, dicere id quidē non possumus. Si itaq; ut astrictio,

Gallorū veterū
 ius ventrē sub-
 ducit, caro au-
 tem cohibet.

Aloe lota aut
 nihil aut parū
 purgat.

ita etiam astringens unum perpetuò esset, sanè unum quoq; perēniter eius esset opus. Verūm quum præter astrictionem insuper alias qualitates, neq; paucas, sortiat, semper quidem omnibus illis ager: sed euidētius aliās per aliam, nempe uincentem: idq; ut ad corporis cui admotum est affectionem. Astringens igitur hac ratione, non est ei quod purgat contrarium: quāq; si quis illa esse contraria statuatur, nihil inde absurdum sequetur. Etenim in rosæ succo, aliud quidem grauissimum est, amurcæ & fæci proportionale; aliud leuissimum, & ipsum pportione respondens flori in quoq; succo supernatāti; aliud tertium, quale est quod in musto feruet: ad hæc quartum, ipsum uidelicet purissimū, ac syncerissimum, cuius hæc tria excrementa existunt. Euenit autem alios quidē succos aut acescere, aut corruptos putrescere: sola uerò, oleum, mel, & uinum, in longum tempus durare. Quare nec per ebullitionem, nec per secretionem in alijs succis, has excrementorū differentias inuenire perspicuò licet: uerūm protinus ab initio coctione quadam illis est opus, aut saltem ali cuius perdurantis succi mistura. Nam sic rosæ succum melli miscētes, aut totas rosas ei immergētes, reponimus. Quum autem rosa nō astringens modò, sed etiā dulcis atq; amara gustanti appareat, satis apertè ostendit, se habere illorum succorum quatuor miscellam. Quin etiam uel ex hoc tantūm, qd non extremè astringat, aliorum quoq; saporum misturam itelligere in ea possemus. Quippe si solus sapor austerus illi insit, summus itidem fuerit: quo modo si sola corpori cui piā caliditas summa inesset, id ignis utiq; foret: at si non summus, sequitur qd neq; etiam solus. In uniuersum enim contrariorum misturæ, summitates ipsas frangunt.

CAP. XV.

A Tq; in similaribus quidem corporibus calor, frigiditas, siccitas, & humiditas, particulares diffe-

Astringēs non esse contrariū purganti.

Rosæ partes quaternæ.

Succos alios acescē, aut cō putrescē, sola autē oleū, mel et uinum in lō gum tēpus durare.

Rosarum succum afferendi ratio.

Rosarū succū seruandi rō.

Sūmitates frangunt cōtrariorū misturæ.

Similariū inter se ac dissimilariū differentiarū vnde nascant.

rentias efficiunt: in dissimilaribus uerò acrimonijs, siccitates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritudines, faldedines, aquositates, & pinguitudines. Quare unumquodq; corporum simularium, hoc est, quæ non ex diuersis substantijs constant, in ipsis partibus non multas, sed unam ex his qualitatem obtinet: quod uerò totum est dissimulare, complures. Quarum hæ quidem astringunt: hæ laxant: aliæ aliam facultatem ostendunt, sic ut omnes quidem linguâ partibus diuersis, per contactus ratione, afficiant: affectio tamen ipsa, ex eo quod primò affectum est, in totam eam quæ celerrimè diffundatur. Cuius simile in tranquillis aquis uidere licet. Nam si in duas eius partes duos cōieceris lapides uno eodemq; tempore, ij sanè duos efficient circulos, qui mutuò per sese ferent, contrariosq; cernes in quauis ipsius aquæ particula motus. Quòd si unum pedem in calidam, alterum uerò in frigidam simul demittas, haud dissimile habebis etiam exemplum. Quippè in totum corpus utriusq; affectionis motus peruadit, contrarij; inuicem sibi occurrunt: id quod etià euenire autumo in lipyrijs, & hepialis febribus, nisi quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisq; affectus oriuntur. Si uerò parem absynthij portionem melli exquisitè cōmistam, lingue imponas, simul dulce & amarum, quod ex ambobus mistum fuerit, uidebitur: quum non alio tempore mellis saporẽ lingua ipsa sentiat: alio autem absynthij, sed utrumq; simul. Quemadmodum igitur ab alijs lingua afficitur, ita necesse est quæque aliarum corporis partium, ab eis similiter affici: etià si qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiando, aut non patiẽdo, ab alijs linguam differre est putandum, uerum eò quod ipsam familiarium affectuum, ob exquisitam sentiendi facultatem, nihil latere possit. * Ad quod sanè non nihil ipsius conducit raritas: sic enim succi facilius penetrant. Porro si solano & anthemide alicui parti simul applicitis, neque

Linguâ secundum diuersas partes a diuersis saporibus qualitatibus affici.

Lipyriæ feb.
Hepialæ feb.

Saporis qualitates afficiunt reliquas etiã partes, ut linguâ, licet non perinde ab iis percipiuntur.
Lingua cur sensum habet exquisitum.

ita densa, dura, tensa, liuidaq; reddatur, ac si solo usus solano esses; neq; adeò rara, mollis, tepida & rubens, ac si anthemide sola usus fuisses: sed dictorū mediam accipere affectionē particula conspiciatur, consentaneum certè est, utrūq; medicamentum secundum suā facultatem esse operatum: ac p̄inde particulam ipsam eodem tempore contraria simul perpeffam fuisse. Igitur quemadmodum mirum non est, * si à medicamentis compositis contrarij simul affectus corporibus infligantur, ita nec si à simplicibus: quum & ipsa sensui quidem simplicia appareant: natura autem composita sint. Siquidem quemadmodum nos in ijs quæ indies cōponimus, sic natura in simplicibus ipsis, contrarios temperare succos consuevit: quorū sanè actiones, si pari facultate & portione ipsi in mistura coeant, euadent similes: si dispari autem, diuersæ. At uerò, ut astrictio quidem una res est, ita astringens, duplex. Aliud quippe summum existit, ut alumen & galla: aliud autem, q̄ astrictiois sit particeps, ut pirum, uinum, et rosa: nam huius minimum est id quod astringit: quare medela existit inflammationum.

C A P. XVI.

Rosaceum uerò (utpote cuius natura olei roseq; in medio est) in inflammationum augmētis, hoc est in illarum medio, optimum est præsidium. At oleum commodum est, ubi inflammationes maximè uigent. Etenim per initia repellere cōprimereq; influxus oportet: in uigore autem, ita per halitus digerere, ut morsus absit: at in incrementis, repellere simul ac digerere. Vtrūq; autem rosaceum præstare potest. Nam præter q̄ q̄ tenuium est partium, leuem quandā astrictionem sortitur, nimirum inter oleum & rosam existens medium. Quippè medium omne ex cōtrarijs mistum existit, ijsq; totis per tota contemperatis, aut p̄ exiguas particulas, sensum effugientes eorum quibus admouē

Simplicia medicamenta affectus contrarios gignere nō est mirū cū natura composita sint.

Adstringēs duplex.

Rosaceum quā cōueniat inflammationibus. Inflammationū curatio.

Rosacei facultas.

Mediū oē ex contrariis mistum existit.

tur. Etenim quæ magnopere austera, acerbæq; sunt, primo statim contactu superficiem densantia, honorem ingredi prohibent. At quæ modicè astringunt, cæterum plurimùm in se continent essentia tum tenuis, tum tepidæ, tantùm abest, ut præ astrictione ingredi altius corpora admota prohibeant, ut etiam ab ea, magis scilicet impellente, iuventur. Quæ autem penitus tenuia calidæq; sunt, magis digerunt humores ex corporibus quibus admoventur, quàm alios ipsa apponant. At quæ frigida sunt & essentia crassioris, omnino nullum introducere humorem queunt. Quæ itaq; humida, tenuia, et modicè astringentia sunt, ea inter omnia humectantia efficacissimè humectant.

Humectare quæ possint omnium efficacissime.

C A P. XVII.

Calor innatus ad quid conducit.

Frigida & deletæria medica menta, cur citius, magisque in calidis naturis uim suam exerant

AD hæc autem omnia, non mediocriter confert innata nobis caliditas, & intro ad sese attrahens, & comminuendo extenuans. Hinc est quod frigida deletæriaq; medicamenta, utputa cicuta, papauer, hyoscyami semen, mandragora, & alia id genus, citius magisque in calidis naturis uim suam exerant. Nam quum sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigerent, necessum sanè est, ut intro comminuta ingrediantur: id quod ex sua natura prestare nequeunt, crassa & inepta ad motum quum sint. Quare ascititiam caliditatem requirunt, quæ in minuta extenuet, ac ueluti manu, ducat in subtiles meatus. Itaque si quando ea absint, cunctantur, in maioribus hærentia meatibus, in ipsisq; fluctuantia arterijs & uenis, temporis spatio aliquid perpetiuntur. Siquidem qualitates omnes quadantenus in sese agunt. Nam et lapis ab assiduo stillicidio excavaat, gladiusq; cetera secando hebescit. Quoadu igitur solidæ partes (à quibus perficiuntur actiones) à refrigerantibus medicamentis nondum refrixerint, tandiu animans superfit, est necessarium; refrigerari autem nequeunt, prius quàm illa subierint proprios harum meatus, id quod sua ex natu

Qualitates omnes quadantenus in se mutuo agunt
Lapis ab assiduo stillicidio cauatur,
Gladius cetera secando hebescit.

ra non possunt. Deducit quippè succos, ut causa quidē primaria, arteriarum attractio: ut secundaria uerò & materialis, ipsorum tenuitas: qua destituta quum sint, frigidiora & crassiorum partium medicamenta, ijs opus habent, quæ præbeant. Cæterum corpora frigidiora, tractum arteriarum imbecilliorē possident, medicamentorumq; substantias cōminuere nequeunt: proinde medicamenta ipsa cunctari est necesse, processuq; temporis tum immutari, tum concoqui: quod solet succus lactucæ. Qui si integer ad cor perueniret, nō secus ac cicuta perimeret. Hæc igitur & similia, nisi celeriter perimant, nullius tandem effectus redduntur. At quæ aut erosione aut putredine enecāt, ijs ut tempore uires acquirant, accidit: quū temporis spatio putrescant omnia, eoq; magis, quo fuerit humidior atq; calidior locus. Merito ergo fit, ut quæ frigore suo noxam inferūt, ijs actionis celeritas ad perniciē proficiat: quippè quæ alioqui spatio excalfacta, uim per quam agebant, perdant. At quibus in putredine actio consistit, ijs tempus actionē adauget, quoniam et putredinem. Nullum autem animal interire potest, nisi cor ab agendi munere cesset: at fieri ut cesset non potest, citra maximam intemperiem. Cicuta itaq; hominem ē medio tollit, tum ob meatuum amplitudinem, calorisq; multitudinem, tum ob ualidam arteriarum in attrahēdo uim, usq; ad cor ipsum perueniens. Sturnos uerò ob causas contrarias haud enecat, ut putā quum & retineatur, & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui, præparariq; à corde patiatur: quemadmodum & in ipsis lactucis accidit, quæ moderate quidem sumptæ, alunt hominē: si uerò quispiam expressum earum succū largiter hauriat, non secus proculdubio morietur, q̃ qui aut cicutam, aut papauer sumpserint. Ad eundem quippè modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit: sturnos autē tarditate ipsa, nutrit. Sin autem

Succi a quibus deducātur per corpus.

Lactucæ succus, si integer ad cor perueniret, nō secus ac cicuta perimeret.

Deleteria quæ putrefaciendo enecāt, quomō ab iis differāt, quæ sua extinguūt frigiditate

Interire nullū aīal posse, nisi cor a munere agēdi cesset. Cicuta cur minime sturnos enecat,

Lactucæ succū liberaliter sumptum, esse letale,

Vetula quædã
Atheniẽsis ale
batur cicuta.
Cõsuetudo est
adscititia natu
ra.

exiguum quippiam sumatur, mortẽ homini haudqua-
quã inferet; id quod anus illa Atheniẽsis experimen-
to docuit, q̃ ab exigua cicutę portione aulpicata, nullo
detrimento ad permagnam progressã est copiã: adeo
consuetudo uidetur esse adscititia natura.

C A P. XVIII.

Necãtia frigo
re, nõ genere,
sed sola quãti-
tate dicunt le-
talia, cõtra q̃
ea q̃ putrefaci-
endo aut ero-
dẽdo iterimunt.

EOrum ergo medicaminũ quæ frigore interimunt,
nullum genere letale est, sed sola quãtitate: quum
si exigua portione sumantur, mortem non inferant. At
in erodentibus, putrefaciẽtibus, & calfaciẽtibus, haud
ita res sese habet. Ad hæc, quemadmodum frigida me-
dicamenta, nisi calorem offendant ualidum, qui cõmi-
nuat atq; deducat ipsa, non perimunt, sic si quod com-
minuit deducitq; multo ualentius fuerit, deuincet, pr-
sus, mutabitq;, ac alimento ut sibi sit medicamen-
tum, efficiet.

C A P. XIX.

Medicamenta
calida & frigi-
da a nobis su-
munt initium
actionis sue, ac
pinde potesta-
te dicunt talia
Cicuta si cum
modico, & mi-
nime generoso
uino bibatur,
oculus perimit
Vinum uetus,
generosumq;, &
calidũ, auxi-
liũ ut uenenis
refrigeratibus
Vinũ refrige-
ratis cibis uti-
le, quale nã eẽ
debeat.

QUum igitur medicamenta refrigerantia quadã-
tenus à nobis accipiãt suã refrigerãdi uim, sicuti
et calfaciẽdi calida (neq; enim quicq; moliri possent,
absq; corporis patientis auxilio) iure potestate dicunt
frigida Nam ut actu nos refrigerent, nõ prorsus ex sese
obtinent. Ea propter meconium & cicuta, si cum mo-
dico eoq; minime generoso uino bibantur, oculus qui-
dem interimunt. Si quis uerò papaueris succum, quã-
tus interficere potest, hauserit, ac etiãnum tamẽ super-
sit, huic largẽ epotum uinum uetus generosumq; & ca-
lidum auxiliabitur. Cæterũ quod tenui pellucidaq;
substãtia est, colore uermiculo aut flauo, odore gratũ,
quodq; multam aquæ misturã postulat, id tum admo-
dum excalfacere est natum, tum facilẽ undiq; per cor-
pus uniuersum deferri. Tale ergo natura uinum, ætate
uetus, multum, atq; impermistum, non modò perfri-
generatorum omnium, sed eorum etiam qui aut ex oris
uentriculi, aut cordis dolore, animi deliquium patiun-

tur, præsentanem remedium existit.

C A P. XX.

A Teorum medicamentorum quæ erosione atq; putredine interimunt, pleraq; sanè perinde utiliorum quæ potestate dicuntur calida, actu etiam calida existunt, sed iccirco nos fugiunt, quoniam aut ipsi plurimum habemus caloris, aut crassa est ipsorū substantia. In balneo quippè urina nobis uidetur frigida, quemadmodum argentibus, hyeme, aqua putealis, calida: cæteris autem frigida. In summa enim, pro suo unumquodq; affectu, admota consuevit sentire corpora. Sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acervum immiseris, luculenter calorem percipies. Sin calidam, nequaquam. At si columbino stercore accumulato, potissimum columbarum sylvestrium, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, fori, chalcitis, ærugo, calx, aliaq; id genus innumera, si illis acervatis manum altius injicias, protinus uidebuntur excalfacere. Cæterum si bolum ex eis unum acceperis, cuius extrema superficie ab ambienti fuerit refrigerata, meritò nulum percipies calorem. Quā ob rem fieri etiam potest, ut quæ respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, ea secundum alterum animantium genus calida esse actu uideantur.

C A P. XXI.

Q Væ igitur nos contactu per putredinē aut erosionem enecant, ea recta quidem ratione, deleteria humanæ naturæ toto genere existimantur: non ut refrigerantia, quātitate duntaxat. Hæc enim interdum uincuntur & nutrimentum animali redduntur: putrefacientia autem, uel si sumantur portione minima, omnino tñ corrumpunt, quòd uidelicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humiditateq; putrescant: calidus autem humidusq; sit sanguis. Proinde longo etiam post

Quisq; p suo affectu admota cōsuevit sentire.

Deleteria humanæ naturæ quæ sint.

Putrefacientia vel si sumatur portione minima, corrumpūt animal.

tempore à quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quæ crassa terrenaq; essentia sunt prædita.

C A P. XXII.

Erodentia.

Interdum autem ipsa erodentia medicamēta adeo exigua sumuntur, ut excerni cum excrēmentis possint, prius q̃ iniuria corpus efficiant. Interdum etiam qui illa sumpsit, opportunis remedijs usus, asseritur. Nam ubi gravis ab his noxa illata est, malū ipsum sisti nullis præsidijs potest. Ceterū cantharides medicamentis diureticis commodè permiscentur, sicuti alexipharmacis alia pleraq; letalia. Feruntur enim alioqui sponte sua per urinam ad uesicā cantharides, ac sic rodendo illam exulcerant, nisi ubi copia modica induntur. Ex quibus patet, quæcunq; frigiditate interimunt, si exigua sumantur, nutrire corpus posse: at quæ putrefaciendo, nequaquam: quum naturæ humanæ aduersentur.

Cātharidas cōmode misceri diureticis.

Alexipharmacis commodè misceri interdū letalia.

Cātharices uesicā exulcerāt.

C A P. XXIII.

Medicamētis multas diuersi generis imitas esse substantias.

VTigitur in alimentis mistos esse uarios sapores diximus, sic in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias facile, si consideres granum cnidium solū hoc à cnico differre, q̃ plurimum habeat caliditatis. Porro attractio quæ in ipsis cernitur, à qualitatū proprietatibus, quæ sunt in substantijs, perficitur. Idcirco purgantium medicamentorum ubi fortè purgatione frustrantur, quædam præter quàm q̃ noxam corpori nullam inferunt, etiam alimentum corpori præbent: alia uerò in corruptionem ac uenenum uertuntur. Omnino siquidem medicamentum purgans, uel cum uno saltem humorum, qui in nostro corpore sunt, similitudinem habet: non autem perpetuò mista est uis uirosa. Quamobrem nec perpetuò, licet non purget, iniuria afficiet, uerū & concoctionem admittet, talemq; producet humorem, qualem erat natum educere.

Purgantiū medicamētorum discrimina.

Purgantia, ubi a natura uincuntur, talē gignūt humorem, quā itē dūcturā erāt

Pleraq; itaq; attractiones fiunt qualitatis familiaritate: ac proinde singulæ animalis particulæ familiare sibi alimentum attrahunt: ad quam sententiam sequitur medicamenta purgantia familiaria esse purgandis humoribus: quodammodo efficaciora, ualētioraq; sicuti magnes ferro: quippe qui ad ferri naturam accedit, reperiaturq; in ferri fodinis, eiq; specie magnopere sit persimilis: uerum fortior est quodammodo, ut attrahere sit aptior, quàm trahi. Cnicus etiam (quē carthamum uocant) colore quidem pituitæ similis, calore illā superat, sic ut trahere q̄ trahi sit prōptior. Ad eūdem modum granum cnidium, si quando à corpore nostro uincatur, uice purgationis alimentum efficitur: uelut ueratrum semper coturnicibus. Verū enim uerò quoniam attractiones, substantiarum similitudine fiunt, necessum est, ut si quod purgatur pituita est, id quod trahit sit non pituita, sed pituitosum. Differt siquidem similitudo ab identitate.

CAP. XXV.

Ad hæc purgantium medicamentorum quædam iam auctu possident idoneam ad attrahendum similitudinem: quædam ab animantis illam corpore accipiunt. Præterea in unoquoq; medicamento, permixti similibus sunt aliq; succi dissimiles, qui partim quidē medicamētosi sunt: partim minimè. Quare ubi purgationem hæud assequuntur, quædam in perniciem: quædam in alimentum uertuntur.

CAP. XXVI.

Cæterum ubi purgās pharmacum usq; adeò inuauit, ut in uasorum ad uentrem pertinentium osculis mordicationem apertionemq; multam relinquat, assidueq; irritans, conuellensq; corpora, uasorū facultates dissoluat, uacuationes immoderatæ contingunt: ita ut si quod pituitam educit medicamentum

Purgantia medicamēta esse familiaria purgandis humoribus.

Magnes ferro est specie similis, eo tamē fortior.

Cnicus est pituitæ similis.

Veratrum alit coturnices.

Attractiones fieri substantiarū similitudine. Similitudo differt ab identitate.

Purgantiū medicamētorum differentiæ

Vacuationes immoderatæ quæ & quomō accidunt.

exhibitum fuerit, prima quidem omnium ipsa euacuetur: dein flaua bilis: mox atra: quarto deniq; loco sanguis. At si quod flauam bilem detrahat, pituita consequetur, post quam atra bilis: quartus demum reddetur sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam eliciet: post quam, flauam: dein pituitam, ac omnium ultimò sanguinem, tanquam ex inanimis uasis effluentem; ut quæ summa iam imbecillitas occupet, quæq; ad extremam osculorum apertionem peruenint. Ex quibus manifestum est postremum in imo-
dicis purgationibus uacuari humorem qui familiarissimus est: aliorum autem singulos, prout crassi existunt, aut tenues.

C A P. XXVII.

QUum igitur uascula non amplius in se continere succos possint, & oscula eorum reclusa fuerint, neq; irritare medicamētum desinat, nec possit amplius familiarem succum attrahere, necessum est reliquos quoq; , quo diximus ordine, sequi. Fit autem orificiorū apertio, ob medicamenti uiolentiā, ob quam uidelicet mordicatio etiam puenit.

Vasorum autem imbecillitas, tum ob ingentem defatigationē, tum ob intemperātiā, quæ imo, dicis purgationes præcedit.

Galenī

Sanguinē uacuari omnium vltimū, ceu naturę familiarissimum.

Vasorū refertio, imbecillasq; unde accidāt.

GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber IIII.



CONSTAT igitur uniuersas corporis partes perpeti afficiq; ab alternantibus qualitatibus, quemadmodum lingua afficitur: sed passionum sensum non exactè percipere: at linguā ob pfectionē quā habet sensus, posse naturas earū omnium dignoscere: tamen si passionum similitudinem inuenire sit etiam in alijs partibus uniuersis, ac precipuè in exulceratis: Quandoquidem cutis duritas densitasq; prohibet, quo minus foris incidentiū facultates intrò in carnem penetrēt.

CAP. I.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est: Viceribus frigidum mordax: tamen si cuti prius q̃ exulceraretur, mordax nequaquam esset. Porro quæcunq; frigus contingit, eorum & contrahat, & condenset, & constringat substantiam, primumq; tenues tum excernantur humiditates, sicuti ex oculis lachryma, ex naribus mucus, necesse est: postea uerò etiam mordax appareat, licet alia ratione, q̃ in calido. Nec enim erodendo quod continuum est, sed diuellendo, mollemq; substantiam in arctū contrahendo, ac breuiter ipsius partium continuitatem per diuulsionem soluendo, molestū, ac mordax est frigidū. Cæterum ut in his protinus cōtractionis condensationisq;: sic in illis quæ calore suo mordicant, dissolutionis & fusionis sensus percipitur. Ad hæc in refrigerantibus quidem, utcūq; tardior est atq; cunctantior mordacitas; in excalfacientibus ue-

Viceribus frigidū mordax.

Frigidum quia
ratione sit mor-
dax;

*Mordicātium
alia sunt facul-
tate calida, alia
frigida.*

rò q̄; celerrimè penetrat. Quam ob rem medicaminū
mordicantium, alia sanè calida facultate, alia necessa-
riò sunt frigida. At quæ moderatè calida sunt, quæq;
temperata potius q̄; calida dici deberent, ut poculum
atq; balneum, dum mediam temperiem sortiuntur, no-
bis grata & amica existunt. Funditur enim p̄ ea, quod
in corporibus nostris constiterat atq; concretum fue-
rat, unde animantibus uoluptas maxima oritur. At si
quis in eis immoretur diutius, sensim quidem et ipsa
molesta euadunt, idq; non q̄; mordicatione infestent,
sed, quòd! substantiam nostram, soluentia digerentiaq;
deliquium animi, ac tandem mortem inducant.
Quæ autem his calidiora sunt, secāt, distrahuntq; sub-
stantiam: quare necessariò mordacia uidentur, ut tum
aqua feruens, tum ignis. Igitur subiectam materiā con-
trahere, condensareq; frigidi semper est proprium: fun-
dere autem atq; liquare, calidi: utriusq; uerò immode-
ratus aucti, communis est mordicatio. Verū quæ
summa frigiditate, aut caliditate absunt, minimè cutē
mordicant. Plurimum autem ad id genus affectiones
facit essentia medicamentorum uel tenuitas, uel crassi-
tudo. Siquidē frigida quæ tenuium partium sunt, quā-
magis in profundum transeant, uehementius mordi-
cant. Calida uerò quæ crassarum sunt partium, quo-
niam plus ulcerant, uehementius iccirco affligunt. Te-
nuiorum itaq; partium aer est: crassiorum terra: me-
dium eorum tenet aqua. Sed aer accensus fit flamma:
terra autem pruna: at aqua, uehementem sanè calidita-
tem recipit, sed nec flamma nec pruna, propter innatā
humiditatem, efficitur. Siquidem flamma & pruna,
ignis sunt genera: ignis autē omnis, calidus est & sic-
cus: at aqua sicca ut sit, fieri nequit. Nullum autem est
adēd calidum pharmacum, ut flamma, aut pruna, aut
aqua ferueus. Procedit tamen usq; ad uersionē ipsa me-
dicamentorum caliditas, ubi in crassa consistit essen-

*Condensare ma-
teriam frigidi
semper est pro-
prium.*

*Liquare est p-
prium calidi.*

*Aer accēsus fit
flamma.*

*Terrā accensa
fit pruna.*

*Ignis gñā sunt
flāma & pru-
na.*

*Aqua esse sic-
ca nō potest.*

ti. Quæ uerò subtilium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calfaciunt dūtaxat. Est ubi mordicent, non tamen urant.

C A P. II.

Porrò quæ celeriter in tenuia soluuntur, tenuiū dicuntur partium: quæ id perpeti nequeunt, crassarum. Quodd ergo ea soluantur, calor animalis, cui applicantur, est causa: quodd in tenues crassas ue partes cōminuantur, id à propria natura obtinent. Quocirca refrigerantium medicaminum ea quæ crassarū sunt partium, mordicare nequeunt, q̄ extimam cutis superficiē penetrare non ualeant. At quæ tenuium sunt partium, maximeq; si inæqualem temperiem sortiantur, ualenter mordicant. Sed supra demonstratum est inæqualia esse propemodum omnia: ubi ostenderemus & in uino, et in oleo, quatuor reperiri succos diuersos, i summaq; uniuersa medicamēta facultatibus contrarijs cōstare. Enimuerò acetum, tametsi ingenitam uini caliditatem amiserit, ex putredine tamen sibi aliā adeptū est. Quippè uinosę uini partes, dum ipsum in acetū trāsit, refrigerantur: at aqueum recrementum putrescens, ascititiam caliditatem acquirit, ueluti quæ putrescunt omnia: sitq; acetum quiddam ex cōtrarijs facultatibus mistum, partim refrigerantibus, partim calidis, sicuti ustorum lignorū omnes cineres, qui ex adustione nō nullas partes igneas conseruāt, quas macerati postea solent in aquam deponere. Hanc enim aquam marine & muriæ per omnia correspondentem, uulgo Lixiuū appellant. In uniuersum autem, quod tantū est acidum, quicquid id fuerit, planè frigidum est, eoq; uti cōtra omnes calidos affectus commodissimè poteris: ut omphacij succo. Qui quidem quū omnino acidus sit, perfectè etiam refrigerat, uniceq; ardoribus prodest, inimicus affectionibus frigidis, quemadmodum omnia exquisitè refrigerantia. Ea autem quæ quum acida

Tenuiū et crassarū partiū q̄ esse dicantur

Mordicā quæ ualeant.

Medicamenta oīa facultatibus cōstant cōtrariis.

Acetum ex cōtrariis facultatibus cōstat.

Lixiuum.

Acida oīa sunt frigida, quatenus acida sunt Omphacii facultas

Acida frigidi-
tas, tenuiū est
partium.

Astringens fri-
giditas crassa
rum est partiū.

sint, habent etiam saporem quēdam acrem permistū, qualis planè inest aceto, haud dubiè nonnihil caliditatis possident. Verūm si frigiditati astrictio coniuncta sit, aliud est frigiditatis genus. Quippè acida frigiditas tenuium est partium: at astringens, crassarum.

C A P. III.

Non igitur sola ratione per methodos logicas nos exerceri oportet, sed exercere etiā sensum in saporibus singulis: quod fiet, si omnia ea sedulò experiamur lingua, quæ unamquāq; qualitatem præ se ferunt manifestissimam. Ut si acrimoniam cogitatione cōplecti uelis, in allio, cæpis, atq; his, simililibus, ea sepe gustando, te exerceas oportet. Sin astrictionem, in galla, rho, & similibus. Si amaritudinem, tum in nitro, tum felle. Si qualitatem saporis expertem, in aqua immuni ab omni qualitate ascititia. Nam hinc exorsus, promptius ad aliorum obscurorum omnium saporū cognitionem peruenies.

C A P. IIII.

SIn autem qualem præbet sensum aqua planè omnis qualitatis uacua, talem in re aliqua sicca inuenias, ea nimirum mediam cōstitutionem sortietur: aut certè ad frigidius paululum inclinabit. Quòd si talis quum sit in caloris & frigoris differentia, in super consistentiam nacta sit siccā, terrestris sit, ac citra morsum desiccet, est necesse. Atq; huius generis medicamēta omnia medici appellant emplastica.

C A P. V.

Duplex autem est emplasticorum natura: altera exactè terrea & sicca: altera uiscosa quidem omnino, sed ex aqua & terra, & plerumq; etiam aere, commista, sicuti oleum dulce. Hoc si quidem ex aerea, terrea, aqueaq; essentia conflāt. At oui albumen, ex ipsēdē quodāmodo, sed magis terreū est oleo. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoq; est: & suillus

Sensus quo pa-
tē exercet de
beamus.

Emplastice
dicamēta quæ
dicantur.

Emplastice
natura duplex

Olei partes.

adeps. Nam tauri: & hirci pinguedo, acrimoniam & multam, & igneam possidet: bouis item, ouisq; adeps acris existit. Porro anseris & gallinacei calidior est pinguitudo, & siccior q̃ suum; necnon subtiliorum partium, & minimū terrestris, sicuti & auum omnium. Quæcunq; ergo pinguedines nondum ullā nactę sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros possidēt facultatem: eamq; tantò efficaciorē, quātò sicciores, magisq; terrenę fuerint. Huiusmodi enim est cera elota, quæ ex melle tum aquosiore, tum minimè mordaci conficitur.

CAP. VI.

A Stringentia porro terrena sunt & crassa corporis consistentia: qualitate uerò frigida. Acida autem, tenuitate pollent corporis, sed perinde ut astringētia refrigerāt. Etenim arborum fructus, quotq; nobis, ubi maturauerunt, dulces apparent, nuper enati, acerbisicciq; sunt consistentia: progressu uerò tēporis, humidiores redduntur, acquiruntq; ad acerbitem, aciditatem quādam: quam exuentes sensim, postea dum perficiuntur ac maturescunt, dulces euadunt. Sunt qui non in arboribus, sed postea q̃ repositi aliquandiu fuerint, dulcedinem indipiscantur. Alij non interueniente aciditate, paulatim in dulcedinem transeūt. Omnes tamen coquuntur & maturescunt calido: quod quidem duplex existit: alterum nempe & proprium, & cuiq; in genitum: alterum externum, à sole uidelicet, sed nature ipsorum conueniens & familiare. Si igitur quū initio acerbis essent, tempore maturescētes dulcescunt, sequitur ex calore ipsis prouenire dulcedinem: acerbitem uerò, aciditatemq; ex frigore. Ad hæc etiam, initio quīdem lignosi quum sint, necnon sicci & acerbis, postea uerò humore adueniente reddantur acidi, palam est, saporem acerbum acido magis terrenum existere. Quin etiam, si ab acerbis sapore manifestè linguam cō-

Adipis differentie.

Cera elota est emplastica.

Astringentium natura.

Acidorum natura.

Fructuum sapores.

Fructuum differentie.

Fructus oēs coquunt, et maturescunt calido.

Calidū duplex

Acerbus sapor acido magis terrenus existit

**Acerbus sapor
est frigidus.**

**Acerbi & aci-
di saporis di-
scrimen.**

trahi, siccari, asperariq; contingit (quæ unius frigidita-
tis sunt opera) liquet planè frigidum esse saporem acer-
bum. Quoniam uerò inæquabiliter etiam desiccat (id
enim est quod exasperat) fuerit utiq; omnino etiam ter-
renus: nam aqueus, omnia æquabiliter penetrat. Præ-
terea, uelox quidem acidorum saporū transitus in par-
tibus sit sentientibus: acerborum autem tardus: tum
acida quidem in alto magis agere apparent; in superfi-
cie autem acerba. Quæ omnia, crassarum esse partium
acerba indicant: acida uerò tenuium. Ceterū utraq;
dicuntur astringere, tum quæ acerba sunt, tum quæ au-
stera: sed in maioris minorisq; ratione differunt. In-
sunt autem ipsis medicamentis qualitates complures,
non diuersæ modò, sed pugnantes etiam, atq; interim
subcontrariæ. Quare ubi astringentium, exempli gra-
tia, diligenter explorare actionem contendis, ea tantū
disquiras, quæ gustui exquisitè acerba uidentur, nul-
lamq; saltem manifestam habent qualitatem admistā.
Quæ quidē ubi nactus fueris, tū in optima sanorū cor-
porū pstitutiōe, tū in affectibus simplicissimis, de illis
facies periculum. Nam si corpus sanum manifestè cer-
natur refrigerare, & calidis profit affectibus, intrepidè
sanè poteris, de astrictione ipsa, q; refrigeret, pnuincia-
re. Sin contra appareat, taleq; medicamen acerbum in
illis conspicuam caliditatem inducat, calidum natura
putandū est, in cæterisq; saporibus pari iudicio expe-
riundum. Ego uerò, etsi facultates medicamentorum,
uel citra sapores, sola experientia noscunt, usus tamen
prædicta methodo, omne exquisitè astringens, frigidū
perpetuò comperi: nōnullaq; modicè dulcia, aut ama-
ra, aut acria, simul cum astrictione sum expertus etiā
apertè refrigerantia. Item quæ astringunt pariter atq;
acida sunt, ea quoq; manifestè refrigerare experientia
didici. Sola uerò dulcia omnia pro dulcedinis modo,
protinus etiam calorē cōtinent. Quocirca eorum quæ

**Astringens oē
exquisite, esse
frigidum.**

admodum dulcia sunt, nullū omnino est frigidum. At amara omnia, calidam possident facultatem.

C A P. VII

Austerus igitur sapor, exolutus acerbus est. Quū autem corpus acerbum, terreum sit atq; frigidū, tripliciter necessariò exoluitur: nempè aut incalescēs, aut humescens, aut utrunq; simul perpetuens. Si ergo incalescat dūtaxat, solidā dulcedinem contrahet, qualis castaneis inest. Sin tātū humescat, si quidē ea crassum sit partium, et aquea humiditas, austerum euadet: sin uerò aëria, acescet. Si pariter humescat et calfiat, humiditate quidem aquea, in dulcedinem: aëria uerò trā sibi in pinguitudinem. Ac sanè secundum propositarum qualitatū mīsturas, uarias fructus mutationes sortiuntur. Cæterūm acerbus ad extremū perseuerat fructus ilicis, arbuti, fagi, & corni. Acerbus simul & dulcis, myrti fructus est, piri agrestis, & roboris. Austerus una & dulcis palmarum fructus. Pinguis exatē, tum fructus, tum succus oleæ.

C A P. VIII.

Quicūq; ergo fructus oleosi dūtaxat sunt, edēdo iij sunt, & dulces. Quibus uerò alterascentibus amaror aduenit, iij edi nō possunt. Quippè amarū omne edi nequit, talēq; efficitur à caloris excessu. Verūm dulce omne calidū est, nec immodicè calorem nostrū exuperat, sed inter limites se continet fundentis, leuigātis, mollientis. Quum autem qdam sint quę una: quędam quę duabus in sese qualitatibus & agunt & patiuntur: quędam uerò etiā totis substantijs suis: in horum certē numero medicamēta non pauca ponuntur: sicuti & nutrimenta uniuersa: quorum duplex est genus. Siquidem quędā sunt pingua, ut ipsa pinguedo: quędam dulcia, magis minus ue: ut omnia illa quibus nutrimur.

C A P. IX.

Dddd iij

Dulcium esse nullū frigidū. Amara omnia calida.

Acerbum corpus exolui tripliciter.

Acerbitatis in alias qualitates mutatio.

Saporum differentię in variis fructibus.

Fructuū qui nā sint uesci, & q minime.

Amara edi ne queunt.

Dulcis saporis natura.

Nutrimentorum duplex genus.

Nutrimētū oē
esse dulce.
Nutritio quid.

Nutrimēta eē
mediocriter
calida.

Iucundum esse
duplex gener.

E St tamen & pingue ipsum, & quicquid nutrit, dulce. Nam quum nutritio euacuati repletio sit: quod euacuatum autem est, familiare & benignum esset: certè etiam id quod nutrit, familiare, iucundū, & amicum sit est necesse: ac proinde calidum modicè, re spectu illius quod nutrit. Sed in hoc non parua est maioris minorisq; ratio: quandoquidem nec ad cibos accedimus exactè secundum naturam affecti. Corpus si quidem eorum qui cibos appetunt, sit dūtaxat inanitū oportet, si absoluti futuri sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores. Nam si præter id calidiores q̄p cōueniat, aut frigidiores euaserint, non solum quæ nutriāt, uerū etiam quæ refrigerent aut calfaciant, postulabūt. Quocirca cibi quoq; illis aliàs aliq̄ iucundiores uidentur. Nam quum duplex sit genere iucundum: alterum quod impleat id quod uacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum: alterum quod medeatur ei quod alteratū est, id quod medicamentum existit: euenit utiq; cibis, ubi non modò uacuatīs exhibētur corporibus, sed eiā qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent: ut cibi scilicet, et ut medicamenta. Quamobrem nec eduliorum nec medicamentorum una est animantibus oībus species: siquidē p̄ sua unaquæq; familiari substātia simul et affectione, tū delectant, tū iuuant ab utrisq; Sed si hæc sic habent, id qd̄ in cibis minus erit dulce, mirus quoq; erit calidum: quod dulcius, tantò nimirum erit calidius, quantò uidelicet dulcius: sin ad immodicum recadat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam apparebit amarum.

C A P.

X.

Dulcedo a moderato calore
prouenit.

E Tenim ut à moderato calore bifariam cuiq; corpori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio & insito calore dulcia, partim uerò ascititia: ad eundem modum amara. Alia nāq; sunt, quæ suapte natura exalfaciunt: alijs autē id accidit ab acquisititia ca.

lore accensis. Porro dulcia omnia proximè accedunt ad naturam eorum quibus apparent dulcia: idq; aut proprio calore, ut mel; aut acquisitio, ut sunt omnia q ab igne præparantur. At multum non suo modo, sed etiã ascitio calore dulce esse uidetur. Siquidem haud parum ueluti ardoris ex solari calore tũ acinis, tum alijs inest fructibus: à quo id quod illis aqueum ac ueluti semicoctum inest, ad concoctionē ducitur. Nam ex quibuscunq; pomis, si succũ exprimas, eum protinus non secus atq; mustum feruescere deprehēdes: tanto tamē feruoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diuersitas. Cæterũ ubi quod semicoctum erat, transmutatũ iam fuerit, euaueritq; is q excitabat feruorem calor, iam tum deniq; synceræ succorum proprietates cernũtur, propriaq; uinorum natura agnoscitur. Iam uerò, quæ inueterantur uina, omnia calidiora redduntur: ac primũ quidem quandam dulcedinem acrimoniamq; asciscunt: q uerò prius inerat illis astrictio, austeritasq;, tẽpore ipsam deponũt. Dein rursus acrimonia crescente, dulcedinem indies abijciunt, paulatimq; amarēscunt. Vnde constat dulce esse calidius austero, sicuti & dulci amarum. Atqui si uerũ est dulcedinē puenire à moderatione caloris, pater astrictionem à frigido uincente perfici.

CAP. XI.

VT igitur uinum acerbum, tẽpore dulcius primũ: mox acrius amariũq;: ultimò uerò planè amarũ naturaliter redditur: ad eundem modum quod ueluti rigorem præter naturam perpessum est, protinus acidiũ efficitur: ac si prorsus refrigeret, acēscit penitus. Præterea quod in uindemia ipsa p assiduam pluuiam, aliena humiditate fuerit imbutum, leui occasione acēscit. Contrà uerò accidit ijs quæ talia quum sin, igni admoventur: nam & protinus, & progressu temporis dulciora reddunt: tandemq; si pdurauerint, alijs

Dulcia, proximè accedunt ad naturā eorũ quibus talia uidentur.
Mustum.

Succũ cuiusuis pomi feruescere, ut mustum.

Vina uetere, calidiora.

Dulce est calidius austero.
Amarũ esse calidius dulci.
Astrictio à frigido oritur.

Vina igni admodum, dulciora reddi.

Matūratio fru-
ctibus oībus a
folari calore, p-
uenit,

Aceti facultas

Omphaciū &
acetum in qui-
bus differant.

Acetū magis
refrigerat q̄
mel calefaciat

Fructus oēs in
primo sui ortu
esse acerbos,

similiter amarescūt. Quum itaq; omphax sit acida, uua-
uerò dulcis, ac fructibus omnibus maturatio à sola-
ri calore proueniat, planum est, imperfectius & frigi-
dus esse quod acidū; perfectius uerò & calidius, quod
dulce fuerit. Cæterū diuersis uiribus acetū atq; suc-
cus omphacis constant. Nam acetum proprio quidem
uini calore, est frigidum; ascititio autem, contractoq;
ex putredine calidum. At omphacis succus calorē non
habet; ac proinde nec acrimoniam. Præterea ompha-
cis succo acetum tenuius est. Quamobrem frigiditas q̄
ab aceto infligitur, excellit eam quæ procedit à succo
omphacis, idq; & uehementia, & mistione. Nam tam-
etsi succo omphacis, ne minima quidem caliditas isit:
aceto autem acrimonia quædam excalfaciens; hæc ta-
men satis non est, ad superandam ab aciditate proue-
nientem frigiditatem: sed potius ueluti sternens uiam,
atq; aperiens meatus, illius celeritatem promouet. Ca-
liditas si quidem quæ à præcedēte aceti acrimonia ori-
tur, protinus à frigore insequētis aciditatis extinguit,
ita ut multò maior ex aceto frigiditas percipiatur. Ad
hæc autem si pari mole acetum melli permisceas, aceti
frigiditas superabit mellis caliditatē: eoq; magis, quo
fuerit maior aceti copia. Quod si multò plus mellis q̄
aceti indideris, parem calorem atq; frigiditatem in ea
mīstura comperies. Siquidem multis numeris acetum
plus ab ijs q̄ moderatè sunt calida, ad frigiditatem rece-
scit, q̄ mel ad caliditatem. Porrò omphacis succus, qui
& ipse (ut omnes fructus i primo sui ortu) est acerbus,
ad ardentia hypochondria longè p̄stantior est, q̄ ace-
tum: q̄ nec uiolentam, nec ferientem, nec mordaci ca-
lori iunctam frigiditatem sortiatur.

CAP. XII.

Porrò q̄ uina quædam inualida Vere atq; æstate
acescāt: quodq; uehementius mota in meridianisq;
locis reposita, idem etiam patiantur; contrà uerò hyc-

me atq; uersus aquilonem defossa, integra & secundū suas uires seruētur, nonnulli à calore nasci aciditatem existimarunt. Se autem ij falsos esse deprehendent, ubi uiderint non calida & uetera uina, sed quæ principio sunt frigidiora, sic per calorē aclescere.

Vinorū q̄ nam
accescant.

CAP. XIII.

Per simile autem quid uinis accidit, quæ natura frigidiora aquosioraq; sunt, quale flāmis exiguis & imbecillis. Quippè si eas ad feruidum solem exponas, prorsus obscurari, aut etiā extingui conspicias. Quòd si ualido etiam flatu concutias infirmā, ac paruam flāmam, citius illam extinxis, q̄ inauxeris. Natura enim infirma ualidum nec motum, nec calorem sustinet. Ceterū multis in locis fortiora uina, ex industria cōmouēt & transportant, necnon soli exponunt, & calfaciunt, ac deniq; ad meridiē obuertunt cellas, ut citius sic maturescāt & potui idonea euadant. Nam quod multo tēpore alijs, hoc ijs quæ sic excalfacta sunt, breuissimo accidit. Quemadmodum igitur exercitia ualida et sol, calida & robusta corpora, etiā ualidiora efficiunt; prosternunt autem, digerunt, & refrigerant quæ non sunt eiusmodi: sic uina natura calida, motus ueluti uentilās, sol excalfaciens, flammæq; iuxta ardentes, celerius cōcoquunt; quæ uerò frigidiora & aquosiora existunt, eorum arguūt omnia id genus imbecillitatem, celeriusq; perpeti cogūt, quæ alioqui post passura essent: quum nimirum res quælibet in propria natura seruetur calore proprio; corrūpatur autem ab imoderatione extrinseca, non minus caloris, q̄ frigiditatis.

Flāmulas extingui a feruido sole.

Infirma natura ualidum necq; motū, necq; calorem sustinet.

Vina calida a quibus concoquant celerius

Calore proprio seruant singula, corrūpuntur contrario.

CAP. XIII.

IN uniuersum autem aciditas nascitur calore quidē mutante, non autem uincente siue alimentum, siue medicamentum: quemadmodum uidere est in acidis ructibus, qui à semicoctis cibis oriūtur. Quod autem opus sit calore alterante, argumēto sunt lac, & ptisanæ

Aciditas unde oriatur.

Acidi sapor
sunt essentia si-
mul tenuis &
frigida.

Acidus sapor
syncerus i oxa-
lide & oxyla-
patho reperit.

Generationes
omniū corpo-
rū ex quatuor
elementis con-
sistere.

Similium faci-
liorem esse trā-
situm in se in-
uicem.
Linguae facul-
tas.
Liguae cur plu-
res nervi tri-
buti.

Dulcedo ē cō-
munis omniū
quæ nutriunt.

succus, quæ tempore æstiuo citius acescunt q̄ hyeme. Quum enim sapor acidus sint essentia simul tenuis & frigida, quemadmodum constitutio Borealis, nasci certe sine calore non possunt: sicuti nec ille ipse aer: ac proinde licet frigidi sint omnes sapor acidus, nullum tamen eorum quæ extremè refrigerando enecant, acidum est. Exploranda porrò acidus saporis natura est, in oxalide & oxylapatho, ut in quibus reperiatur maximè syncerus & simplex. Etenim quod propriè in saporibus appellatur acidum, à sola lingua percipi potest, sicuti & acre: ceterum quod utriq; est commune, nempe mordacitas, etiam à tactu sentitur. Porrò ex quatuor elementis impari mistura coeuntibus particulatim omniū corporum constant generationes. Ex ea autem imparitate perficiuntur proprietates corporum particularium. Quippè ex elementorum inæquali mistura, plantarum: ex plantis autem, animalium proprietates oriuntur. Ac transeunt sanè quædam protinus in se mutuo: nonnulla mediantibus alijs: ueluti terra in triticum, hordeum, & alia id genus: rursus horum singula in carnem humanam: quum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, transfiliendo eam quæ in medio est mutationem. At eorum quæ in sese mutuo transeunt, quædam celerem: quædam diuturnam alterationem obtinent. Verum quæ maximè sunt inter se similia, celerè: quæ dissimiliora, tardior. Lingua igitur exactissimo sensu prædita, omnes qualitates diiudicat, nec non familiaria & similia, ab ijs quæ sunt contraria discernit. Cuius usus gratia in hanc solam particulam complures nervi inferuntur: quum in aliarum singulas inferatur aut unus tantum, aut alter, nec is magnitudine insignis. Quum igitur quædam naturæ nostræ magis sint familiaria: quædam minus: atq; hæc quidem temperamento huic: illa autem illi: necessariò plures qualitates ipsius gustus existunt. Ceterum omnium quæ nutriunt communis dulcedo est:

quandoquidem quicquid nutrit, necessariò plus aut minus sit dulce oportet. Quæ uerò nō nutriunt, ea, aut non dulcia, aut salsa esse, est dicendum. At uerò id quod cuiq; rerum familiare est, unum est: nam & natura eius est un: aque autem aliena, complura: partim plus, partim minus à substantia eius dissidentia. Porro quæ dulcia simul & acerbæ sunt, ea crassioris essentia sunt, & temperaturæ frigidæ. Quæ acida simul & dulcia, tenuiora sunt q̃ acerbæ, refrigerant tñ & ipsa. At amara, calida sunt, sed acria his calidiora. Nutriūt ergo hæc omnia, si iunctam habeant dulcedinem. Per se autem nullum dictorum nutrit: quorum saporum mistiones, minimè quidem fiunt subito, sed in alteratione consistunt. Nam ijs quæ à natura mutantur, sensim fiunt alterationes. Sicuti igitur quod est summè dulce, aptum esui est: quod uerò exquisitè amarum, ineptum esui: ita quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem, uerū minus q̃ dulce. Eadē ratio est in cæteris qualitatibus: si quidem præter dulcem, nulla nutrire potest. At elementa multò sanè etiam minus nutriunt, nullamq; gustui qualitatem offerunt.

C A P. XV.

Sed quemadmodum edulia quæ nutriendorum naturæ quàm simillima sunt, ea & dulcedinem præ se ferunt, nec ullam præparationem requirunt: sic quæ temperaturam nacta sunt remotiorem, alia condimentis, alia coctione, alia utroq; indigent. Etenim condimenta, quum ex se edendo non sint, suauitatem tamen ijs quæ per ipsa præparantur, conciliant: quòd illa reducant ad medium. Apparet etiam natura calidi, quibus admota fuerit, ea celeriter alterare, atq; in aliam mutare speciem. Quædam tamen suauiora, quædam insuauiora igni applicata redduntur: sicuti & quædam longo tēpore: quædam minimo, ut coquant, indigent. Etenim quæ nutriendorum corporum tēpe-

Familiarē cuiq;
esse vnicū, aliē
na autē, plura.

Acria amariora
calidiora.

Elementa nec
nutriunt, nec ul
lā gustui quali
tate offerunt.

Condimento
rum vsus.

raturis similia sunt, ea uel citra coctionem, aut præparationem, iam dulcia apparêt. Quæ uerò dissimilia existunt, omnia insuauiua sunt, anteq̃ præparentur. Atq̃ ea quidē quæ nimis calida sunt, frigido corrigi debent: quæ uerò impensè frigida, calidorum mistura obsoniorum, & igni. Ad eundem modum humiditate, quæ terrea sunt & sicca: siccitate, quæ humidiora sunt q̃ expediat. Maximam eorum, quæ dicta sunt, faciet fidē, quæ in ore fit transmutatio. Nam qui plusculū sustinuerunt ieiunium, ijs salua salsa redditur: qui uerò plurimum, amara. Sic etiā uniuersum corpus biliosum redditur. Est autem ipsa flaua bilis amara: atra autē, acida: Sanguis qui secundum naturam est, dulcissimus. At pituita linguam contingens, nunc dulcis, nunc acida, nunc salsa uidetur.

CAP. XVI.

*Mel quibus in bilē vertatur.
Mel plusculū igni admotum amaricat.*

Mel temporis spatio amarescit.

Lac nūq̃ amarum efficit.

Lac ex tribus substantiis conflat.

Nihil igitur mirum, nec cur rerum omniū dulcissimum mel, succum generet amarissimū: nec cur id maximè ætate florētibus & calidis natura, & febribus accidat. Nam ut foris quum plusculum igni admotum amarū efficitur, ad eūdem modum in animantium corporibus, ubi syncerū ualidumq̃; nactum calorem fuerit, biliosum succum procreat. At in temperaturis & affectibus frigidioribus, facilè in moderatū sanguinē uertitur. Nec uerò ab alieno tantū calore, sed à suo etiam proprio, mel amarum temporis spatio redditur. Porro lac, etiā si gustu sit dulce, ex se tamen nūq̃ amarum efficitur. Vincitur enim in eo caliditas à frigiditate: ac proinde acescit repositum. Constat autem ex tribus substantiis, qualitate diuersis: prima quidē crassa, ex qua caseus conficitur: secunda pingui, ex qua butyrum: tertia aquea, quam nominamus serum. Ex quibus pinguis quidem, maximè temperata est: crassa uerò, paululum ab ea declinat: excremētum autem illud serosum, frigidum est et humidum. Si igitur gustari lac

posset, ubi in uentre & per uenas concoctum est, ipso melle dulcius inueniretur. Nam quod foris & ex sese mel obtinet, id dum coquitur lac accipit. Et quum admodum ingens calor in animante extiterit, tantam acquirat lac dulcedinem, quantam deperdit mel. Recta quoque id ratione euenit. Etenim quod summè dulce est, ac proinde nihil apponi ad eius dulcedinem potest, id ut in consequentem uertì pergat qualitatem est necesse. At cui quid deest, id per concoctionem acquirit. Verùm lac ubi cruditatē in uentre perpetitur, in frigidiori quidem, acescit; in calidiore nidorosum amarumque efficitur: nunquam autem inter coquendum mel aciditatem contrahit. Porro utraque, tum quod acidum est, tum quod amarum, linguam mordicant. Cæterum mordacitas ipsa, à tactu propriè, non à gustu sentitur: tribusque istis saporibus, acido, amaro, & acri, est mordicatio communis: uerùm acido quidem, ut frigido simul atque subtili: amaro uerò & acri, ut calidis.

CAP. XVII.

Quod sapor acer sit calidus, nō est: cur in demōstrando sim anxius: quādoquidem id nemo ad dubitat: & euidentia sensus, demōstrationis fidem præuertit. Porro quæ ex acribus idonea sunt esui, dulcem quandam, & si obscuram, necessariò habent qualitatem admistam. Proinde multis ipsorum pro obsonio utimur: multis uerò ut condimentis tantum: at ut cibo, ipsorum omnino nullo, idque ob uirium uehementiam. Eorum autem quæ non eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamenta: omnia tamen cuti nostræ imposita, celeriter ulcus moliunt. Sunt & quæ ne gustare quidem audeas, cuiusmodi sunt cantharides, thapsia, & ea quæ erosione aut putrefactione interimunt. Multa uerò etiam ipso statim odore pugnantiam cum homine indicant: ueluti, & hæc ipsa quæ nūc diximus: & ex summè refrigerantibus, cicuta, papaueris, man-

Lac incidēs in
uētriculi ingē-
tē calorē, tantā
dulcedinē con-
trahit, quātam
amittit mel.

Lac quomodo
in alias qua-
litates mutet.

Mordicatio
acido, amaro,
& acri saporibus
est communis.

Acer sapor est
calidus.

Acrida esculēta,
necessario ha-
bēt admistam
dulcedinem.

Acrium medi-
caminū dispo-
nitur.

Saporū singu-
lorū qualis sit
finis aut termi-
nus.

Amari saporis
facultas.

Amara quibus
morbis conue-
niant.

Staphis agria
colliquat car-
nem.

Acriū saporū
facultas.

Acres saporēs
quō ab amarīs
differant.

dragoræ, lycopersij, & hyoscyami succus Terminus
autem siue finis saporis amari est abstergere: acris ue-
rò, urere: at dulcis, nutrire: ubi i sua quisq; natura ab-
solutus fuerit, hoc est minimè alienis qualitatibus of-
fuscatus. Porro quod in ulceribus nati sunt præstare
amari saporēs, id ipsum assumpti in corpus efficiunt.
Abstergunt quippè & expurgant: quæq; in uenis est
crassitiem incidunt. Quamobrem menses mouët: edu-
cendoq; ex pectore & pulmone tūri auxiliatur: comi-
tialiq; etiam competunt morbo: si modò naturam de-
leteriam non habeant. Iis tamē qui sanguinem expuūt
sunt noxi. Aristolochia autē, iris, & panax, adeò ama-
ra sunt, ut proximè ad saporem acrem perringant: ob
idq; nec abstergant tantum, sed etiam exedant & mor-
dicent. Staphisagria etiam, nihil ab istis amaritudine
uincitur, estq; iam adeò & acris & calida, ut non mo-
dò sordem ulceribus auferat, sed ipsam etiam car-
nem colliquet.

C A P.

XVIII.

I Citur saporēs acres, primū exactè esse calidos
dicimus: dein exedentes, urentes, crustam molien-
tes, & colliquantes, si uel ipsi cuti imponantur. Nam
intra corpus assumpti, si quidē tota substantia animan-
ti aduersentur, ipsum putrefacientes corrumpunt: sin
uerò caloris imoderatione dūtaxat, si crassæ sint essen-
tiæ atq; terreæ, interna exulcerant: sin tenuis, urinam
atq; sudores promouent, in summaq; incidendi & di-
gerendi in halitum obtinent facultatem. Ex quo gene-
re quidam, tum expuitionibus ex thorace, tum mensiū
motibus auxiliantur. Nec uerò sola uehementi calidi-
tate ab amarīs acres saporēs differūt: sed q̃ amari om-
nes non modò calidam habeāt facultatem, sed etiam
siccam, & fuligini assimilē: nimirum à dulcibus excal-
factis & exiccatis suam suscipiētes generationē: acres
autem, quicunq; amari non sunt, admistam nullā hu-
midi atem

miditatem sortiantur: quo fit ut eiusmodi corporum à nobis non pauca esitentur. Cæterum astringentibus medicamentis non parum tenuiora sunt medicamēta amara: acribus uerò, crassiora. Quare nec facilè crassos uiscidosq; humores pertanseunt, ueluti ea quæ tenuiori essentia sunt prædita: nec ad incidendum inepta sunt, pinde ut crassiora. In medio siquidē sint utriusq; excessus oportet, quæ incisura sunt. At uerò ferro lapidiq; ignito ea quæ per erosionem interimunt medicamēta similia sunt: quæ à corporis nimirū calore huc perducuntur: ueluti chalcitis, misy, fori, arsenicum, hydragyros, lithargyros, & alia innumera. Crassarum enim sunt paruū id genus omnia, & potestate calida: proindeq; temporis spatium accensa, per eā quæ ab animante proficiscitur mutationem, non aliterq; lapis ferumq; ignitum, uentrem, tum exulcerāt, tum exurunt: quū scilicet in corpus distribui præ grauitate non possint. His tamen tenuiora sunt, calx, cantharis, lepus marinus: nec non aristolochia, & iris: quæ quidem hæc ultima duo, & magis sunt illis acria, minimeq; deleteria existunt. Cantharis autem modicè sumpta, quibusq; oportet admista, non modò nihil offendit uescicari, sed renes etiam expurgat.

C A P. XIX.

QUod itaq; amarus sapor siccis temperie corporibus insit, hinc colligere est, qd & minimè omnium amara putrescant, minimeq; tum uermes, tum animalcula illa, quæ in radicibus, herbisq; & fructibus putrescentibus oriri solent, producant. Maximè nāq; uidemus in humidis nasci corporibus uermes ac putrilaginem. Quam obrem quæ exactè amara sunt, animalibus p̄p̄modum uniuersis sunt esui inepta: quū nimirum aial omne sit humidum. Porro absynthium nō solū amarum est, sed astringit: marina uerò aqua falsa potius est, q̄ amara. At aqua quæ est in lacu Sy-

Incidētia q̄lia esse debeant. Erodentia medicamēta ferro esse ignito similia.

Erodentū species variæ.

Cantharis cōmode exhibita, expurgat renes.

Amarā minimè omnium putrescere.

Amata cur animalibus uniuersis sint esui inepta.

Animal omne esse humidū.

*Maris mortui
aqua cuiusmo-
di sit.*

*Salsuginē cam
eē ad saliendū
optimā, cui o-
uum innatare
videatur.*

*Salsa amare-
fcere, ampliūs
excalfacta.*

*Mare mortuū,
cur nec plantā
nec aīal vllum
alat.*

*Amara eē ho-
minibus atq;
plātis aduerſa.
Salis vires &
differentiæ.*

rīæ Palestinæ, quē alij uocant mare mortuum, alij stagnum bituminosum, alij deniq; Sodomenum, gustantibus non salsa modò, sed amara uidet: estq; adeò grauis & corpulenta, respectu aliarū, ut ne si coneris quidem insiliens, in profundum differri possis. Inest enim ei salis substantia admodum grauis & terrea: ac proinde tantò est aqua q̄ in eo lacu est, marina grauior, quàm tò marina fluuiali. Poteris autem ipse aquam marinā efficere, colliquato sale in aqua fluuiali: cognoscereq; simul quanto grauior reddatur aqua eiusmodi, quàm sit dulcis. Quin & modū iam inuenerunt moderatam ad saliendum conficiendi salsuginem, si in ea ouum natare uideatur. Quòd si decoquere salsuginē ipsam uelis, protinus amarior reddetur. Nam quicquid salsum plusculum excalfeceris, amarū euadet. Ergo in eo Syriæ lacu, q̄ nimirum aqua quæ in eo est, amaricet, nullum neq; animal, neq; plāta inesse conspicitur. Immodò quum duo in eum longè maximi fluuij confluant, pisciumq; copia scatētes, præcipuē qui pp̄e Ierichontē fluit, quem Iordanem appellant, nullus omnino pisciū fluuiorum ostia excedit: et si captos quis in lacum iniiciat, celeriter eos mori conspicit: adeò est omnibus tū hominibus, tum plantis aduersum, quod amarum existit. Omni autem sali obscura quædam astringendi uis inest, qua eas quæ condiunt carnes constringit ac densat: potissimū ubi durus, & minimè fragilis fuerit. Talis est exactissimus quidem fossilis ferè omnis: minus autem illo, marinus: tum qui multis in locis aquis leuiter salis arescentibus prouenit, tertium locū obtinet, abstergere magis q̄ astringere contrahereq; potens. proximas his uires Sodomiticus habet, æquē atq; marinus durus.

C A P. XX.

Propinquus est sapor salsus amaro, quum terreni sint ambo, & calidi: non obscura tamen diuersita-

te diffident: quod uidelicet amarus à calore arido magis sit extenuatus, & elaboratus. Sic in genere salis, qui durior, densior, atque terrestrior est, quibus fere est uniuersus fossilis, minus existit calidus, subtiliūque; minus partiū: quod uerò rūpi facilis, laxisque; tenuior simul atque calidior est: in quo genere & subamarus cōsistit, mediā naturā inter salem durum & aphronitrum obtinens. At uerò spuma nitri omnium est iam dictorum tenuissima: ueluti & Asiæ petræ flos: qui aphronitro tamē minus est calidus: quare hic excrescentias carniū minori cruciatu colliquat. Mordicat uerò eas nitri flos siue spuma: mordicat etiam, tum aphronitrum, tum nitrum. Ceterum quæ sunt crassa essentia, plus rodunt, ubi quendā fuerint calorem nacta.

CAP. XXI.

Plerique odores similiter saporibus nos afficiunt. Si quidem acida omnia, & præcipuè acetum, similiter odoratum gustumque; mouet. Tum acria quoque; ueluti, allia, cepæ, & ipsa non minus quàm gustum, odoratum offendunt, mordicantque. Itaque nonnullorum corporū, etiam non gustantes, qualitatem cognoscimus, ueluti fimi: proinde ne gustare quidem aggredimur, quod maxima fides odoratui habeatur. Quin etiā si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos suo offendant, ne gustare quidē illa dignamur: fereque; in omnibus mutuò consentiunt odoratus & gustus. Attamen in odore suauissimis, ueluti rosa, plurimum sanè dissident. Tantum enim abest ut gustatibus suauia sint, ut amaritudinem non uulgarē exhibeant. Tametsi quod amarum est, nunquam sit odoratum. Siquidem generatio amari saporis ex dulcibus proficiscitur à calore extenuatis: ac proinde amara calidiora simul & tenuiora sunt dulcibus. Porro sensus odoris in cerebri collocatur uentriculis anterioribus: odorabiliumque; uaporosa est substantia. Ea quippè quæ à corporibus defluunt,

Salis & amari
saporis discrimen.
Salis genera.

Odores plerique
quod similiter saporibus
nos afficiunt.

Amara odorata
non esse.

Odoris sensum
in cerebri uentriculis
anterioribus collocari

Odorabilem
est vaporosam
substantiam.

Odoratum oē
nō esse suauē.

aeri ambienti permista, in cerebrumq; per narium in-
spirationem delata, sensum mouent. Recta ergo ratio-
ne odorata omnia eadem & calida sunt quadantenus,
quum uaporum copia à calore excitetur. At non
quicquid odoratum est, suaue continuū erit. Siqui-
dem non omne id spiritui contento in uentriculis cere-
bri, familiare existit. Iam uerò in beneolentia & gra-
ueolentia odorabilem pleraq; reducimus: appellan-
tes beneolentia quidem proportionē quadam ad ea
quæ linguæ sunt dulcia; graueolētia autem, ad ea quæ
omnino insuauia. Cæterum ab ijs quæ exactè, tum sal-
sa, tum acerbæ sunt, aut nihil, aut omnino parum ua-
poris defluit.

C A P. XXII.

Odor nō per-
inde ut sapor
sensibiliū tem-
peries indicat.

Rosæ iesse ex-
crementa tria.

Rosæ partium
examen.

I Taq; haud solida res est, ex odore de sensibilibus
temperatura coniungere, perinde ut gustu: nimirum
ob substantiarum inæqualitatē & differentiam. Etenim
quæ odore carent, crassam quidem essentiam obtinēt:
cæterum quæ sit eorum in calore & frigore cōstitutio,
id nondum constat. At quæ odorata sunt, tenuia utiq;
sunt quadantenus, calidāq;. Porro quum in rosæ succo
(præter ipsius rosæ corpus durum terreumq;) tria ex-
crementa inueniantur, unum crassum, quale est in ui-
nis fæx: alterum aerium, quod uini flori responderet: ter-
tium aqueum, quod in omnibus bullitionē corruptio-
nemq; molit; certè gustus id genus omnia diiudicat.
Siquidem rosam gustantibus aliud quidem acerbum
est: id quod terreum ut sit, & crassum & frigidū, est ne-
cesse: aliud uerò amarum, quod tenue est & calidum;
tertium deniq; aqueum, necessariū quidem frigidum,
sed in tenuitatis crassitudinisq; oppositione, quodam-
modo extremorum, quorum uires exoluit, mediū. Hęc
itaq; omnia de succo rosæ per gustum ipsum discer-
nas: at per odorem, haud æquē: quum non perinde om-
nes eius partes euaporent, nec perinde sensum moue-

an. Multò minus ex coloribus de uiribus medicamētorum licet ratiocinari: quum in coloribus singulis calida, frigida, humida & sicca reperias. In particularibus autem seminum, radicum, aut succorū generibus aliquam ex coloribus, licet sumere indicationem. Vt si dicas cepam, scillam, uinum, quātò fuerint albidiora, tantò & minus calida: quæ uerò subflaua fuluaq; calidiora. Idem usu uenit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, ireos radici, asphodiliq; & alijs compluribus. In quoq; enim genere in uniuersum fulua, flaua, rubraq; omnia albis sunt calidiora.

Colores ad medicaminū uires dignoscendas parum cōferunt.

Calidiora sunt albis fulua, flaua, rubraq;.

Itaq; etsi hinc quoq; coniectura fieri queat, optimū tamen fuerit per experiētiā discretam facultates inuenire medicamentorū. Siquidem in hac falli nō possis: licet prius q̃ experientia uirtutem agnoscas, gustus pleraq; indicet, pauculū etiam approbāte ipso odore.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamētorum facultatib us, Lib. V.



SVNT ergo (quatenus dictum est) qualitates primæ, caliditas, frigiditas, humiditas atq; siccitas. Quæ uerò ab illis denominātur corpora, ea sunt tū cōmunia omnium elementa: tum ea quæ per harum excellentiam, calida, aut frigida, aut sicca, aut humida nuncupantur: tum ea quæ ad conueniēs siue symmetrum generis eiusdem, aut speciei conferūtur: quæq; ad quiduis obuium. Diximus præterea nutrimentum uinci ab eo quod nutritur: medicamentum autem uincere, ac superare alteraq; corpus cuius fuerit medicamētum: idq; aut una

Qualitates primæ quæ sunt.

Nutrimentum uinci ab eo quod nutritur. Medicamentū uicit, alteratq;

corpus cuius
medicamentū
exiſtit.

Simpliciū me-
dicamentorū ple-
rāq; diſſimila-
tiū ſunt partiū

Medicamentis
quorū utan-
tur homines.

Medicamento
rū tāta in agē-
do diuerſitas
vnde oriatur.

Idiotarum co-
gnitio quouſq;
progrediatur.

qualitate, aut coniugatis duabus, aut uniuerſa ſubſtan-
tia, ut complura letalium medicamentorum, nec pau-
ca etiam amuletorum: tum purgantia omnia, & ple-
raq; eorum quæ attrahentia uocantur. Quæ uerò una
duabus uſque qualitatibus in uniuerſum noſtrū corpus
agunt, ea hoc in libro exponemus, hinc ſumpta hypo-
theſi, q̄ ſimplicium medicamentorū pleraq; diſſimila-
rium ſunt partium, req; uera composita, tametiſi appel-
lētur ſimplicia, q̄ cuiuſmodi ſint, talia natura ſint, nec
quicq; ex noſtra induſtria aſſumpſerint.

C A P. I.

Medicamentis frequenter utūtur homines, tum ob
alterationem quam qualitatibus primis molien-
tur, dum uidelicet caſfaciunt, refrigerant, humectant,
& ſiccant: tum ob eam quæ à ſecūdis p̄ficiſcitur qua-
litatibus, quarum nimirum ratione, alia emolliētia di-
cuntur, alia tendentia, alia laxantia, atq; alia deniq; ali-
ter nominantur. Siquidem quum particulatim unum-
quodq; medicamentorum non pari modo ex illis pri-
mis qualitatibus ſuam temperaturam acceperit, inde
fit, ut hoc quidē ex iſis uim laxandi, tendendi illud, aliud
aliā facultatem ſortiat. De quibus ſanē ſiue ſecun-
dis, ſiue tertijs facultatibus agere in hoc quinto com-
mentario eſt animus. Porro ad ſimplices intemperies,
facilesq; affectus pellendos, ſæpe natura duce, ple-
riq; idiotarū ipſa remedia inueniunt. At phlegmones,
ſcirrhi, œdematis, eryſipelatisq; nullū ex illis ſibi re-
medium ducit perueſtigandum: tanquam unūquodq;
eorum maius iam ſit, q̄ pro captu hominis plebei, ac
ſcientiam requirat uenerabiliorem, quam Medicinam
appellant, ſicuti & illius profeſſorem, Medicum. Atq;
huc uſq; & ipſi procedunt, ut ſciant ulcus cauū imple-
ri carne: ſordidum purgari debere: æquabile cicatri-
ce induci: non tamē norunt, quid carne impleat, quid
purget, quid cicatrice inducat: ſed ea inuenire, unius

opus est Medici. Ceterum quā ferē numerari nequeāt omnes particulatim vires medicamentorum, si secundum singula quæ ab eis perficiuntur, dum huic aut illi morbo auxiliantur, imponamus ipsis deflexa nomina: multò sanè præclarius uidetur, missa omni, prolixitate cōmodis speciebus compositas definire ipsorū facultates compēdiosisimè, sub quibus cæterę omnes que dici possunt, comprehendunt. Vt si dixerimus non puris mouendi, aut doloris sedandi in triticę farinę cataplasmate, exempli gratia, facultatem inesse, sed modicè tum humidam, tum calidam.

CAP. II.

Quæ in cōmentario hoc discutienda ueniunt, ijs quæ in alijs exposita sunt, magis ad medēdi rationem pertinent. Igitur ab emollientibus & pus mouentibus orsi, dicamus utraq; calida & humida existere: cæterum hæc quidem, ceu simillimū corpori in pus mouendo calorem producere, absq; ulla existentis in eo humiditatis aut consumptione, aut adiectione: illa uerò, ceu maiorem q̃ pro natura accēdentia, nōnihilq; humiditatis contrahentia. Est autem suppuratio idem quod in pus motio.

CAP. III.

Sed nec de emollientibus medicamentis, nec de ipsa emolliatione, simpliciter loqui licet, quādoquidē nec de corpore duro, uel molli. Siquidem partim absolute durum dicit, ut terra: partim per excessum, ut unguis: partim ad symmetrum sui generis uel speciei, ut elephas nimirū ad Herculem: partim ad quiduis obuium, ut Diogenes ad Aristotelem: ac de molli pari iudicio. Omis sis tamen significatis cæteris, de mollibus durisq; ut ad cutem hominis temperatissimi, contem-
plemur, quam sanè regulam & mensuram statuimus, omnium quæ ita dicuntur. In idem autē recidit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic durum

Medicamentorum vires particulares numerari non posse

Pus mouentia ab emollientibus quomodo differant.

Suppuratio quid.

Cutē hominis temperatissimi esse regulā secundū quam omnia diiudicant

Tactus homi-
nis temperari
medius est om-
niū tangibilitū
Durum quid.
Molle quid.

Mollitio quid.

Durius quibus
modis reddat
aliquid.

Molliendi ra-
tiones plures.

Cedentia oīa
nō eē mollia.

Renitentia que.
Induratorū va-
riæ medendi ra-
tiones.

molleq; appellites, quādoquidem medium quoddam
est tactus noster; uti & Aristoteli uisum est, & Plato
quoq; sensisse uidetur, ubi ait. Dura quidē, quibus ca-
ro nostra cedit: mollia uerò, quæ cedunt carni. Quod
uerò in comparatione ad quiduis obuium durum ac
molle est, id in eo quod magis minusq; cedat, iudicari
uidetur. Porro corporum præter naturam induratorū
ad statum naturalem redditus emollitio est.

C A P. IIII.

Verū quum uariē quidq; efficiatur durius, nem-
pe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia re-
pletionē, sic ut uehementer tendatur; aut deniq; aliqua
coniugatione: sequitur ut & propria suaq; cuiq; emol-
liendi sit ratio. Cæterū quod in se cedit, molle est, si
quidem corpus id simplex fuerit. Nam quod ex pluri-
bus constat, ac sese inuicem contingentibus, ut tritici
aceruus; aut inuicem implicatis, ut lana, simul & cede-
re potest, nec tamen esse molle. Contrā, in ijs que sum-
mē plena sunt, ut utres, neutrū latus in se cedit; nec ta-
men quod continetur est durū, sicuti neq; id quod con-
tinet, q̄ antea durius, etsi sit tensius affectum. Ac talia
sanē non dura, sed renitentia appellamus. Ut autē non
est una idurantium natura, ita neq; una medela. Nam
quod à siccitate iduratum est, humectari postulat: qđ
à congelatione, excalescere: quod à repletionē euacuari:
qđ à siccitate simul concretioneq; humectari simul &
icalescere, p̄ ea. s. que tātō sunt calidiora et humidiora,
quātō ipsa intēperies fuerit frigidior et siccior: qđ à cō-
gelatione simul & repletionē, pariter & callescere & ua-
cuari. Siccantur porrò corpora citra congelationem,
tum in ualidis exercitijs, tum in sole feruenti, tum in in-
genti inedia, tum in ardenti febris, & medicamentis quæ
ita siccant, ut non refrigerent. Congelantur à uehemen-
ti duntaxat frigore: sicuti & implentur à largi tantū hu-
moris affluxu. At siccantur simul & congelantur, co-

euntibus quæ simul cōuenire possunt causis: ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoq; replentur simul et congelantur ab influxu frigido ac partis refrigeratione. Frigoris rursus causa triplex est: una, à foris incidentibus; altera est propria particulæ patientis temperies; tertia ab influente in ipsam humore prouenit. At emollientia pharmaca peculiariter congruunt ijs, quæ concretione induruerunt, magis q; si in eis collectus sit humor præter naturam, ueluti in scirrhis. Nam si à siccitate induruerint, humectanda, non emollienda sunt. Similiter quæ sunt impleta, nō molliri, sed euacuari postulant: idq; aut refrigerantibus, aut calfacientibus, aut resiccantibus. Vacuant siquidem frigida repellendo, simulq; cum calore exprimendo uaporis plurimū: excalfacientia autem, humorem contentū discutiendo in uaporem: quæ uerò propriè sicca appellantur, in halitus digerēdo: idq; aut ebibēdo humores, aut totam alterando particulam. Porro oleum & aqua calida humectant simul & calfaciunt, idq; multò magis, in unum coeuntia, q̃ si singula per se adhibeantur. Idem efficit eduliorū qualitas si similiter habeat. Quæ quidem ob id fami caninæ auxiliatur, q̃ affectus is sit frigiditas siccitati coniuncta. Cæterū cataplasma ex farina triticea in tēperatis naturis pus mouens, nec naturalem partium humiditatem minuit, nec quicquam illam adauget, sicuti nec calorem inrendere potest, nec hebetare, sed tantū illius substantiam augere. Id igitur genus medicamēta humida & calida dicimus, cœq; similem habentia nobis temperiem, quæ calida existit & humida.

CAP. V.

Medicamenta igitur quæ pus mouent, substantiam similariū particularum secundum naturam se habentium, tueri potius q̃ alterare sunt nata, quā nimium eis similem temperaturam obtineant; humidi-

Frigoris causa triplex.

Emolliētia quibus cōueniāt.

Vacuationum modi diuersi.

Fames canina qualis sit affectus.

Cataplasmatibus e triticea farina vires.

Pus mouentia tueri nō imutare substantiam p̃tis sunt nata.

*Alteratio in
animalibus tri
plex,*

*Alterationi na
turali, p̄ter na
turā, & medicę
quę insunt.*

*Cōcoctio quę
fit ab inato ca
lore, ab exter
no calido iuuat
tur.*

*Pus mouentia
qualia esse de
beant.*

*Pus mouēs me
dicamen equa
lem habet ca
lorem, cū corpo
re, in quo pus
mouetur.*

*Pus mouentia
esse calida &
humida.*

tatem autē ipsam quæ in uacuis hæret, atq; adeo etiā contusam carnem imutant. Etenim quum tres in animalem corpore fiant alterationes, una planè secundū naturam est, qua cibi in cremorē nutritioni aptum uertuntur: altera contraria huic, præter naturam, qua cōputrescunt omnia: tertia ex utraq; mista, & media est, partim qdē, cum prima illa cōicans: partim autem cū hac secūda, quam præter naturam dicimus. Siquidem alterationi secūdam naturam, duo hæc insunt, * ut & ex familiari materia animantis naturæ alteratio fiat, & materia ipsa à calore ingenito superetur. Ei uerò quæ præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio accidit, & ad nihil utile. At media earū, quę comitat supurationes, ab ingenito quidem calore fit, sed non planè uincente. Præterea nec ex materia prorsus benigna peragitur, nec etiam omnino aliena. Itaq; quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato calore proueniunt, à simili iuuantur extrinsecus (nam quid æquē concoctioni uentris conferre nouimus, q̄ illi humanū corpus admotum: unde nonnulli tum puellōs, tum catellos, per quietem uentri imponūt) pari modo & quæ in mouendo pure conspiciūt. Cæterū tale esse debet quod mouendo puri adhibetur medicamentum, qualis est in naturis temperatis calor natiuus. Quare si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, medicamen quod pus mouebit, tantò oportet sit temperato calidius, quā rō & natura eius tēperatā in caliditate exuperat. Quare cuiusq; singulatim hominis suum proprium est mouendo puri medicamentum. Explorandæ autem sunt, uniuerse facultates medicamentorum iuxta hominem optimè temperatum: quo quidem proposito canone, quæ mouendo sunt puri, calida & humida dicimus, q̄ illius calidæ & humidę tēperatæ sint consimilia: sicuti calidiora multò, quæ indurata emolliunt.

Initium autē sumit induratorū affectio ex fluxione uiscida & crassa, paruis particulæ poris impacta. Digesto uerò per halitū quod in ea fluxione est tenue & subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac ueluti concreto, uocata sequitur scirrholis. In qua quidem quoniam cum frigidityte humor redundat superfluus, iccirco etiam cōpositam eius esse oportet medellam: ob refrigerationem scilicet excalfacientia poscente affectu: ob superuacaneam autem humiditatem, uacuantia. Quia uerò quæ immodicè, tum calfaciūt, tum siccant, fluxionem ipsam magis impactam reddūt, manifestum est sola ea quæ nō admodū calfaciunt, quæq; non magnoperè exiccant (uocant enim talia emollientia) eiusmodi affectus posse sanare.

C A P. VII.

Quapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum sicca, à pus mouentibus eo dissidentia, q̃ calidiora sint & sicciora. Illa enim cognatā ac simillimam corporibus nostris caliditatē possident: emollientia uerò, licet ualidiorem habeant, non tām tamen, ut attractionis uiolentia desiccant reliquū. Preterea, quæ pus mouent, humorem qui præfuit in partibus induratis conseruant: emolliētia autem, paulum quidem eius absument. In summa, illa quidem, quantitate potius q̃ qualitate caloris agūt: quæ uerò indurata molliunt, qualitate potius q̃ quātitate. Itaq; si in parte quæ suppuratiōe indiget assidui impositas liceret seruare manus, celerrimè suppuratio perſiceretur. Porro inter emolliētia cōnumeratur bdellium, styrax, galbanum, ammoniacum thymiana, medulla, tum ceruina, tum uitulina, adeps caprinus, taurinus, & quæ eiusdem sunt generis.

C A P. VIII.

Quinetiam q̃ emplasticum esse debeat id genus medicamentum, ut exactè puris generatiuum

Scirrhus quomodo fiat.

Scirrhum tollētia qualia sint.

Emollientia ex pus mouentia quō differant.

Pus mouentia humore qui præfuit in partibus induratis cōseruant.

Manibus assidue appositis p̃fici suppuratiōnem celerime.

Emollientia.

Pus mouentia debere eē emplastica.

fit, liquidò constat. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstrui est necesse, quo uidelicet halituosus transpiratus includant. Siquidem & cataplasmata quæ aut detergētia, aut ualidius excalfacientia halitus diffilari permittunt, exiccant quidem, sed pus non mouēt. Talis est hordeacea, cicerum, scœnigræci, fabaceaq; farina; amplius etiam grina, eruina, panici, lupinorum, milij, omniumq; similiter exiccantium. Per detergētia quippè, q̃ meatus referent, particulæ calor euolat: ab immodicè autē calfacientibus, etiã natiui caloris substantia minuitur, sed qualitas ipsa intenditur: quum tamen halituosus quidam exuberansq; spiritus desyderetur, caliditate tamen cōmoderatus. Qui quidem quū in pueris copiosissimus sit (quod nimirū intellexit Hippocrates, crescentia dicens plurimum habere calidi innati) eorum omnes actiones naturales adauget. Verū nihil prohibet, sanguineam substantiam, simulq; aereā, unā cum spiritu, calidum inaudire innatum. Qui spiritus in omnibus animantis cōtentus partibus, licet nō undequaq; sui similis, si non sit essentia animæ (ut Stoici quidem existimant) at certè primum eius est instrumentum. Continetur autem in spatijs inanibus quedā ueluti spiritus ipsius materia, etiānum mutationē exposcēs leuiculam, ut spiritus innatus euadat: nihiloscius tamen conducens admodum ad naturalia opera: ex quibus unum est ea quæ in pus fit conuersio: quum in ipsa quædam etiam perficiatur concoctio. Quum igitur aliquid concoquere nobis consilium est, quāplurimum spiritum intus seruare oportet: nō autem discutere, qd faciunt illa quæ nuper cōmemorauimus. Porro omnium ad puris generationem aptissimum est, ex ijs quidem quæ irrigantur, aqua temperata, aut hydrelæum: ex ijs uerò quæ perfunduntur, oleum temperatum. At ex ijs quæ ex hydrelæo illinunt, farina triticea, & panis ipse,

Pueris inesse
plurimū halituo-
sū spiritus.

Innatū calidū.
Spiritum esse,
aut substantiā
animæ aut pri-
mum illius in-
strumentum.

Puri mouendo
quæ cōgruant.

qui uidelicet modicè est coctus. Nā qui plurimum coctus est, quodāmodo siccior est, aptusq; phlegmonis quæ egrius concoctionem admittunt: qui uerò minus, ijs quæ feruentes sunt. Et sanè quod ex pane cōficitur cataplasma, difficulter coctioni cedētibus phlegmonis idoneum est. Siquidem pani, tum sal, tum fermentum miscetur. Quod uerò ex triticea farina præparatū est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiam triticeæ farinæ quæ pura est, tum panis quoq; qui purus est, puri mouendo congruentior existit: quum furfur & minus sit calidum, & magis desiccet. Farina autem pura, humida est & calida: qualia certè ad pus mouendum conferunt. Itaq; medicamenta quæ phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendum conducunt, uti adeps suillus & uitulinus. Nam taurinus caprinusq; illis acrior existit: quam ob rem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus, magis congruit. Est & adeps gallinaceorum phlegmonis coquendis familiarissimus, magisq; etiam anserum: quodammodo tamen ad digerendum potētior. At agrestium omnium animalium adeps multò acrior & siccior est, q̃ domesticorū, maximeq; pardalis, atq; leonis. Quare horū nullus mouendo puri est idoneus. Porro pus mouent & pix, & resina: ad feruentes quidē phlegmonas, ex rosaceo: ad frigidiores uerò, ex calfacientium aliquo oleo liquatę: utputà cicino, raphanino, ueteri, aut sicyoneio. Quum autē cera per se minus sit calida, quā ut pus mouere possit, solis seruētibus phlegmonis apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. Igitur quæ pus mouent, naturā modicè excalfaciente & humectantem sortiuntur. Cæterum medicamen puri mouendo idoneum, facultate quidē est tale: ubi uerò corpori nostro est admotum, sit actu tale, siue energia. Ergo scirrhum uocant tumorē præter naturam, doloris uacuum, sed durum: interdum etiā sen-

Furfuris facultas.

Adipis differentia.

Pus mouentia modicè excalfaciunt, humectantq;.

Scirrhus quid, & unde gignatur.

Scirrhus qui gi-
grant succi.

sus expertem. Oritur scirrhus ex humore crasso & frigidus, quales sunt duo duntaxat: bilis uidelicet atra, & superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhusi omnino aut pituitosæ substantiæ sunt, aut atrabiliaria, aut ex utraq; misti. Propriè autem emollientia dicuntur,

Emollientia q̃

Cancrofos scir-
rhus ab usu e-
mollientiū ex-
asperari.

quæ medentur scirrhusis tumoribus ex pituita exiccata, crassisq; humoribus ortis. Consueuerunt enim ij potissimum in musculorum capitibus gigni. At quæ ab atrabilario succo duruerunt, cancrosa sunt omnia, & ab emollientibus medicinis exasperantur. Sed his quo pacto prospicere oporteat, in commentarijs methodi medendi docebimus. Quæ uerò à lento crassoq; humore concreto indurata sunt, calida in secundo aut tertio ordine: sicca autem in primo medicamenta desyderant. Sed quum non exigua sit in corporibus induratis maioris minorisq; latitudo, necessum est medicamentorum illis medentium non paruam etiam latitudinem esse. In uniuersum autem ex emollientibus medicamentis, præstantiora sunt, quæ recentia existunt. Siquidem inueterata, ualidius q̃ expediat exiccant. Porro radix altheæ & cucumeris agrestis, nonnullq; aliæ plantæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emolliunt: sicuti maluæ agrestis folia, tum cruda, tum cocta. Atq; hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus adeps inueteratus, cui salis nihil indere oportet, sicuti nec emollientiū ulli. Valde siquidē sal exiccat. In summa uerò, quæcunq; alia emollire possunt, calida sunt ex secundo, & interdū ex tertio ordine: leuiter uerò sicca. Sed & his etiā emplastica uis insit oportet, non secus q̃ pus mouentibus: at quæ nō perinde meatus obstruat: q̃ magis, q̃ illa, euacuare sint nata.

Scirrhis a viscida pituita ortis, q̃lia medicamenta conueniant.

Emollientia.

Sal emollientibus iniiciendus non est, q̃ exiccet ualde.

Emollientia debent esse etiam emplastica.

Indurata sunt frigida & humida.
Solani natura.

AT indurantia frigida sunt, & humida, ut semper-
uiuum, portulaca, psyllium, lenticula palustris,
solanum: quanquam hoc, in medio exiccantium &

humectantium consistit, duplicē in se habens substantiam, nempe terrenā & aqueam. At uerò si quid simul & refrigeret & desiccet, sanē & ipsum indurabit omnino: improprie tamen, quum concretione potius quā euacuatione induret corpus. Illa siquidem potius siccitas est, ac proinde non emollitione, sed humectatione curatur: quemadmodum tensio relaxatione, & relaxatio tensione.

CAP. X.

Porrò laxatio in articulis fit, humectatis immodicē quę circa eos sunt ligamentis, pariter & tendonibus: tensio uerò, non etiam simpliciter: sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrho. In cute autem non tantum ita, sed musculis quoque subditis quoquo modo in tumore sublatis: quemadmodum etiam in inflammationibus accidit. Quā obrem non simpliciter una est species remediorum laxantium: utpotē quum alia humectando, alia calfaciendo, alia emolliendo, quædā uacuando, nonnulla tumores præter naturam purgando, alia etiam per coniugationem, horum quippiam agendo, laxare assolent. Est autem emplasticum medicamentum, quod terrena uiscidaque substantia, minimeque mordaci præditum, illitum meatibus corporis tenaciter hæret.

CAP. XI.

Quod emplastico contrarium est, dici queat poros repurgans, & infarctu liberans: estque nec uiscidu, nec mordacitatis expers, sed subtile et nitrosum. Nam in ratione tantum maioris, ac minoris differunt, tum emplastica ab his quę sordes nutriunt, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quę poros obstructos referant, subtiliora extergentibus sunt, emplasticisque contraria. Sunt autem hæc, tum nitrosa, tum amara. Cæterum ad extergenda ea quę in superficie sunt, requiritur ut cuti extime impolita medicamenta ipsa, solā exactamque

Laxatio ubi fit & quomodo. Tensionis causæ.

Laxantium species variæ.

Emplasticonum essentia qualis

Emplastici oppositum quale

Extēgētia cui
tū quidē, de-
bent esse exa-
cte nitrosa, uis-
cera autē, uel si
aliquid astrictio-
nis sortiantur, ni-
hil nocuerint.

Abſynthium
intus repurgat
meatus, foris
nequaquā.

Medicamenta
ad crassos vi-
scidosq; humo-
res expectorā-
dos cōmoda.

Obſtructiones
iecoris et liēis,
que potissimū
tollant.

nitrosam qualitatem possideāt. At intrò in corpus as-
sumpta, etiam si adiuncta sit quedam astrictio, possint
tamē sic quoq; magnos purgare abstergereq; meatus,
cuiusmodi in uasis consistūt. Nam foris meatuum exi-
guitas prius ab astrictione occlusa, q̃ probè queat ex-
purgari, non etiam inde in altum abstergentem sub-
stantiam recipit, nec expurgatur. At quæ circa uen-
trem uisceraq; sunt partes omnes, quum maximos
in se habeant meatus, maius accipiunt et commodum
ex uasorum corroboracione, quàm propter osculo-
rum exiguitatem ledantur. Proinde intus absynthium
repurgare potest, foris nō potest: quippè quod ex ama-
ra acerbāq; facultate est compositum. Quæcunq; igit
repereris nitrosa et amara, ea ad purgādos meatus om-
nes, ualere noueris. At cutis & ulcerum sordes, non
hæc tantū, sed & uiribus minora possunt auferre, qua-
lia sunt dulcia que tenuium sunt partium. Porro scilla,
iris, nitrum per se, aphronitrum, spuma nitri, seriphon,
abrotonū, cū cibo potuq; assumpta, crassos uiscidosq;
humores extenuandi uim obtinent. Quam ob rem len-
tis ac pituitosis thoracis pulmonisq; humoribus, aut
purulētis & incidendis, et extenuandis, & educendis,
aptiora inuenire alia præ istis medicamenta non pos-
sis. His ipsis & iecinoris obſtructiones expurges, &
modicas etiam lienis. Nam que maiores sunt, uehemē-
tiora desyderant: nempe capparidis corticem, radices ta-
marices, scolopendrion, & scillam, & asplenon. Sed ta-
men istis utendum est ad iecur quidē, ipsis per sese dū-
taxat: ad lienem uerò, mistis aceto, aut ei incoctis: ad
thoracem pulmonemq; melicrato, ptisanā, oxymeliti,
aut dulcium uinorum cuiuspiam.

C A P. XII.

Quum autem plurimam urinam mouere est cō-
siliū, non admodum dictis utendum est phar-
macis, sed quæ acriora sunt, & magis excalfaciūt. Est

enim

enim omne acre calidū; cuius generis sunt semen apij, petroselini, fœniculi, dauci, agrioselini, smyrnij, ipsumq; seseli, ammi, phu, meon, asaron, & cum his acorron: à quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur & secernitur: nempe seroso & tenui seorsum segregato ad renes, crasso uerò in sese coeunte. Quam obrem puris ex thorace expuitioni ea omnia aduersantur: quum nimirum excalfactoria exiccatoriaq; sint, necnon secretoria & coactoria. At quæ expui debent, mediocrem caliditatem desyderant: ne uidelicet impē se exiccentur: ac proinde medicamenta illis congruentia, eiusdem utilitatis gratia, cum sorbitiunculis potionibusq; exhibentur. Quæ uerò renes expurgant, & ipsa incidendi uim possidentia, larga humiditate non indigent. Porro quæ callosas consistentias sunt incidere idonea, admodum quidem incidunt, sed minimū sanè caloris possident. Caliditas quippè callum pœron ue ginit: non incidit, nec diuidit. Cæterum quæ & incidunt & mediocriter calida sunt, meliora existunt: ut radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, tum ochra, & uitrum ustum, & ex scilla confectum acetum, & consimilia.

C A P. XIII.

Quæ cutis meatus referant, ea rarefacientia dicimus: quæ uerò uasorū oscula, aperientia. Quin & illis contrariorū, quod poros contrahit, condensans dicunt: quod autem osculum claudit, occludēs siue obstruens nominant. Cæterum rarefacientium quidē natura modicè calida est, ac tum minimè siccans, tum tenuium partium: aperientium uerò, tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porro contrariorum, condensantium quidem, frigida sanè & aquea: occludentium autem, tum frigida, tum partium crassarum. Rarefacit igitur chamæmelum, & althea, quodq; ex ipsis conficitur oleum: nec minus quod ex agrestibus cu

Acria oīa esse calida.
Diuretica medicamentā quæ.

Diuretica puri ex thorace expuendo aduersantur.

Expuitiōibus q̄ sint idonea.

Callis incidentis discutientisq; congruentia, qualia esse debeant.

Rarefacientia.

Aperientia.

Condensantia
Occludentia.

Hæmorrhoidas aperiētia.

cumeribus. Quin & uetus, & cicinum, & raphaninū, ex eadem sunt nota. Aperiūt autem cyclaminus, allia, cæpæ, fel taurinum, unguentumq; irinum & amaricinum, quæ & occæcatas hæmorrhoidas aperiūt. At cōdensantia sunt aqua frigida, semperuium, portulaca, tribolus uiridis, psyllium, auricula muris, lenticula palustris, ac deniq; quæcunq; refrigerant, sed non astringunt. Proinde mandragora, cicuta, altercū, papauer, si eis quis modicè utatur, condensandi uim obtinent: sin liberalius, non modò condensandi, sed stupefaciendi, & necandi. Occludunt porrò meatus omnia quæ ualidè astringunt, nec tamen acrimoniā habent adiunctā: quum nimirum essentia talium sit simul terrena & frigida. Medicamenta uerò quæ frigida quidem sunt aut æquè, aut amplius: sed substantiam sortiuntur aqueā, ea inquā debiliter & contrahunt & constringūt: uidelicet propter ipsam molliciem; quare condensantia potius q̃ obstruentia dicuntur. Quippè quicquid ualenter tum constipare, tum constringere debet, robur q̃dādam renitens, & durum, habeat oportet.

C A P. XIII.

Rarefacientia.

QUæ itaq; citra molestiā excalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si uerò non modò calida fuerint, sed etiam consistentia crassa, si quidem uehementia sint, & caustica, hoc est urentia, ignis instar corpus colliquant, & sæpe escharas ritu cauterij inducunt. At si debilius q̃ ut urere possint, excalfaciant, anastomoticam, siue aperiendi uim obtinēt. Quod autem causticū, non tamen uehemēter, est, præterea essentia tenuioris, id prorsus ab' omni mordacitate aberit: aut cum exiguo, tum dolore, tum morsu eliquabit partes carnosas. Nam q̃d nō confertim alterat, ut quæ uehementer sunt calida, q̃dq; non ægrè penetrat, ut quæ crassæ sunt essentia, ea latentem actionē obtinent. Porro alterationem subitæ confertæq; mutationes, sicuti

Colliquantia.

Anastomotica

& penetrationū que uiolentæ sunt, quales proficiſcuntur à causticis, & escharoticis, maxime sensibiles sunt. Cæterum de quibus nunc agimus, minimè faciunt escharas, uocanturq; putrefaciētia, licet improprie, atq; ob symptomatis tantū similitudinem: quā ab utriſq; nullo doloris sensu corruptio fiat. Nā que uerè putrefaciētia sunt, humectant simul & calfaciūt. Multis autē modis corrūpi quid potest. Corrūpūtur siquidem plus nimio refrigerata, aut excalfacta, aut humectata, aut exiccata. Non tamē quicquid corrumpitur computrefcit, sed quibus id cum foetore accidit. At medicamēta de qbus nūc sermo est, putrefaciētia, q̄lia, sunt auripigmētum (q̄d arsenicum uocāt) sandaraca, chrysocolla, dryopteris, pityocāpe, & aconitum, omnia colliquare sunt nata, & potissimum carnē tenellam, idq; absq; dolore. Ex quibus quidem nōnulla imbecilliora cæteris ut uſtæ petræ flos, extimā tantū superficiem, quā contigerint, exedendo, ulceribus excrescentibus cicatricem inducunt: quāquam medicamēta quæ uerè ad cicatricem perducūt, nec detrahēre, nec liquare carnē, sed durare, & siccare sunt nata: ut alumē, galla omphacitis, æs uſtum, ac maximè lotū, cum eisq; fructus spinæ Ægyptiæ, siccaq; mali granati putamina.

C A P. XV.

I Digitur est in planis ulceribus ad cicatricem ducendis consilium, ut caro alteretur, fiatq; cutis: id quod perficitur per ea quæ illam contrahere, constringere, constipare, densare, siccare, & in callū cogere ualeant: quum nimirum cutis, ueluti in callū durata caro sit. Ea ergo medicamenta quæ sic agere possunt, primariō proprieq; dicūtur epulotica, siue ad cicatricem ducentia: cætera uerò quæ exedunt carnē, secundariō, & per accidens: sicuti & ea quæ absq; aſtrictione desiccandi uim habent mordacitatis expertem. Nam & hæc quoq; ex accidētī cicatricem inducunt: cuiusmodi

Corruptionis
modi diuerſi.

Putrefaciōni
foetor neceſſa
rio accedit.

Putrefaciētiā
q̄ carnē absq;
dolore liquant

Cicatricē indu
centia medica
menta quæ.

Epulotica quæ
dicātur primo
& quæ secundariō.

utiq; medicamentum est, myrrha, lithargyrus, ostreū,
& diphryges combusta: quandoquidem & ipsa cica-
tricem sæpe inducunt illita. At uerò medicamenta ci-
tra morsum mediocriterq; abstergentia, cauitates ul-
cerum implent.

C A P. XVI.

PORRò attrahentes facultates sunt quæ ex alto uehe-
mentius extrahunt:repercutientes uerò, quæ in al-
tum occurrentes sibi succos repellunt. At essentia illis
quidem calida est & tenuium partium:his uerò frigi-
da, & crassarum. Attrahit enim perpetuò calidum: re-
pellit uerò frigidum. Verùm quod calori iunctam par-
tium tenuitatem sortitur, trahit uehementius:quod au-
tem crassitudinē frigori, uiolentius repellit. Atq; astrin-
gentium quidem nota est essentia. Attrahētium autē,
alia spōte est nata, ut dictamni, propoleos, thapsiæ, sa-
gapeni, succiq; cyrenaici & Medici essentia: alia uerò
* à putredine exasperante suam ducit eriginem: qua-
lis tum fermēto, tū pforico inest. Quòd si fimis quoq;
ex putrefactione generatio constat, utiq; omnes attra-
hendi facultate pollebunt: sed non parua illis differētia
inest. Nam columbinus admodū attrahit. Ex æquo au-
tem utrinq; ab eo recesserunt, ad calidius quidem anse-
rinus: ad frigidius uerò gallinaceus. Hoc etiam magis
uincuntur humanus & stillus. At canum stercus simi-
le est medicamentis extergentibus, maximè si uescantē
ossibus. Crocodilorum autem stercus magis etiam id
perficit. Est & aliud attrahentium medicamentorū ge-
nus, quod qualitatē familiaritate attrahit: id qd aliud
est nihil, q̃ totius essentiæ similitudine: ceu quæ nutriū-
tur, familiaria nutrimenta attrahunt. Talium enim me-
dicamentorum sunt purgantia omnia, & amuletorum
nonnulla. Cæterum calida ut sint id genus omnia est
necesse. Quinetiam, inter ea quæ essentijs similia sunt,
quod calidius fuerit, id potentius attrahet.

Attrahit calid.
Repellit frigi-
dum.

Attrahētium es-
sentia duplex.

Fimus omnis
attrahit.

Stercorū disse-
rentiæ.

Attrahentia si-
militudine es-
sentia.

Calidiora tra-
here potētius.

IAm uerò facultatum alexipharmacarū naturā est duplex. Quædam siquidem alterant; quædam euacuant uenenum lædens, aut deleterium medicamentum. Alterant igitur una qualitate, idq; rōne cōtrarietatis: aut duarum coniugatione; aut deniq; tota substantia. Euacuant totius substantiæ similitudine, & caliditate subtilium partium. Cæterū alexipharmaca medicamēta, sanè facultate sunt media inter corpora quæ oblæduntur, & medicamenta lædentia: ut uidelicet ea dem sit proportio corporis, ad facultatem alexiteriam, quæ illius ad deleteriam. Quamobrē omnia propemodum quæ deleterijs aduersantur medicamentis, si largius sumpta fuerint, grauiter animantis corpus offendunt. Quapropter ea exhibeātur moderatione, ut nec copia nimia corpus oblædāt, nec exiguitate sua à deleterijs uincant. Euacuatur autem omne deleterium uenenum à foris impositis medicamentis, nēmpè aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudine. Quum igitur omnia deleteria medicamēta aduersissima secundum temperiem sint corporibus quæ ab ipsis læduntur, certè si à similibus tēperie medicamentis uacuentur, erunt utiq; & hæc corporū naturis contraria: ut sunt haud dubie aliqua ex parte contraria, non tamen adeò ut interimant, sed in corporis perperientis, & medicamenti lædentis medio librent.

CAP. XVIII.

AT facultas quæ uerè & est & dicitur anodyna, eorum est, quæ primo ordine excalfaciunt, tenuemq; essentiam sortiunt. Quæ uerò improprie anodyna uocatur, ijs medicamentis inest, quæ suo ingenti frigore partē stupefaciunt. Est autem stupor paulo minus q̃ insensibilitas, ac sensus priuatio. Cæterū que affectum sanando dolorē sedant, nec merito dici anodyna possunt; nam id est omnium curātium cōmune.

Anodynæ facultatis natura

Stupor quid.

**Anodynorum
opera.**

**Anodynis ni-
hil debere in-
esse astuctiōis**

**Anodynorum
differentia du-
plex.**

**Deleteria tota
substantia que**

**Deleteria quā
titate q̄ sint.**

Quæ itaq; re uera sunt anodyna, partium sint tenuiū,
& calidiora q̄ quæ symmetra sunt, est necesse: ut sci-
licet euacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, conco-
quant, & equabile reddant, quicquid partibus doloris
est causa. Quare nihil prorsus astrictionis habeant oportet,
ne si pars quidem aut affectus exposcār. Ex quibus
liquet, q̄ interdum affectionem non iuuabunt, sed tan-
tūmodo mitigabunt dolorē: quando uidelicet uerē ano-
dyna dicentur. Interdum adiuuabunt affectum, dicen-
turq; simul anodyna, & salubria. Igitur medicaminū
anodynorum quædam ex primo sunt calfacientiū or-
dine, quæ propriē anodyna dicunt, ut anethinum oleū:
quædam similiter ut corpus nostrum, qualia sanè pus
mouentia. Quæ uerò soporem epota inducunt, tempe-
riem sortiuntur uel summē aduersam ijs quæ reuera
sunt anodyna. Refrigerant siquidem omnia corpus, &
sensum eousq; stupefaciunt, ut si paulò liberalius bi-
bantur, mortem afferant. Ceterū ad usum propositū
optima sunt quæ desiccant. Quæ uerò existentia frigi-
da, humiditatis etiam copiam obtinēt, ut cicuta, ea po-
tui non sunt utilia. Talis est mandragora, excepto eius
cortice sicco: & altercū præter semen. Sunt tñ & quæ
nobis tota essentia aduersent. Proinde si uel minimū
eorum assumptū fuerit, oīno lædat necesse ē: ceu dryo-
pteris, pityocampe, thapsia, solanū manicum, hydrar-
gyros: & fungorum nōnulli: præterea saliuā & fel ani-
malium uenenatorū. Nam talia omnia genere sunt de-
leteria, non quantitate. Ac proinde nihil eorum in ale-
xiterias antidotos indiē, ut solet papaueris succus, myr-
ra, styrax, & crocus. Nam tametsi quædam horū de-
mentent largius bibita, quædam mortem inferant, mē-
sura tamen conuenienti permista alijs, adiuuant. Eo-
rum porrò quæ mentem lædunt, pleraq; etiam caput
degrauant, uaporibus ipsum implētia: Sunt quæ id af-
fligant, oblædentia uentriculum. Cōmuniter uerò ce

rebrū uniuerſa duobus modis infeſtant, aut totius ſubſtantiæ contrarietate: aut quum una duabus ſue quali-
tatibus illius temperaturam immutant.

C A P. XIX.

Vocabulum hoc purgans, una quidem, eaq; cōmu-
ni ratione, de ijs omnibus dicitur, quæ quouis mo-
do animalis excrementa expurgant: alia uerò de ijs tan-
tū enunciat per excellentiam, quæ aut per uomitū,
aut per alui deiectionem, purgationem moliuntur: ita
ut ab his diuerſi gñis ſint ea quæ tum p nares, tum per
os à capite humores eliciunt. Eiſdem cum iſtis ſunt
generis, quæ uulux admota, ui quadam attrahente il-
lius excrementa repurgant. Quæcunq; ſiquidem pur-
gare animaduertimus, ea trahendi uim poſſident, alia
unum quempiam ſuccum: alia duos, aut etiam plures,
idq; illis inter ſeſe cōmune exiſtit. Nam quæ craſſos hu-
mores extenuando, aut urinam ciere poſſunt, aut ex pē-
ctore pulmoneq; eijciendis excreationibus auxiliari,
aut menſtruas purgationes ciere, purgant ſanè & ea
aliquo pacto, uerū antedictis non ſimiliter nuncu-
pant, ſed alia dicuntur diuretica, alia bechica, alia mēſes
mouētia, hac re à ſuperioribus diuerſa, q̄ non habeāt
uim familiarium ſuccorum attrahentem, ut illa. Biſa-
riam autem dicuntur bechica: partim q̄ tuſſim prouo-
cent: partim q̄ eandem ſedent. Atqui contrariæ horū
ſunt facultates. Alia enim extenuandi naturam habēt:
alia incrāſſandi. Atq; extenuandi quidem facultas, in
calidis & tenuium partium ſubſtantijs ſita eſt: incrāſ-
ſandi uerò, frigidis, & craſſarū partiū eſſentijs ineſt.

C A P. XX.

LActis & ſeminis effectrices facultates ſunt, par-
tim in medicamentis tantū: partim in alimētis.
In medicamētis quidem, quum ſuccos pituitoſos ex-
calfacientes in ſanguinem uertimus: in alimentis autē,
ſecundū ſubſtantiæ totius ſimilitudinē: ubi uidelicet

*Purgās medi-
camentū multi-
plex habet ſi-
gnificatum.*

*Purgatiū alia
vnū alia duos
trahunt humo-
res.*

*Bechica dicta
biſariam.*

*humorū corpo-
ris humani re-
peries,*

boni sunt succi, & humida, & tepidè calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis est caloris mediocris particeps: plus uerò q̃ mediocris, bilis: sicuti pituita frigiditatis. In medio autem pituitæ & sanguinis lac ipsum consistit: propius tamen sanguinē uersus inclinans. Vbi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mammis cōficiit, humectāte simul & calfaciente uictus ratione est opus. Si uerò q̃ biliosus fuerit, in primis purgationem ipse sanguis desyderat: mox uictum quem nuper diximus. At si q̃ pituitosus, medicamenta requirit ex-calfacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen exiccantia. Verū inter ea potiora sunt quæ non tantū medicamēta sunt, sed & nutrimentā, ueluti eruca, fœniculū, anethū. Intellego enim ipsas herbas etiamnum uirentes & humidas: nam quæ siccæ sunt, plus q̃ par sit & excalfaciunt & desiccant. Huius generis est smyrniō, apium, sion, polion, ea q̃; prius q̃; exiccentur. In summa uerò quæcunq; calfaciunt plus q̃ expediat, quæq; desiccant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis uitiantia, partim ipsum minorem reddētia, lactis prohibent generationem.

C A P. XXI.

Sanguis est materia mensium & lactis,

Venas esse communes vberibus & matrici

Lacti mētribus, q̃ gignendis, eadē uictus & medicinae rationē desyderari.

Porrò dictis adsimilem facultatem obtinent, quæcunq; prouocare aut sedare menses possunt. Vtrotūq; enim cōmunis materia est, nempe sanguis in uenis contentus. Quare ubi hic fluxilis fuerit, & qualitate contemperatus, utriq; abundantem copiam suppeditat. Cōmunes præterea uberibus uteroq; uenæ sunt non exiguæ: Itaq; ubi ad alterutram partē sanguis defertur, altera siccescit Proinde quibus menses mediocriter deferuntur, ijs lac minimè in mamillis colligitur, Quibus uerò hoc largè suppetit, ijs planè menses cohibentur. Quocirca mirandum non est, si tum uictus, tum medicamenta similia sint, nēpe & ea quæ gignunt, et sedant menstruas uteri purgationes: et ea p̃ lactis in

uberibus generationem, tum procurant, tum supprimunt: quāq̃ hactenus differant, q̃ & calidioribus, & magis incidentibus nonnunquam menstrua purgatio indigeat: quū nimirum ea in parte sitæ uenæ magis aperiri debeant, q̃ quæ tendunt in māmās, & sanguinem fluxilem magis requirant, utero ad delationē eius nihil conferente. Mittuntur enim in uenas quæ comitantur illi, non attrahunt menses. At sanguis in ubera non tantū mittitur, sed etiam trahitur: ac proinde leuiori subsidio medicaminum opus habet, quū non abundē in māmās is confluit. Medicamēta etiam quæ iuuāt ut sanguis in mamillas serāt, imperfectas etiam purgationes promouent. Sin autem nimis oblesæ sint, aut planē retentæ, nullum eiusmodi eas sanare potest: uerū sabina, meion, iris, calamintha, pulegium, dictamnū, asarum, costus, calia, cinnamomum, amomum, aristolochia, buniū, & eius gñis reliqua, exactas uteri purgationum retentiones persanant: taliaq̃; etiā urinam promouent. Sed ab ijs quæ diuretica tantū dicuntur, hoc quidem differunt, q̃ non uehementer desiccēt. Etenim quæ non desiccant, & modicē calfaciunt, lacti sunt generando utilia: quæ uerō plus exalfaciunt, non tamen ualenter desiccant, mensibus eliciendis sunt cōgrua. Verū & utraq̃ hæc urinas prouocant, necnon in primis ea quæ desiccantia, etiam calfaciunt. At præter alia & reddendis ex pectore pulmoneq̃; excreationibus incōmoda sunt desiccantia. Poscunt quippē & ipsæ incidi quidem, non tamen exiccari: ceu & renum uescæq̃; calculi.

C A P.

XXII.

Semen generant cibi qui probē nutriunt, & flatulēti sunt, familiaresq̃; totis substantijs: medicamenta uerō flatulenta etiam & calida Extinguūt autem desiccantia & refrigerantia omnia, quæq̃; totis substantijs cōtraria sunt. Porro prouocant quæcūq̃; calida sunt

Menses demittunt in uterū, nō ab illo attrahi.

Menses & urinas quæ eliciant Menses ducuntia a diureticis quō differant.

Semen quæ gi gnant, extinguantq̃.

*Semē prouocā
tia supprimen
tiāq.*

*Semen suppri
munt oīa refri
gerantia.*

*Semen ne esse
quidē pmittūt,
quæ siccant.*

& flatuosa absq; desiccatione; supprimunt uerò cōtra-
tia. Etenim quum seminis substātia ex bona superflui-
rate generationem sortiatur, sitq; etiam flatuosa: bene
nutriant & flatulēta sint, necesse est, quæcūq; semē aut
procreare, aut prouocare possunt. Quare bulbi, cicer,
fabæ, polypodes, cornus, edulia multi seminis & dicū-
tur & sunt. At scincus & satyrion medicamenta ad id
apta existūt. Porro simul cibi & medicamina multi se-
minis sunt lini semen, & eruca. Cæterum quæ refrige-
rare sunt nata, tam edulia, q̃ medicamenta, semen co-
gentia, incrassantia, & stabile reddentia, uim habent ip-
sum supprimentem, non autem corrumpentem: ut la-
ctuca, blitū, atriplex, cucurbita, mora, melopepones,
cucumeres, siue maturi, siue immaturi. Iam uerò quæ
desiccant, ne esse quidem semen permittūt, etiamsi na-
tura calida sint, ut ruta. Quòd si etiam non calfaciant,
multò minus: ut nymphaea. Eandem proportionem tū
esculentorum, tum medicamentorum est inuenire, cir-
ca lac & menstrua. Sub idem genus cadūt, quāuis alio
modo, quæ respirantium instrumentorum reſciendis
excreationibus auxiliantur: quæq; urinā ciere possunt.
Hæc enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti
contraria incrassandi.

C A P. XXIII.

*Ocularia me-
dicamenta.*

T Ametſi collyrio diarodon, & diapompholygos,
& cygnio, & thure, uti possimus ad aures, aut os,
aut nares affectas, necnon ad pudēdum & anum, quia
tamen frequētius ad oculorum morbos ijs utimur, ob
id nimirum ocularia medicamenta uocantur: sicuti
alia hepatica, alia splenetica, stomachica ue, secun-
dum differentiam particularum quibus solent auxi-
liari creberrimè.

C A P. XXIIII.

D Vm autem ij qui Methodici nominantur, meta-
syncriticas quasdam materias & facultates appellāt,

præterq̃ q̃ obscura & falsa loquuntur, etiam suæ ipso-
rum hæresi maximè repugnantia astruunt.

C A P. XXV.

EX operibus autem contrarias iudicare facultates
oportet: dicentes quasdam esse facultates empla-
sticas, & his contrarias, tum extergentes, tum fæctū li-
berantes: prætera emollientes, indurantes, laxantes, &
contendentes. Nam astringentes, acres, amaras, acidas,
atq; dulces, non facultates medicamentorū, sed gustus
esse qualitates monstrauius. Quanquam & harum
etiam tum actiones, tum temperaturæ nobis ueniunt
inuestigandæ. Etenim astringens, terrestre est & frigi-
dum: acidum, subtile & frigidum: amarum terrestre &
subtile: quod insignis qualitatis expers, frigidum simul
& aqueum: acre, igneum: falsum terrestre & calidum:
nondum tamen igneum: similiter dulce, calidū, sed nō-
dum urens: quæ deniq; oleosa sunt, omnia aquea sunt
& aerea. Sequuta sanè sunt temperaturas eorū, & ope-
ra. Nam astringens contrahere, constringere, densare,
repellere, incrassare, omniaq; refrigerare, exsiccareq; est
natum: acidū uerò incidere, extenuare, fæctū libera-
re, & ppurgare citra calfactionē & cum aliquantula re
percussione potest. At acre similiter ut acidum exte-
nuatq; & perpurgat, necnō perrumpit, attrahit, & es-
charam inducit: cæterū calfaciens, & digerens. Sic
amarū quoq; meatus perpurgat, abstergit, extenuat,
icidit humorum crassitiē absq; manifesta excalfactio-
ne. Quod qualitatis est expers incrassat, cogit, contra-
hit, extinguat, stupefacitq; Porro falsum contrahit, con-
stringit, condiendo seruat, desiccatur citra apertā aut fri-
giditatem, aut caliditatem. Dulce uerò concoquit, laxat,
rarefacit: oleosum deniq; humectat, emollitq; et laxat.
Ex quibus sanè facilè inuenire licebit, qui nā sapores
temperie, & qui sint contrarij operibus.

Gustus qualita-
tes quæ sint.

Saporum tem-
peraturæ.

Gustatiliū qua-
litatū faculta-
tes & opera.

C A P. XXVI.

Symmetrum
quid dicatur.

Ordines, siue
gradus excelsi
suū, quatuor.

Exiccantia
quarto ordine,
etiam uiunt.

Symmetrum appellare medicamentum conuenit, quod nec exalfacit, nec deficcat, nec refrigerat, nec humectat: nec calidū, frigidū, humidū, siccū uel existit. Quod uerò aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut siccus est, à uincente, seu excedente facultate cognominatur. Porro per unumquēq; excessum quatuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, sufficit: calidum quidem exempli gratia nominantes primi ordinis, quod nos exalfacit, non tamē euidenter, sed ita ut opus sit rationali demonstratione. Quæ uerò manifeste calfacere nos dicuntur, ea secundi ordinis esse dicuntur. At quæ iam uehementer quidē, non tamē summe, tertij. Quæ autem adeò exalfacere possunt, ut escharam moliantur & urant, quarti: similiterq; in alijs exuperantijs existimandum. Nam quæ adeò uehementer refrigerant, ut extinguant, & ipsa quarti sunt ordinis. Cæterū nullū inuenire est, qd quarto deficcat ordine, quod non etiam urat. At tertij ordinis exiccantium quippiam eē possit, quod minimē urat, ceu omnia quæ uehementer astringunt: ex quibus est omphaciū, rhus, alumē, balauſtia, galla omphacitis. In his autem ipsis quædam uicina sunt adurentibus, ut squama æris, & æs uſtum, quasi inter tertium quartumq; ordinem hereant. In medio tertij est æs uſtum, si lotum sit: in principio tertij hypocystis. Sic in secundo & quarto differentias licet cōstituere triplices: quū non perinde urāt cauterium & napy, licet ambo quarti sint ordinis.

G⁹³ALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber VI.



GENERALIS igitur sermo de facultate medicamentorum simpliciū, uniuersus iam superioribus libris finem suum cōsequutus uidetur. Tempus uerò iam est ad sermones particulares, siue speciales transire: hoc so-

Medicamenta
in qbus experi
ri debeamus

lūmodo repetentes, primū quidem, in natura temperatissima: secundò in intemperata: postea deinceps in simplicibus morbis, faciendum esse periculum de facultate ipsorum medicamentorum. Cæterū quoniā medicamenta omnia, partim quidem sunt animalium partes, aut plantarum, aut fructuum, aut horum liquores, aut succi: partim autem ex metallis sumuntur: optimū mihi uisum est de plantis ante omnia differere: dein, de metallicis pertractare: ac ultimò ad animalium partes transire, idq; obseruato literarū Græcarum ordine. Curabimus autem semper, ut (quod monuit primo oraculo Hippocrates, uitam pronuntiās breuem, & artem longā) festinantes quā maximo studio, uia incedamus compēdiosisissimam, per ea nēpe quæ sunt in arte utilissima. Inter omnes porrò Dioscorides perfectissimè mihi uidetur confecisse tractatū de medicamentorum materia. At qui aggrediuntur figuras herbarū describere, quas ne per somnium quidē uiderūt, ij certē uident præconibus similes, qui notas ab alijs acceptas fugitiui mancipij publicant, quem ipsi nunq̃ uiderunt: imò quem ne agnoscere quidem possint, si propè assisteret. Illos etiam nō possum non accuare,

Vita breuis,
Ars longa.

Dioscoridē ex
actissime tradē
disse historā
plantarum.

Herbarum for-
mas nō eē ex
libris discēdas

qui primi herbarū formas, scriptis docere conati sunt, quum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non assimilari ijs, qui ex libris prodeunt gubernatores.

Abrotoni tem-
peratura & ef-
fectia.

Abrotono figs
perfricet ante
invasionem, mi-
nus a febrili ri-
gore infestabi-
tur.

Abrotonū ver-
mes perimit.

Abrotonū ini-
micum ventri-
culo.

Absynthiū vē-
triculo gratū.

Astringētia sunt
amica ventri-
culo.

Absynthii
tres species.
Santonicum
Seriphum.

Abrotonum.

A Brotonum calidum & siccum est facultate, in ter-
tio recessu, aut ordine, qui ad temperatam natu-
ram expenditur, situm. Valde siquidem est amarū: qui
sapor, quum essentia terrene sit, à largo est calore exte-
nuatus. Porro si quibus per circuitus redeunt rigores,
ante invasionem rigorum eos abrotono confrices, mi-
nus utiq; concutientur, subitoq; sensum caloris perci-
pient. Quod abrotonum etiam lūbricos perimat, par-
quidem est, quum sit amarum. Cæterum & digerendi
& incidendi quādam uim habet, ipsoq; absynthio ma-
iorem: quandoquidē paucis sing acerbitatis particeps
est abrotonum: haud autem exiguae absynthium. Un-
de inimicum sanè est uētriculo abrotonum, ueluti etiā
seriphum: gratum uerò et amicum absynthium. Per se
quippe amarum omnifariam est insensum uentriculo:
austerum uerò, aut acerbum, aut in summa astringēs,
amicum & familiare. Abrotoni duę sunt species: qua-
rum alteram sanè marem, alteram foeminam uocant.
Similiter & absynthij tres species, aut differentia affi-
gnantur. Quarum unam eodem cum genere ipso no-
mine appellant absynthium: cuiusmodi est Ponticum.
Secundam autem Santonicum: ac tertiam deniq; Se-
riphum. Quibus omnibus absynthiū quidem minus
est calidum, nempe plurimam astrictionem obtinēs.
Non tamen minus desiccatorium existit. Cæterorū au-
tem, Santonicum à Santonia regione, in qua nascitur,
nomē sortitum, proximam habet facultatem, Seripho
paulò imbecillius in extenuando, calfaciendo, desiccā-
doq;. Porro ipsum Seriphum Abrotono minus est ca-
lidum, uerū calidius absynthio, stomacho impendio

inimicum, nempe cum amaritudine, prę se etiam quādam ferens falsedinem. Sed nonnullam tamē, & si minimam, astrictionem sortitur. Sic abrotonum & san-tonicum admodū sunt infesta uētriculo. Solum enim inter ea absynthium, & maximē ponticum, gratū sto-macho existit. Abrotonum ustum, calidū siccūq; facultate est, magis etiam q̃ cucurbita sicca usta, & anethi radix. Illa enim ulceribus humidis simul & citra phlegmonē callo induratis conueniunt: ac proinde maxime pręputij ulceribus congruunt. At cinis abrotoni ulceribus omnibus mordax est: atq; iccirco ex oleo aliquo tenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut sicyonio, aut ueteri, & maximē Sabino, ad alopecias accommodatur. Tum barbam tardius nascētem, in eorum aliquo, nec minus lentiscino maceratum, elicit.

Cucurbita usta
pręputij vlce-
ribus cōgruit.

Abrotoni cinis
ex aliquo oleo
calido barbā
tardius nascentem elicit.

Agnos. Vitex.

Agnos, aut uitex, fruticosa illa plāta, calidus quidem & siccus est, tertio ordine, uerū multū tenuis substantiæ, tum gustu acris simul & astringens: ipsas tamen uitices ad medicinam habet inutiles. Cæterū folia, semenq; et flos, calida siccaq; sunt facultate, necnon tenui substantia, quare sæpe nobis sunt usui. Porro semen edendo est: tam perspicuū tamen calfacit, ut capiti dolorem hoc nomine pariat: quāquam si id frigatur minus caput tentat. Vtuncq; autem sumat, flatus uentris discutit. Præterea tum semen, tum flos, tum folia, uenereas intemperantias compescunt. Quare non tantū esā potaq; conferre ad castitatem uidentur, uerū etiam substrata, unde plāta ipsa, agnos, hoc est casta uocatur. At ruta q̃ agnos, magis quidem ex-calfactoria & exiccatoria existit. Adhæc, agni quidem semen ac germina, modicā astrictionem ferunt: at ruta ubi aruerit, exactē amara est & acris: quādiu uerō humida fuerit, subamara. Nulla tamen austeritas aut acerbitas illi inest: aut illa certē obscurissima Quocirca &

Agnos.
Vitex.

Vitici semen
capitis graui-
tatem parit.

Vitex uenereas
intēperan-
tias cōpescit.

Rutæ facultas

Vitex obstru-
ctis cōfert, mē-
sesq; pmouet.

ad iecur & lienem indurata & obstruēta, agni semen
potius q̄ rutæ competit. Præter dicta autem agnus &
mēses mouet, & indurata digerit, & lassitudinē tollit.

Agrostis. Gramen.

Agrostis.
Gramen.

GRaminis radix, modicē frigida est et sicca, morda-
citatem quandam exiguam, & partium tenuitatē
obtinens. At herba ipsa primo quidem recessu refrige-
rat, in humiditate uerò & siccitate existēs q̄ moderata.

Gramen esculentum.

Graminis escu-
lenti radix cruē-
ta vulnera glu-
tinat, frāgitq;
lapides.

EIus radix est modicē frigida et sicca, p̄indeq; cruē-
ta ulcera glutinat. Ipsa autem herba illita non ue-
hementer refrigerat, in medio cōstituta humiditatis &
siccitatis. Radici porrò mordacitas & tenuitas quædā
exigua inest, qua nimirum lapides frangit, si quis eam
decoctam bibat. At semen alterius quidem, imbecillū
est: eius uerò quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet, ac
fluxus uentris & stomachi resiccat. Vis enim eius est
exiccatoria, tenuium partium, & subacerba.

De quatuor Anchusis.

Anchusæ qua-
tuor species.

ONoclea quam uocant, radicem habet admodum
refrigerantem, desiccantem, astringentem, & sub-
amaram, corporibus condensandis & modicē extenu-
andis idoneam; tum abstergendis quoq; & abluendis
biliosis & salis succis. Quare aurigini & lienosis est
utilis. Præterea cum polenta illita, iuuat erysipelata, &
abstergit non modò epota, sed etiam admota extrinse-
cus; proinde aceto macerata uiligines et lepras sanat.
At folia ipsius herbæ imbecilliora radice sunt, non ta-
men à resiccatione & astrictione aliena. Itaq; p̄fluuiū
sanant cum uino pota. Lycopfos nominata, refrigerās
etiam & siccans, similiter erysipelatis congruit. Cæte-
rūm radicem q̄ onoclea magis astringentem sortitur.
Onochilo cognominatæ uis & calidior & medicamē-
tosior inest. Quare eos qui à uiperis morsi sunt, admo-
dum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum esa. Reliqua

uerò

Onoclea qui-
bus morbis cō-
ueniat.

Lycopfos,

Onochilos.

uerò quæ quarta est, & parua, cæteris est calidior, amarior, & medicatior: ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mēsurā cū nasturtio & hyssopo epota.

Agarici radix.

Primò quidē gustu dulcis, sed paulò post subamara apparet, acrimoniæq; & alstrictionis leuiculæ quandam speciem temporis spatio inducit; estq; consistētia laxa. Quare composita hæc radix est ex substantia aerea & terrea, à calore extenuata. Minimum autē habet essentiæ aqueæ. Hac rōne & digerēdi uim possidet, & crassitudinem incidendi, tum anfractus uiscerum expurgandi. Idcirco regio morbo laborantes ex obstructione iecinoris, necnon morbo comitiali obnoxios, sanat: tum rigores per circuitus recurrentes, ex crassis uiscidisq; humoribus ortos exterminat. Iuuat & morsos à bestijs frigore lædentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum: tum intrò in corpus assumptum, pondere diachmæ unius cū uino diluto. Est etiam & purgatorium.

Ageranton.

Facultatē digerendi habet, & leuiter quadantenus phlegmone liberandi,

Adiantum, Polytrichum, Callitrichum.

Vulgo capilli Veneris,

In calore & frigore symmetrum est, siccat tamen, & extenuat, et digerit. Caput ex alopecia glabrū, capillis uestit: strumas & abscessus digerit: epotum lapides frangit: uiscidorū crassorumq; è pectore pulmoneq; excreationibus, nō mediocriter cōfert: ac deniq; uentris profluuium sistit.

Aeizoon. Semperuium.

Aeizoon utrunq; tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, utpote astringens modicè: est tamen ex tertio ordine refrigerantium, in eoq; aquea essentia præpoller. Quare ad erysipelata, herpes, &

Tomus IIII.

G g g g

Anchusæ quarta species anonyms, latos lumbricos perimit.

Agaricū radicem eē credit Galenus.

Agarici facultates insignes,

Ageranton,

Adianton.
Polytrichon,
Capill. Ven.

Aeizoon.
Semperuium

phlegmonas à fluxione ortas accommodatur.

Ægilops. Avena.

Ægilops.
Avena.

DIgerendi uim obtinet, existens leuiter acris. Vnde phlegmonas induratas, & ægilopas sanat.

Æra. Lolium.

Æra.
Lolium.

IN principio tertij ordinis excafacientium, secundi uerò extremo exiccantium consistit, sic ut accedere magis quàm iris, naturæ acrium uideatur: à qua tamē essentiæ tenuitate relinquitur.

Ægyrus, siue populus alba.

Ægyrus.
Populus alba.

POpuli flores calidi sunt in primo recessu, paulūq; ad siccus declinant, subtiliorumq; potius quàm crassiorum sunt partiū. Floribus similia sunt folia, licet imbecilliora. Resina etiam floribus similem facultatem, sed calidiorem obtinet. At semen, tum resina, tum floribus subtiliorum est partium, & exiccantius: non tamen multò calidius.

Acacia.

Acaciæ facul.

ACaciæ & planta ipsa acerba est, & fructus, & succus: qui lotus acrimoniam deponit. Porro si parti illinatur, protinus eam sicciorē atq; contractā reddit: estq; tertij ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotus fuerit: alioqui si illotus sit, primi. Est autē consistentia terreus, habetq; in se partes quasdam aqueas, necnon alias tenues & calidas.

Acalephe. Vrtica.

Acalephe.

HVius herbe, tum fructus, tum folia, admodum digerentis sunt facultatis: adeò ut phymata & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum exhibent, dum coquuntur quo extimulant uenerem, & maxime ubi semen cum musto bibitur. Quòd non calfaciat uehementer, sed nimis tenuium sit partium, testimonio est crassiorum ex pectoreeductio: tum pruritus quem in partibus excitat. Porro subducit uentrem titillatione magis quàm purgatione. In uniuersum, quod exiccari citra mora-

Vrtica extimulat uenerem.

Vrtica subducit aluum titillatione magis quàm purgatione.

dicationem postulant ea conuenienter persanat.

Acanthos. Spina uulgaris.

Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinent: at radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium.

Acanthos.
Spina.

Acanthium.

Radix huius & folia facultatis sunt exsiccatoriae, ut & ijs qui conuelluntur auxilietur.

Acanthion.

Acanthe leuce. Spina alba.

Radix eius desiccatoria est & modicè astringens: quamobrè & coeliacos et dysentericos iuuat, et sanguinis reiectiones cohibet, oedemataq; illitu contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluatur. Semen tenuis essentiae & calidae facultatis est: itaq; potui dari ijs qui conuelluntur conuenit.

Acanthe leuce
Spinæ albæ facultas.

Spina Aegyptia.

Validius q̃ spina alba, tum astringit, tum siccatur. Quare pluuium muliebri radix eius suppressit. Fructus uerò & columellæ prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: ulceraq; ad cicatricem perducit.

Spinæ Aegyptiæ facultas.

Acoron.

Huius radice utimur, quæ gustu modicè amara est, odoreq; non iniucundo. Itaq; facultatis calida est, & consistentię tenuis. Quare & urinam mouet, et lienes induratos discutit, ceratoidisq; crassitiem detergit, extenuatq;. Ad quod succus præstantior existit. Calfacit enim & siccatur in tertio ordine.

Aconi facultates.

Aconitum Pardalianches.

Hoc putrefacientis & deleteriæ facultatis existit: quare in cibo potuq; fugiendum.

Aconitum pardalianches.

Aconitum lycoctonum.

Est & hoc similis alteri facultatis: sed peculiariter lupos interficit, ut illud pardos.

Aconitum lycoctonum.

Acte, quam sabucum: Chamæacte, quam

Ebulum uocant.

Aloe.

Sabucus.

Chameacis.

Ebulus.

Alinum.

V Traque potentiam habet & desiccandi, & conglutinandis, necnon digerendi modicum.

Alinum.

S Emen simul & lac hęc planta gignit, testisq; gustus acris & substringentis; ex quibus constat ipsam esse dissimilarem. Maior tamen pars eius temperatè est calida, cum humiditate inconfecta, & leuiter flatuosa.

Aloe.

Aloes facultates.

Hęc herba, optima in India nascitur, cuius liquor est id quod ad nos importatur cognominatum aloë, medicamentum ad plurimas res, propter siccitatem mordicationis expertem, utile. Quod quidè astringit modicè, sed fortiter amarum est; ac proinde subducit uentrem. Est autem tertij ordinis exiccamentum: calfacientium autem, aut primi intensi, aut secundi remissi.

Aloë est grata uentriculo.

Aloë quibus affectibus conferat.

Ad hęc uerò, gratum est uentriculo medicamen, ut si quid aliud; & sinus glutinat. Sanat ulcera quę agrè ad cicatricem perducere possunt; & maximè quę in ano sunt & pudendo. Confert similiter si maceretur aqua, ad eorum phlegmonas, necnon eas quę in ore, naribus, oculisq; oboriuntur. In summa, repellere & digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat, quantum uidelicet ulceribus puris non sit molestum.

Alysson.

Alysson morsos a cane rabido, rabientemq; ipsum sanat.

N Vncupata est hęc herba Alysson, quę mirificè iuuat morsos a cane rabido. Sed rabienti quoq; data, sæpe in totum sanauit, ob totius substantiæ similitudinem. Siccat autem digeritq; mediocriter; ac præterea detergit nonnihil. Qua ratione utiliginem, & ephelim purgat.

Alfine. Auricula muris.

Alfine. Auricula muris.

Hęc quum essentiæ sit aquę, citra astringentem, tum refrigerat, tum humectat. Quare ad feruētes phlegmonas & mediocria erysipelata confert.

Amaracon. Maiorana.

C Alfacit quidem in tertio ordine; in secundo autem siccatur. *Amaracoma Maiorana.*

I Llita uim habet astringentem, ac repellentem. *Ambrosia.*
Ami.

E Ius semē est admodum utile. Quum enim sit subamarum & acre, constat ipsum & digerere, & puocare urinas. Calfacit autem, resiccatq; in tertio ordine intenso. *Ami.*

Amarantum.

F Acultatis est incidentis & extenuantis. Quare comma eius cum uino pota, menses educit; omnesq; pota fluxiōes desiccatur: stomacho infesta. Grumos etiā sanguinis dissolvere creditur. *Amarantum.*

Amurca.

E X secundo est ordine calfacientium; at siccātium, intenso quodāmodo magis, terrestris substantiæ quum sit. Sic et ulcera corporum temperatura siccorū, curatur: quæ uerò in alijs omnibus sunt, exasperat, perinde ut resina, pix sicca, & bitumen. *Amurcæ vires.*

Ampeloprason. Porrum agreste.

E St enim herba hæc porrū agreste: ob idq; acrius eo, atq; siccior: ut agrestia oia hortensibus. Proinde stomacho q̃ illud, nocētius. At crassos & lentos humores potentius incidit, ualentiusq; infarcta organis obstructione liberat. Hac quoq; rōne sæpe puocauit urinas, ubi à crassis & lentis retinebantur humoribus. Adeo uerè est calidum, ut illitum cataplasmatitis ritu, exulceret. *Ampeloprasos Agrestia oia esse acriora hortensibus.*

Ampelos agria uitis agrestis.

R Acemi eius extergēdi uim possident: ac proinde cutis extremæ ulcera purgare possunt. Sed astringentem quandam sortiuntur extrema germina: quæ & sale condiri assolent. *Ampelos agria Vitis agrestis.*

Ampelos hemeros. Vitis satiu.

Ampelos.
Vitis.

Vitis cultæ affimilis facultas est agresti, sed ad omnia imbecillior.

Ampelos leuce, Vitis alba, Bryonia.

Ampelos leu-
ce.
Vitis alba.
Bryonia.

Prima huius germina Vere edi solent, edulium uētriculo propter astrictiōem acceptum. Ceterū subamaram, & modicē acrem astrictiōem possident. Quare & urinam modicē cient. At radix & abstergentem, & desiccantem uim habet, & moderatē calidam. Quam ob rem & lienes iduratos liquat epota: cū ficibusq; foris imposita, psoram & lepram sanat. Porro fructus eius, racemi speciem præferens, ijs qui coria depsant est utilis.

Ampelos melæna. Vitis nigra.

Vitis nigra.

Vocatur autem hæc propriè bryonia, prædictæ ad omnia similis, nisi q̃ imbecillior.

Amygdala.

Amygdalorū
vires.

Quæ quidem palēm amara sunt, omnino extenuandi uim possident. Siquidem ephelim purgant, & excreationibus ex pectore pulmoneq; crassorum lentorumq; humorum mirè auxiliantur. Obstructiones præterea iecinoris à crassis & uiscidis succis ortas expediunt. Quin & lateris & lienis, & coli, & renum dolores, ab huiusmodi causa natos persanant. Ipsius arboris etiam radices coctæ, illitæq; ephes purgant. Porro amygdala dulcia, quæ & ipsa nonnihil sortiuntur amaritudinis, moderatē sunt calida.

Ammoniacum.

Ammoniacū.

Cuiusdam ferulæ est lachryma, intensam emolliēdi uim possidēs, aded ut articulorum tophos dissoluat, & lienes induratos sanet, & choeradas per halitum digerat.

Amomum.

Amomum.

Acoro similem facultatem obtinet, nisi quod acorū siccus sit, maiore autem concoquendi uim amomum.

Anagallis.

A Nagallis utraq; & quæ cœruleum, & quæ purpureum fert florem, extergentis est facultatis. Habet uerò nonnihil etiam caloris, & quandam trahendi uim, qua corpori infixa extrahunt. Succus earū ex naribus purgat eadem de causa. In summa, desiccandi uim habent citra mordicationem. Quam ob rem uulnera glutinant, & putrida corrigunt.

Anagallis vtri
usq; facultates

Anagyris.

F Rutex est grauiter olens, et digerentis, excalfacientisq; facultatis. Cuius folia uiridia tumores reprimunt: at resiccata, incidētis sunt, exiccātisq; potentiæ. Similem ferè uim habet eius radice cortex. Semen autem subtiliorum est partium: uomitū tamen puocat.

Anagyris facul
tas.

Androsæmum. Officinis Milleperforata. Hispanis coraconcillo, hoc est corculum.

P Lanta est fruticosa, natura duplex. Vnum enim dicitur Ascyrō, species hyperici; alterum à quibusdam appellatur Dionysias. Est autem semen eorum purgatorium: foliorum uerò facultas modicè extergēs & desiccans, ut & ambusta curare credantur. Cæterum in uino austero decocta, uinum ipsum uulnerum grandium glutinatorium efficiunt.

Androsæmon
Milleperforata.

Androsaces.

A Mara & acris est herba. Potest autē resiccata ebibitaq; tum ipsa, tum fructus eius, magnopere prouocare urinam, & nimirū etiam digerere & desiccare.

Androsaces

Andrachne. Portulaca.

F Rigida & aquea est temperie, paucæ particeps auferitatis: proinde fluxiones repellit, maximeq; biliosas & calidas. Estq; tertij ordinis refrigeratium: humectantium autem secundi. Quare maximè æstuātes adiuuat, tum uentris osculo imposita, tum hyponchondrijs: ac præcipuè in febribus hecticis. Præterea dentium stuporem lenit. Quoniam autem restringit, utili-

Andrachne:
Portulaca den
tium stuporem
lenit.

ter dysentericis editur, & muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc sanè multò est quàm herba succus ipsius efficacior.

Anemone.

Anemone.

R Adix cōmansa pituitam euocat: succus è naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcerum anemone expurgant, & lepras detrahunt, menses q̄; appositæ eliciunt, & lac trahunt.

Anethum.

Anethi facultates.

A Dedò exalfacit anethum, ut habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantis uerò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaq; meritò in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnū conciliat, crudos humores cōcoquit. Vstū autem, tertij ordinis, tum calfaciētium, tum exiccātiū fit Proinde ulceribus nimis humidis prodest: potissimum ijs. quæ in pudendis consistunt. At quæ in præputio sunt inueterata, ea probè cicatrice inducit. Cæterum uiride humidius & minus calidum est. Itaq; magis concoquit, & somnū conciliat, sed minus discutit.

Anthillis.

Anthillis vtracq;.

A Nthillis utraq; modicè desiccat, ut & ulcera glutinet. At quæ chamæpityi affinis est, subtiliorum est partium, magis q̄; detergit: præterea comitialibus competit.

Anthemis. Chamæmelum.

Anthemis. Chamæmelū.

C Alfacit, & desiccat in primo ordine, est q̄; tenuiū partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi uim obtinet.

Anisi semen.

Anisi semen.

C Alfacit & siccāt in tertio ordine. Proinde urinam mouet, ac digerit, flatus q̄; uentris reprimat.

Antirinum. Anarinum.

Antirinum.

S Emen habet inutile, est q̄; cum bubonio similis facultatis.

Aparine. Philanthropos.

M Odicè extergit et desiccatur, habetq; non nihil subtilium partium.

Apariné.
Philanthropos

Āpios. Pirus,

Piri folia pariter & turiones, austera sunt. Ex fructu autem, pars una terrea est, alia aquea. Cæterum utraq; frigida; necnō alia temperata. Proinde esu pira stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autē de siccāt, modicè refrigerāt. Vnde etiā uulnera glutināt.

Āpios.
Pirus.

Achrades. Pira syluestria.

M Agis q̄ pira reliqua astringunt & desiccant; ob idq; maiora uulnera glutināt, fluxusq; reprimūt. Apocynum. Cynocrambe. Cynomorum.

Āchrades.
Pira syluestria

Syluestris mercurialis.

C Anibus iuxta & hominibus est uenenum, herba grauitè olens, ob idq; uehementer calida; non tamen proportionè desiccatur. Itaq; illita admodum digere non potest facultatis.

Āpocynum.
Cynocrambe.
Cynomoron.

Ārgemone.

E Thuius herbæ facultas abstersoria est & digerēs.

Ārgemone.

Ārifaron.

M Vltò minus est aro. Radicē habet oliuæ magnitudinis, sed multò est ipsa acrius.

Ārifaron.

Āristolochia.

R Adix eius est amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est, quæ rotunda. Aliarum uerò duarum, quæ clematidis appellatur, fragantior est, infirmior tamen. At longa, tenuitate quidem à rotunda uincitur: abstergerendi tamen calfaciendiq; & ipsa potentiam obtinet: minus sanè q̄ rotunda abstergens & digerens, sed non minus calfaciēs: imò forsan plus. Itaq; in quibus usus est modicè absterfionis, cōmodior est longa: utputa in ulceribus carne implendis. At in quibus crassum humorem ualidius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Proinde dolores à crasso spiritu

Āristolochia
triplex.

Aristolochiæ
rotundę admi-
randa opera.

inductos, rotunda exactius persanat: extrahit spicula: putredines corrigit: ulcera sordida purgat: dentes & gingiuas splēdidas facit: auxilio est asthmaticis, singul-
tientibus, comitialibus, podagricis q̄; si cum aqua bi-
batur Tum ruptis & conuulsis, ut si quid aliud, medi-
camentum idoneum est.

Arceuthus.
Iuniperus.

Arceuthus. Iuniperus.

C Alida et sicca est tertij ordinis. At fructus, simili-
ter calidus est: siccus tamen in primo ordine.

Arctium.

Arctium.

Quod Thapso Verbasco est simile, radice tene-
ra, candida, dulci, caule oblongo et molli, semi-
ne cymino simili, tenuium est partium: ob idq̄; facul-
tatis modicē exiccantis & extergentis. Quam ob rem
radix ac semen eius in uino cocta, quadantenus dentiū
dolores mitigant. Porrò ambusta & chimethla non
horum modò decoctum, sed & caules teneriores sana-
re possunt.

Arctium aliud Lappa maior. Bardana.

Lappa maior.
Bardana.

D Igerit simul & desiccant: astringit tamen non nihil:
unde folia eius antiquis ulceribus profunt.

Arnaglosson. Plantago.

Arnaglosson.
Plantago.
Refrigerantia
simul & astrin-
gentia quibus
morbis conue-
niant.

R efrigerat pariter & siccant in secundo gradu: ha-
betq̄; nonnihil austerum, ratione terrearum par-
tium. Porrò medicamenta, quæ cum hoc q̄ refrigerant,
unà etiam astringunt, ea et ad ulcera rebellia omnia, et
ad fluxiones & putredines cōueniunt, ac p̄inde & ad
dysenterias. Nam & sanguinis profluvia sistunt, & si
quid aduratur, refrigerant. Tum sinus quoq̄ glutināt,
& alia ulcera recētia simul & uetera. Atq̄ in omnibus
ferè id genus medicamētis primas tenet, aut certè nul-
li secundum est arnaglossum, ob temperaturæ symme-
triam & conuenientiam. Nam siccitatem obtinet mor-
sus expertem, & frigiditatem quæ nōdum stupefaciat.
Fructus etiā & radix similis sunt facultatis, nisi q̄ tum

ficcioris, tum minus frigida. Quin & semē subtile est partium: radices uerò crassiorū. At herbe folia exicata, subtile partium existūt, & minus frigida facultatis. Radicibus utuntur ad dentium dolores, tum mandentes, tum collutionibus incoquētes: præterea ad iecinoris renūq; obstructions nō has tantū adhibēt, sed folia quoq; & multò magis semina.

Plantaginis radicibus ad dolores dentium utuntur.

Arum

Mediocrem extergēdi uim possidet, estq; primi ordinis calfacientium & exiccātium. Radices eius comesæ mediocriter humorum crassitiem incidunt, ita ut sint excreationibus ex pectore idoneæ.

Arum.

Artemisia.

Dvplex est, utraq; tamen calfacit secūdo ordine, intenso autem primo, aut secundo remisso desiccatur: estq; tenuium partium: unde calculis renū, uteriq; fomentationibus haud mediocriter congruunt.

Artemisia utraq;.

Asarum.

Radices eius facultate similes radicibus acori sunt: intensiores tamen.

Asarum.

Asclepias.

Huius nondum nos periculum fecimus,

Asclepias.

Aspalathos.

Acris simul & astringēs est. Quare partibus quidem suis acribus excalfacit: austeris uerò refrigerat. Itaq; utriusq; ratione desiccatur, unde ad putredines & fluxiones est utilis.

Aspalathos.

Asparagus petræus.

Abstergendi uim habet citra manifestam caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac iecur infarctu liberat, & maximè radices eius, & semen: quia & dentium dolores sanat.

Asparagus petræus.

Asplenum.

Tenuium quidē partiū, non tamē calida est herba. Hac utiq; rōne lapides frangit, & lienes liquat,

Asplenum.

Astragalos.

Astragalos.

R Adices astringentioras sortitur: quare non instrenuè siccatur, Nam & ulcera glutinat, et aluum fluentem sistit, si quis in uino decoctam radicem bibat.

Aster atticus. Bubonium.

Aster atticus.
Bubonium.

P Artim quidem digerens est, partim autem refrigerans, uerùm id non astringit.

Asthaphis. Vua passa.

Asthaphis.
Vua passa.

C Vltima quidem, concoquendi, astringendi, & leuiter digerendi, facultatem obtinet. At agrestis, uel hementem acris existit, adeò ut ex capite purget, abstergatq; ualenter. Itaq; ad psoram accommodata est. Sed & urendi uim habet.

Asphodelus.

Asphodelus.

H Vius radix extergētis est facultatis. Vstæ autem cinis, calidior, exiccantior, subtilior, ac digerere potentior existit: ac proinde alopecias sanat.

Attractilis. Cnicus agrestis.

Attractilis.
Cnicus agrestis.

F Acultatem habet desiccandi, & modicè digerendi: exq; spinarum est genere.

Atraphaxys. Atriplex.

Atraphaxys.
Atriplex.

H Vmida quidem est in secundo ordine: frigida uerò in primo: estq; aquea similiter maluæ. Quin et uentrè celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatē. Hortenses autē atriplex & malua, q̃ agrestes, tū humidiores sunt, tum frigidiores: pinde phlegmonis & phygethliis incipientibus, hortenses: uigentibus autem & declinantibus, agrestes magis conueniunt. Semen eius abstergendum uim habet. Itaq; icteritiæ ab obstructione iecinoris ortæ auxiliatur.

Aphace.

Aphace.

A Stringit, editurq; ut ipsa lenticula: ægrius tamen concoquitur. Cæterū ualentius desiccatur, & moderati caloris est.

Ab synthium.

A Strictoriam, amaram, & acrem qualitatem sortitur, excalfaciens, extergens, roborans, & exicans. Proinde biliosos uentris humores deiecit, ac per urinas euacuat. Verūm contentam in uentre pituitam nihil adiuuat sumptū. Sic neq̃ si in thorace aut pulmone contineatur; nam astringens in eo facultas, q̃p̃ amara, ualentior est. Est autē calidū in excessu primo: siccū uerō, in tertio. At succus longē q̃p̃ herba est calidior.

Balanus Mirepfica. Glans unguentaria.

S Vcco eius, qui calidus est, unguentarij utuntur. Reliquiæ autem unde expressus est succus, uincētem habent qualitatem amaram: cui admista est quædam astrictio. Proinde extergentem, incidentē, contrahentem, & stipantem effectū possident. Quod si quis carnem eius drachmę pondere, cum melicrato bibat, medicamen experietur uomitorium. Sepe etiam per infernam aluū subducit largiter. Sed lienes liquat, iecurq̃; indurescētia; ad quorum uiscerum expurgationem, ex exycrato ipsam exhibere cōsueuimus. Ex aceto etiam lepras, pforas, lētes, uirilignes, ionthos, ephelim, exanthemata, achoras, aliosq̃; id genus curis affectus exterrit. Abstergentem itaq̃ & incidentem cum astrictione obtinet facultatem. Cortex autem eius, admodum astrictorius existit.

Balsamum.

B Alsamū desiccat & excalfacit secundo excessu: est autem & tenuium partium, adeò ut odoratum sit. Eius lachryma subtiliorum est partium q̃p̃ ipsa plāta: non tamen adeò calida ut nonnulli existimant. Fructus eius persimilis facultatis est, longē tamen in subtilitate partium inferior.

Balaustium.

F Los est agrestis punice, sicuti domesticarum cytinus. Valenter gustum astringit. At uerō si omne astringens terrestre est & frigidum, meritò quis dixe-

Absynthium

*Balanus myrepfica.
Glans unguentaria.*

Balsamum.

*Opobalsamū.
Caropalsamum.*

*Balaustium.
Cytinus.*

rīt ipsum ualenter & exiccare, & refrigerare. Quo nomine ulcera ad cicatricē perducit. Quin etiam ad sanguinis reiectiones, dysenterias, necnon uētris uteriq; profluuia, nemo est qui non hoc medicamento utatur.

Batus. Rubus.

Batus.
Rubus.

R Vbi folia, germina, flos, fructus, & radix, qualitate astringente, neq; obscura, participant. Sed folia germinaq; recens nata plurimū in se habent substantiæ aqueæ, parū uerò astrictiōnis. Quare uulnera glutinant. At fructus maturus, non parum habet succi calidi temperati, qui existit dulcis; ob idq;, & ob modicā astrictiōnem non est insuauis gustui. At immaturus, acerbus est & ualidè exiccatorius. Ac sanè uterq; recōditur, ualidius q̃ recens desiccans. Flos eandē uim fructui immaturo possidet. Vtraq; ad dysenterias, uētris profluuium, robur deperditum, sanguinisq; expuitionem sunt idonea remedia. Radix præter astrictiōnē, non paucam habet substantiā in sese tenuem, per quā & lapides renum comminuit.

Rubi radix cō
minuit lapides

Batrachium. Ranunculus.

Batrachium.
Ranunculus.

H Vius omnes quatuor species adeò acres existūt, ut cum dolore exulcerent. Quare si conueniēter utare, psoras & lepras excoriant, & ungues diuellunt. Tum leprosis stigmata digerūt, & uerrucas detrahūt. Quin & alopecias iuuāt exiguo tempore admotē. Radix arefacta sternutationem prouocat. Sed & dentes dolentes iuuat, sicut eos frangat. Est itaq; ualde calida & sicca, tum radix, tum uniuersa herba.

Bdellium.

Bdellium.

Q Vod Scythicum nominant estq; acrius & resinosius, emollientis admodum & efficacis uirtutis est. Arabicum autē, quod splendidius est, magis q̃ emollientia exiccat; uideturq; in potu sumptum calculos renum frangere, tum urinas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores, ruptu-

rasq; sanare.

Bechion. Tusfilago. Vngula caballina.

T Viles & orthopnceas iuuare creditur, si quis folia arida aut radicem in prunis urens, ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris: ut sine molestia, noxa ue omnes thoracis affectus credatur rumpere. Folia uirentia partem recenti phlegmone obfessam illitu adiuuant.

Bechion.
Tusfilago.
Vngula caballina.

Blitum.

H Olus est esculentum, humidæ frigideq; temperaturæ in secundo ordine.

Blitum.

Bulbus satiuus.

F Rigidior quidem & cras sior agresti est, lentumq; succum pcreat. Nam & coctu difficilis est & flatusosus, & uenerem prouocans. Attamè illitus ob amaritudinem simul & astrictionē abstergit simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat.

Bulbus satiuus

Bulbus uomitorius.

M Vltò est calidioris temperaturæ q̃ superior.

Bulbus vomitorius.

Bubonium. Aster atticus.

C Reditur sanare bubonas & illitum, & alligatum inguini. Digerit enim mediocriter, quia modicè est calidum. Cæterū non ita siccatur, ut tendat.

Bubonius.
Aster atticus.

Buglosson.

H Vmidæ calidæq; tēperiei est: uinisq; iniectū hilaritatis causa esse creditur. Sed gutturis etiā lenit aspredinem, si melicrato coctum sumatur.

Buglosson vino iniectum, hilaritatē parit.

Bunium.

A Deò excalfacit, ut & urinas moueat, & menses prouocet.

Bunium.

Buphtalmos.

F Los eius floribus chamæmeli est. tum maior, tum acrior: uehementiusq; digerit, adeò ut & duritias sanet, cerato mistus.

Buphtalmos

Brathy. Sabina.

Brathy.
Sabina.

Quantum in acrimonia cupressum uincit, tantū ab eo superatur in astrictione: quare illo & calidior est, & potētius digerit. Quin & similiter cupressio putredinibus accommodari potest, maximē ubi rebeliores fuerint, & diuturniores. Carbunculos item soluit: mensesq; , ut si quid aliud, essentia tenuitate prouocat, & sanguinem per urinas mouet. Fœtum etiam uiuentem interficit, & mortuum educit. Esto autem hoc medicamen tertij ordinis tum excalfacientium, tum exiccantium; ex numero eorū quæ uel maximē tenuiū sunt partium

Bretanica.

Bretanica,

Huius folia astringentia sunt, & uulnerum glutinaria, similia agrestibus lapathis. At expressus ex illis succus perinde natus est astringere, uideturq; sanare iam putrescentia.

Bromus.

Bromus.

Illitum desiccet, digeritq; mediocriter, & sine morfu. Temperiem autem habet paulò frigidiorē. Nonnihil etiam astrictiōis obtinet, ut uentris profluua iuuēt.

Bryon thalattion. Alga.

Bryon thalattion.
Alga.

Compositū est ex terrena & aquea essentia, utraq; frigida. Siquidem & gustum astringit, & calidis quibusuis illitum, ea refrigerat, adiunatq;.

Bryon aut Splachnon. Muscus.

Bryon.
Splachnon.
Muscus.

Vim habet astringentem inualidam, ceterū mediocriter frigidam. Nam & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps.

Gallium.

Gallium.

Inde nomen sumpsit, q̄ lac coagulet. Facultatem autem obtinet exiccatoriā, & subacrem. Flos eius competere sanguinis profluuijs uidetur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gentiana.

Gentiana.

Huius radix efficacissimē extenuat, purgat, abstergit, liberat,

git, liberat obstructione, utpote impēse amara existēs.

Gigarta. Acinorum uuæ nuclei.

EX secundo exiccantium sunt ordine: refrigerantiū
uerò, primo. Omnibus autem uentris cum proflu-
uio iunctis affectibus, impēdio conferunt; utpote quū
acerbi appareant.

Gigarta:

Acinorum uuæ
femina.

Gingidium.

CVstu amarum & astringens quum sit, temperie
calidum frigidumq; uidetur. Secundum utranq;
uerò qualitatem desiccatorium est. Cætera porrò sto-
macho amicum existit.

Gingidium

Glaucium.

AStringit cum quodam fastidio; tum adeò insigni
ter refrigerat, ut solum sæpe erysipelata, si ualen-
tia nō fuerint, curare possit. Cōstat enim ex aquea ter-
reaq; substantia, utraq; frigida.

Glaucium.

Glaux herba.

EX lacticiñs quum sit, calida quodammodo hu-
midaq; fuerit.

Glaux herba.

Glechon. Pulegium.

QVandoquidē acris & subamara est, ualde exte-
nuat & calfacit. Quare & illita rubricat; & ex-
ulcerat si diutius hæreat. Quin etiam humida, crassa, et
lenta, ex thorace & pulmone excreatu facilia facit, mē-
sesq; mouet.

Glechon.
Pulegium.

MOdicē emolliendi uim obtinet;

Glechos.
Strigmenta.

Glycyrrhiza, Dulcis radix.

Similiter radici ipse succus, dulcis leuiterq; astrin-
gens existit: Proinde nō modò asperæ arteriæ, sed
uesicæ etiam scabritiem lenire potest, idq; temperatu-
ræ mediocritate. Quare fuerit sanè natura eius familia-
ris nostræ temperaturæ. Cæterū tepidam quandam
caliditatem sortitur. Porrò quoniam temperie quoq;
est humidum, id quod modicē est dulce, ure sanè etiā

Glycyrrhiza.
Dulcis radix.
Dulcia modice
eē humida.
Glycyrrhiza
suum lenit.

siti congruens medicamētum est, nimirum modicè humidū, humanaq; natura frigidius. Dioscorides ait, are factæ radicis pollinem unguibus oculorum mederi.

Glycyflida. Pœonia.

Glycyfoda.
Pœonia.

Radicem habet leuiter astringentem, cum quadā dulcedine: at si plusculū dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato, amygdali pota quantitate. Expurgat porrò etiam iecur obstruētum, & renes: uentrisq; sistit fluxiones, si in aliquo austero uino cocta sumatur. Est præterea omnino resiccatoria: quare ex collo pueris suspensa, meritò comitialē morbum persanat: idq; aut aliquem à se fluorem, per infantuli inspirationem imittens: aut aerem assidue mutās, atq; alterum reddēs. Nam hoc pacto succus Cyrenai: cus columellam phlegmone affectam iuuat: & melan: thium frictum palam catarrhos & coryzas desiccatur, si quis id in calidum lintheum rarum liget, assidueq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quin etiam si compluribus liniis, & maximè marinæ purpuræ, collo uiperæ iniectis, illis uiperam præfoces, eaq; postea cuiuspiam collo obuincias, mirificè profueris, tum paristhmijs, tum omnibus ijs quæ in collo expululant. Pœonia itaq; & exiccat, & tenuium est partiū: calfacit autem mediocriter.

Gnaphalium.

Gnaphalium.

Folia eius modicè astringunt: quare ex aliquo uino austero dysentericis profunt.

Gongilis, Rapum.

Gongilis.
Rapum.

Gongilidis semen uenerè excitat, utpote spiritum flatuosum gignēs. Sic & radix coctu difficilis est: inflatq; & semen generat.

Damasonium, Alisma.

Damasonium.
Alisma.

Decoctū radicis eius calculos renum cōminuit. Quare absterforiæ facultate est particeps.

Daucus, Staphylinus.

D Omesticus esui aptior, sed imbecillior, acrem calidamq; facultatē sortitur: ac proinde etiam extenuat. Ac radix sanè flatuosum quid obtinet, ac uenerum. Semen autem, domestici quidem, et ipsum quādam ad uenerem ciedi potentiā possidet: agrestis uerò planè flatu caret: ac proinde urinam mensesq; ciet.

Daucus.
Staphylinus;

Dauci semen.

A Deò uehementer excalfacit, ut inter prima, tum urinam, tum menses prouocet. Multum etiam digerere per haliū foris impositū ualet. Ipsa uerò herba, moderatè calida est, similemq; etiam uim obtinet, cæterū infirmiore.

Dauci semen.

Daphne arbor, Laurus.

H Vius folia calfaciunt & siccant uehementē: at fructus adhuc uehementius. Radicis cortex minus quidem acris est & calidus: cæterū plus amarus: habetq; etiam astrictiōis nonnihil. Quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest. Bibitur ex uino fragrante trium obolorum pondere.

Daphne.
Laurus.

Daphne herba: quā Alexandrinam appellant.

E Vidēter est calida, acris, & subamara, potaq; tum urinas, tum menses prolicet.

Daphne herba.

Chamædaphne.

P Ersimilis quidem est uiribus daphnæ Alexādrinæ: sicuti & quod daphnoides uocant.

Chamædaphne.

Dictamnū.

T Enuiori essentia constat quā pulegium, cætera illi simile. At pseudodictamnū ad omnia imbecillius existit.

Dictamnū.

Dipsacos.

D Ipsaci spinæ radix ex secundo ordine exiccatoria est, habetq; nonnihil & abstersorium.

Dipsacos.

Dorycnidion.

A Quea excellit frigiditate, Quamobrem, paucū.

Dorycnidion.

H h h h ij

lum quidem, soporem conciliat: plusculum uerò sumptum, perimit.

Dracuntium, Dracunculus.

Dracuntium.
Dracunculus.

Quidam aro persimile obtinet, tum folijs, tum radice. Cæterum illo acrius est, & amarius: ac proinde calfactorium magis, et tenuioribus partibus. Habet etiam & astrictiōem leuiculam. Radix omnia uiscera expurgat, optimumq; remedium est contumacium ulcerum. Verum exterget etiā cætera omnia que extersionem desiderant. Folia præterea similem facultatem sortiuntur, ob idq; si sint uiridia, recentia uulnera glutinant. Fructus ualentior est, non folijs tantū, sed radice. Itaq; & cancos, & polypodas credit eliquare. Succus eius quoq; uitia oculorum expurgat.

Dryopteris, Filicula.

Dryopteris.
Filicula.

DUlcis, acris, amara, & in radice etiam acerba existit. Habet autem facultatem putrefaciendi: proinde pilis glabram cutim efficit.

Drys, Quercus, Robur.

Drys.
Quercus.
Robur.
Fagus.
Ilex.

Exiccandi astringendiq; possidet facultatem, cum mediocri quadā tepidaq; caliditate. Cæterū plus cæteris eius partibus astringit quæ in trunci cortice membrana subest: tū quæ ipsius fructus conuestit carnem. Quamobrem ad pfluuium muliebre, sanguinis exuptiones, dysenterias, & diuturnos uentris fluxus, eam esse credunt accommodam. Valētius tamen astringunt fagus & ilex. Quarum plantarum folia tenella illita non instrenuē desiccant, nec non uulnera glutināt. Bandem folijs uim habet & fructus roboris: eoq; Medici nonnulli utuntur ad incipientes atq; crescentes phlegmonas.

Ebiscus, Althæa, Agrestis malua.

Ebiscus.
Althæa.
Malua sylue.
Bris.

Facultate digerendi, laxandi, phlegmone liberandi, mitigandi, & concoquendi difficiles coctu affectus est p̄dita. Cæterū radix & semē q̄ folia, & tenuiorum

sunt partium, magis q̄; exiccatoriam & extersoriam facultatem ostendunt: ut & uirilignes detergāt, & semē renum calculos frāgāt. At radicis decoctum, ad dysenteriam, diarrhoeam, et sanguinis reiectionem est aptū: quum nimirum etiam nonnihil astringāt.

Ebenus.

EX ijs lignis est, quæ trita in aqua soluntur. Vis ei Ebenus.
 inest excalfaciendi, extergendi, & tenuium partiū. Quamobrem, quæ pupillas offuscāt extergere credit: misceturq̄; alijs ocularibus medicamentis.

Elæa, Olea.

OLiæ ramī quantū habent astrictiōis, tātæ sunt Elæa.
Olea.
 frigiditatis participes. Fructus uerò, si quidē ad unguem maturuit, moderatē calidus est: sin imaturus, magis, tum astringit, tum refrigerat.

Elæon, Oleum.

OLeum quod ex oliuis exprimitur, humectatoriū Elæon.
Oleum.
 esse & moderatē calidum, iam supra docuimus.

Eiusmodi est, quod est dulcissimum: sitq̄; potissimum ex oliuis quas druppas appellant. Cæterū quod omotribes & omphacinum nuncupant, quale ab Hispania uehitur, id quātum in se habet astrictiōis, tantū etiam illi inest frigiditatis. Porrò oleum uetus, quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & potentioribus ad euaporādum uiribus: quod uerò ex crudo, id, dum reliquum quippiam seruauerit astrictiōis, miste permanet facultatis: ubi uerò illam prorsus abiecerit, reliquo euadit simile. Quinetiam, quicumq̄; in præparando ramos iniiciunt, ij omphacino simile oleum efficiunt. Porrò q̄ oleum lotum minimè omnium mordacitatem contineat, supra etiam traditum est. Sunt autē Oleum lotum
ē minime mordicans.
 uaria oleorum genera: quibus sanè cicinū & tenuius, & ad discutiendum potentius est, q̄; simillimum oleo ex oliua uetusto. Raphaninū autem, cætera huic est simile, sed calidius tamen. At hoc etiam calidius sinapi.

Hhhh ij

num: cui simile est quod est melanthio conficitur. Pu-
gnant cum istis myrtinum & sesaminū, tum q̄ astrin-
gant, tum q̄ crassarum sint partium. Mistæ facultatis
est lentiscinum, terebinthinū, & mastichinū. Nō enim
tantū emolliunt, sed & astringunt. Amygdalinum
porrò amaritudinem exuperantem possidet, cæterū
cuiusdam astrictionis est particeps: nō tamē caryinū,
sed id uel maximè simplicis est digerēdi facultatis. Ca-
lidius eo est laurinum, & hoc etiam magis, cedrinum.
Proximum ei est quod ex nigra pice conficitur. Da-
dinum, minus quidem laurino calidum, uerū ualen-
tius desiccans. Hyoscyaminum uerò mistæ facultatis
est, emolliendi uidelicet, ac refrigerandi. Oleum porrò
cicinum, uentrem subducit. Hoc uerò magis, quod sit
ex gnidio grandè. Quod ex agresti oliua exprimitur, ex-
tergit, simulq; astringit. Squalidissimū enim id est ex
omni olei genere, & post, istricum quoq; deinceps il-
lis Hispanum. Pinguisimum est Zibicum, et Ciliciū:
simul autem pingue & tenue, Sabinum. In medio cō-
prehēsorū omnium sunt, tum id quod per cyclades
insulas nascit, tum quod per Græciā, Asiāq; . Etenim
oleum pingue æstimatur uiscositate: tenue uerò, si pel-
luceat, si purum sit, si plurimum minima eius portione
inungatur, si facile à cuti cōbibatur. Omne autem oleū
pro cuiusq; iniectorum natura uariari contingit.

Oleū pingue,
tenueq; qua ra-
tione æstimat.

Elatine.

Elatine.

MOdicè tum refrigerat, tum astringit.
Elaphoboscus.

EXcalfacit et tenuium est partium: ob idq; exiccat,
maximè in secundo ordine.

Elenium, Enula campana.

Elenium.
Enula campa-
na.

RAdix eius calida & sicca est cum recrementitio
humore. Quare ele gmatris quę faciunt ad educē-
dos crassos ex pectore succos, idoneè miscetur. Iuuat
etiam ad rubrificandas partes uexatas frigidis diutur.

nisq; affectibus.

E Eleliphacos, Salvia.
Videnter exalfacit, ac leuiter subastringit.
Helleborus, Veratrum.

Eleliphacos.
Salvia.

T Am albus q̄p niger helleborus extergentis calfa-
cientisq; est potentia. Quamobrem ad alphos, li-
chenas, pforas, leprasq; accommodi sunt. Quinetiam
niger si in fistulam callo induratum infundatur duo-
bus tribus ue diebus, callum detrahit. Dentibus pro-
dest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordi-
ne exalfacientium & desiccantium. Porro niger gustu
calidior est: candidus amarior.

Helleborus.
Veratrum.

Elxine, quam Parthenium uocant.

A Bstergit, constringitq; cum humiditate subfrigi-
da: unde phlegmonas incipientes usq; ad augmen-
tum sanat: maximè si calidæ fuerint. Incipientibus etiã
phygethliis cataplasmati ritu illini: ad auriumq; do-
lores phlegmonosos succus eius instillatus, sicuti ad
paristhmia gargarizatus conducit.

Elxine.
Parthenion.

D Elxine, quam cissampelon uocant.
Igerendi obtinet facultatem.

Elxine altera.
Cissampelos.

Elynus, Meline, Panicum.

F Acultate pauci nutrimenti est, & exiccatoria. Sistit
nonnihil uentris fluxus, ut milium. Si uerò foris il-
linatur, exiccat atq; refrigerat.

Elynus.
Meline.
Panicum.

Empetron.

A D solas purgationes esse uidetur commodum,
bilem ac pituitam educens: iuuat tamen ad alia,
gustu salsum existens.

Empetron.

Epithymum.

T Hymi facultatē habet, ad omnia efficacius. Exic-
cat & calfacit in tertio gradu.

Epythymum.

Epimedium.

R Efrigerat moderatè, cum aquea humiditate. Vbe
ribus illitum, surrecta ea seruare potest. Aiunt ue

Epimedium.

rò si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis, Pomus syluestris.

Epimelis.

Pomus syluestris.

FRuctus eius acerbus est, stomacho tamen ingratus, & capitis mouens dolores.

Erebinthus, Cicer.

Erebinthus.

Cicer.

LEgumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, aluo mouendæ habile, ciendæ urinæ idoneum, lacti & femini generando aptum. Prolicit uerò & menses. Cæterum quod arietinum dicitur efficacius ur nam pro-uocat: cuius decoctum renū calculos frangit. Reliqui erebinthorum genus eadem ui pollet, puta attrahēdi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè sicci: participes item amaritatis: cuius ui & lienem & iecur, & renes expurgāt: psorasq; & lepras, & lichenes extergunt: tum parotidas & testes induratos discutunt: tum ulcera maligna cum melle sanant.

Erebinthus agrestis.

Cicer agreste.

CAlidior & siccior domestico est, quātò et acrior, & amarior existit.

Erice.

Erice.

DIgerendi per halitum facultatem obtinet: sed precipuè flore eius ac folijs utendum.

Herpyllus, Serpyllum.

Herpyllus.

Serpyllum.

VSq; adeò calfacit, ut urinas & menses moueat. Estq; & gustu admodum acre.

Erysimum

Erysimum.

Semen eius igneum est, & calfactorium. Vtile est cum elegmatis ad promouendas crassorum ex pectore expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas uberum et testiculorū, iuuat: & ut Dioscorides ait, etiam occultos caneros.

Erythrodanum, Rubia passiuā.

Erythrodanum.

Rubia tinctorum.

ESt autem tinctorum rubia radix acerba et amara: Quare lienē, & iecur expurgat: & urinas, crassas, multas, & interdum sanguinolentas promouet. Quin

& mēses ciet, extergitq; mediocriter. Proinde uutiligi-
nes albas cum aceto illita iuuat.

Eupatorium.

T Enuium est partium, incidendiq; & extergendi Eupatorium.
uim, citra manifestam caliditatē, obtinet: quocir-
ca obstructions iecoris aperit. Inest ei quædam etiā
astrictio, per quam robur uisceri addit.

Euphorbium.

V Rentem & tenuium partium facultatē sortitur. Euphorbium.

Ephemeron, Iris agrestis.

A Stringit quidem, estq; suavis odoris. Quare et re Ephemeron.
pellit, & per halitū digerit. Non ineffaciter au- Iris agrestis.
tem radix eius in dentium dolore colluitur. At folia co-
cta in uino, phymatum augmento & statui cōgruūt.

Echinus herba.

F Ructus eius acerbus est: atq; iccirco repellentis fa Echinus her-
cultatis & exiccatoriæ. Utuntur eo ad oculorum ba.
auriumq; fluxiones.

Zeia, Spelta.

V Niuerfa sua facultate, quodammodo in medio Zeia.
est tritici & hordei. Spelta.

Zingiberis radix.

E Xcalfacit, sed non primo statim occursu, ueluti pi Zingiberis ra-
per: unde sanè & minus esse subtilium partium, q̃ dix.
piper, exstimanda. Etenim illaboratam quandam, &
crassam retinere in se uidetur humiditatem: quemad-
modum piper longum. Quare diutius perseuerat que
proficiscitur à Zingibere, aut pipere longo caliditas,
quàm quæ ab albo, aut nigro. Porrò ubi totum cor-
pus celerrimè calfacere consilium est, ea tunc exhi-
benda sunt, quæ & celerrimè à caloris nostri conta-
ctu incalescant, & promptissimè undequaq; feran-
tur. Verùm ubi partem quāuis refrigeratam recalfa-
cere studemus, contra agendum: nimirum quæ tardè
calescentia, plurimo tempore perdurent, ea præbēdo.

Cæterum licet zingiber & piper * longum hac ratione à nigro pipere differant, non magna tamē est differentia. At nasturtium, napy, thapsia, & agrestium columbarum stercus, maiori tempore perfectè accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

Zythus.

Zythus.

Non parum est acrior hordeo, succiq; prauī, quā ex putredine oriat. Est et flatuosus: ac p̄tim acris & calidus: p̄te uerò plurima frigidus, aqueus, acidus.

Zyme, Fermentum.

Zyme.

Fermentum.

Tenuium est partium, & mediocriter calidum: p̄inde citra molestiam quæ in p̄fundo sunt extrahit & digerit. Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine natæ. Cui accedit ea quæ à sale est, * & quæ etiam à farinæ natura.

Hedyosmos, Menta.

Hedyosmos.

Menta.

TAm menta, q̄ calamintha, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio calfacientium ordine. Infirrior tamen est menta, & minus excalfacit: cæterum mediocriter ad uenerem excitat: id quod omnibus accidit, quæ humiditatem semicoctam & flatuosam continent: At calamintha, quum ualētius calfaciat & excitet, habet etiam quiddam amarum in se, atq; acerbū. Quare illo quidem lumbricos perimit: acerbitate uerò, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

Hedysarum.

Hedysarum.

Huius semē amarum & subacerbum apparet: ob idq; potum stomacho gratum existit, uiscerumq; obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus germina.

Hemerocalles.

Hemerocalles.

Radicem habet lilij radici similem, & figura & uiribus: prodestq; ut illa, ignis ambustus, nimirum

tum leuiter digerens, tum nōnihil astringens.

Hæmionitis.

A Strictionem simul & amaritudinē possidet. Quā Hæmionitis.
obrem cum aceto pota lienosis auxilio est.

R Herigeron.
Efrigerat & modicē digerit.

Herigeron.

C Heryngion.
Alore quidem est temperatum, nō paruam tamē
siccitatem sortitur consistentem in tenui essentia.

Thalietrum.

F Thalietrum.
Olia habet coriandro similia: caulem crassitudine
rutæ. Vis eis inest citra morsum exiccatoria. Itaq;
ulcera inueterata ad cicatricem perducit.

Thapsia.

A Thapsia.
Crem habet ac ualenter excalfacientem faculta-
tem cum humiditate coniunctam. Quare ex al-
to uiolenter extrahit, & quod extraxit, digerit. Celeri-
ter tamen corrumpitur.

Thermus, Lupinus.

P Thermus.
Remaceratus aqua, amaritudinem exuit, ediq; po-
test, sed nutrimentum sit crassi succi. Vbi uerò na-
turalia etiamnum amaritas permanet, extergendi, digerē
diq; uim obtinet. Interficit autem lumbricos, tum il-
litus, tum addito melle linctus, tum ex posca epotus.
Quin & decoctum eius lumbricos eiicere potest: tum
etiam foris identidem perfusum, uirilignes, achoras,
exanthemata, pforas, gangrænas, malignaq; ulcera, iu-
uat. Expurgat iecur & lienem cum ruta & pipere sua-
uitatis gratia sumptum. Elicit menses & foetum cum
myrrha & melle impositum. Lupinorum porrò fari-
na, etiam sine mordicatione digerit, nec liuida tantū
sed & chœradas & phymata curat, si in aceto, aut oxy-
melite, aut posca coquatur.

Lupinorum fa-
rina qbus mor-
bis medeat.

A Thermos agrios, Lupinus agrestis.
Marior est, & ad omnia ualentior domestico,

Lupinus agre-
stis.

eiusdem genere cum ipso facultatis.

Thlapsi.

Thlapsi.

Semen eius facultatem acrem fortitur, adeò ut iter nos abscessus potum dirumpat. Menses ciet, & foetum enecat Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest: euacuatq; supernè & infernè bilem oxybaphi mensura epotum.

Thridax, Lactuca.

Thridax.
Lactuca.

Humida & frigida est, secundum aquam fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas, & ad parua & leuia erysipelata, est comoda: propterea restinguit sitim. At semen potum, genituræ profluuium cohibet. Sic & agrestis lactucæ semen. Cuius holeris colligitur succus, argemas & caligines purgans, inungitq; ad adustiones cum lacte muliebri solitus.

Thymum.

Thymum.

Incidit & calfacit uehementer, ob idq; urinam & menses prouocat, foetum euellit, potum uiscera expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert, ac deniq; excalfacit exiccatq; in tertio ordine.

Idæa radix.

Idæa radix.

Admodum gustu est acerba. Quare sanguinis effusiones, lienterias & dysenterias, mensesq; fluentes suppressit, tum pota, tum etiam admota extrinsecus.

Ixos, Viscum.

Ixos.
Viscum.

Ex plurima aerea & aquea, paucissima terrena substantia constat. Quare ex alto humores extrahit eosq; diffundit et digerit. Tempus autem ut calfiat postulat.

Ios. Viola.

Ios.
Viola.

Violæ folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Proinde tum per se, tum cum polèta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori uentriculi æstuanti, & oculis.

Hippuris, Cauda equina.

Hippuris.
Cauda equina

Astringentem cum amaritudine facultatem pos-

fidet, ac proinde ualenter exiccantē, sed circa morsum. Itaq; uulnera etiam maxima glutinat, uel si perfectos esse neruos cōtigerit. Præterea uocatas enterocelas glutinat; necnō sanguinis reiectiones, fluētes menses, dysenterias, cæterosq; alui fluxus coercet. Succus uerò eius pdest sanguinis eruptioni per nares, et fluxui obnoxij in uētre passionibus, ex austerorum uinorū quopiam epotus; ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum.

V Nā cum sceniculo & de ipso differemus.

Hippomara-
thrum.

Isatis. *amarum*

Isatis.

Domestica quidē qua utuntur tinctores, facultas est ualenter exiccātis, nondū tñ mordentis; est enim simul amara & astringens. Proinde magna uulnera corporum durorum glutinat; & sanguinis profluuiū laborantibus partibus utiliter illinitur, tumores laxos mirificē digerit, simul ac reprimi, & aduersus omnia maligna ulcera mirabiliter resistit. At isatis syluestris manifestē iam acre quiddā, tum gustu, tum actione præfert. Proinde q̃ domestica magis desiccans, ualentius etiam putredinibus obsistit; ad cætera iam cōprehensa deterior.

Isopyron, Phasiolon.

S Emen habet amarum & subacerbū. Extergit itaq; & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora cōtrahat, & stringatq; Quare excreationibus pectoris cōfert, & iecur expurgat, crediturq; iuuā hemoptoicos.

Isopyron.
Phasiolon.

Itea, Salix.

Itea.
Salix.

S Alicis folijs ad cruenti uulneris glutinationem uti possis. Verū floribus eius maximē ppe omnes utuntur ad exiccantis emplastri præparationem. Est enim uis eorum ita desiccatoria, ut morfu abstineat. Habet uerò etiam quandam astringentem. Porro succus expressus medicamē exiccatoriū existit, expersq; mordacitatis. Nec enim inuenias aliquod medica-

men ad plures res utilius eo, quod citra mordacitatem exiccat. Arboris cortex similem facultatem obtinet, tum floribus, tum folijs, nisi q̄ tēperaturæ sicci-
 cioris existit, ueluti omnes cortices. Etenim cinere corticis macerato in aceto, nonnulli callos atq; myr-
 mecias tollunt

Salicis corticis
 cinere macera-
 to in aceto cal-
 los atq; myr-
 mecias exteri.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M M E D I C A M E N T O R V M

Facultatibus. Liber VII.

Calamintha.
 Nepita.



Calamintha, Nepita.

N SSENTIA quidem est tenui, tem-
 perie autem calida & sicca, quodā mo-
 do in tertio ordine. Est enim acris gu-
 stu, paulumq; amaritudinis obtinet.
 Extrinsecus admota, primū quidē
 ualde excalfacit et mordicat, cutemq;
 exugit: postremò etiam ulcus efficit. In corpus autem
 intrò assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum
 melicrato, perspicuò calfacit, atq; sudores ciet, omneq;
 corpus tum digerit, tum exiccat. Idcirco ea cōtra rigo-
 res repetētes per circuitum nonnulli utuntur, sicuti &
 cōtra ischiadicos morbos. Trahit enim que in profun-
 do hærēt ad superficiem, totumq; adeò articulū excal-
 facit, & cutem non obscure adurit. mensesq; tum epo-
 ta, tum apposita, admodum efficaciter prouocat, ac de-
 niq; elephāticis etiam probè auxiliatur. Præterea cica-
 tricibus atris candorē restituit, & sigillata digerit. Præ-
 stat autem in huiusmodi, ubi in uino decoxerimus, ip-
 sam emplastri ritu apponere, & uiridem magis q̄ sic-
 cam. At sicca, ad uenenatarum bestiarum morsus as-

sumitur, ueluti etiam cauteria, & quæcūq; medicamēta calida sunt & acria Succus eius aut infusus, aut epotus, ascaridas, lumbricos, & auriū uermes, enecat. Sic & conceptum interimit, eiectq;. Igitur incidendi quidē ei uis adest, ob calorem, tenuitatē, amaritudinē; abstergendi uerò propter solam amaritudinem. Quare Asthmaticis atq; ictericis cōuenit. Ad omnia tamē dicta, montana efficacior existit.

Calamus odoratus.

L Euiculam quādam astrictiōem, ac minimā acrimoniam possidet. Siquidem magna ex parte essentia quidē eius terrena est, & aëria; temperies autem, calida & sicca in secundo excessu, nisi q̄ ualentius desiccet. Porro moderatē mouet urinam: ac facultatibus quæ iecori stomachoq; imponuntur, necnon ijs fomentis quæ inflāmato utero, aut mouēdis menstruis ministrantur, cōmodissimē potest misceri.

Calamus phragmites, Canna.

R Adix eius cum bulbis aculeos stipitesq; infixos extrahere ex alto traditur. Etenim abstergentem, minimeq; acrem facultatem sortitur, quemadmodum & ipsa folia. Cortex uerò cōbustus, admodum tenuiū partium, & digerentis facultatis efficitur, cum nonnulla absterfione, ut exiccet & calfaciat tertio quodāmodo ordine. Cæterū eius flos est uitandus. Nam si in aures incidat, adeò tenaciter hærens affigit, ut auelli non possit, auditumq; uitiat.

Cancanus, Cacalia.

R Adix cancani, crassam, emplasticamq; & exiccātem habet essentiam, sed mordacitatis expertē. Quare macerata uino sicuti tragacantha, & linctā, aut cōmansa, arteriæ asperitates sanat.

Cannabis.

C Annabis semē adeò flatus discutit, exiccatq;, ut si largius edatur, genituram absumat.

Calamus odoratus.

Calamus phragmites.
Canna.

Calami flos uitiat auditum.

Cancanus.
Cacalia.

Cannabis semen.

Capnios.
Fumaria.

A Cris, amaræ, & acerbæ qualitatibus est particeps. Quamobrem urinam biliosam, multamq; provocat; sanatq; tum obstructions, tum imbecillitates iecinoris. Succus eius oculorū aciem acuit, non parū trahens lachrymarum, ueluti ipse fumus.

Capparis.

Capparis radicis cortex itus
foris adhibitus
quæ molitur.

C Apparis radicis cortex uincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam. ob idq; pugnantibus facultatibus cōstat; qppè abstergere, purgare, incidere, potest amaritudine; excalescere, incidere, digerere, acrimonia; cōtrahere, dēfere, astringere, acerbitate. Quare lienes induratos, si quid aliud, maximè potest iuuare; tum foris medicamentis quæ il linunt admixtus, tum intra corpus assumptus, siue decoctus in aceto, oxymelitē ue, siue cōtus atq; illis permixtus. Quum nimirū crassos lentosq; humores apertè hoc pacto sumptus euacuet; nec eos tantum per urinas, sed per uentrem etiam sæpe sanguinolētos defert; unde & lienes adiuti sunt, & coxarum dolores. Quin etiam menses promouet, ex capite purgat, auxiliatur ruptis atq; conuulsis, nec non malignis ulceribus, cataplasmatis modo imposuius. Præterea dentium dolores adiuuat, interim cum aceto coctus, interim cum uino, sæpe solus dentibus mansus. Ad hæc utiligines cum aceto detrahit, & choeradas, & duros tumores digerit, idoneis ad eas medicamentis mixtus. Radicis cortici fructus proportionem respondet, nisi qd ad omnia sit imbecillior. Imò & folia, & caules similem etiā uim obtinent. Admiscemus tamē illis aliquid, qd eorum uehementiā obtundat. Nec mirum est, qd aurum uermes sua perimant amaritudine.

Capparis fructus & folia.

Cardamum, Nasturtium.

Cardamum.
Nasturtium.

N Asturtij semen adurētis facultatis est particeps, ueluti napy. Proinde omnia quæ rubrificationē postulant

postulant, eo excalescunt. Miscetur quoque remedia,
quæ exhibentur asthmaticis, tamquam ualenter crassos
succos incidere ualeat: Porro & herba arefacta semi-
ni similem facultatem sortitur. Nam quæ humida est et
uiridis, multis numeris inferiorem.

Cardamomum.

Cardamomum.

Quanto suauius magisque fragrans nasturtio est,
tâto & imbecillior ei calida facultas inest. Nec
enim ulcerare est idoneum. Habet autem adiunctum
quiddam amaritudinis, qua lumbricos interficit: & cum
aceto ualenter psoras detergit.

Caron.

Cari semen calfacit & exiccat tertio quodammodo Caron.
ordine, moderatè acrem possidens qualitatem. Itaque
& flatus extinguit, & urinas ciet, tum semine, tum planta.

Casia.

Exiccat et calfacit tertio quodammodo ordine, sed Casia.
& tenuium admodum partium est, habetque acrimo-
niæ plurimum, ac leuiter nonnihil astringens. Inci-
dit itaque simul & digerit, roburque instrumentis addit.
Quare mensibus est mouendis idonea, ubi à copia si-
mul & crassitudine illi suppressi fuerint.

Carya, Nuces.

Arbor tum in folijs, tum in germinibus astrictio- Carya.
Nuces.
nem quandam possidet, cæterum euidentem mul-
tamque in nucis putamine recenti pariter & sicco. Eius
autem succo expresso, ac melle decocto, nos uice sto-
matici medicaminis utimur. Oleum quod ex fructu eli-
citur inueterato, admodum per halitum digerit. Quare
nonnulli eo gangrænas, carbunculos, & cægilopas sa-
nant. Sunt qui ad neruorum uulnera utantur. Cæterum
si recens sit, astringentis nonnihil qualitatis obtinet.
Nucleus arefactus & uustus, tenuium partium & exic-
catorium citra morsum est medicamen. At pontica nux, Nux pontica.
quam λεπτοκάριον & auellanā appellat, plus habet es- Auellana.

sentiã terrestris ac frigide. Itaq; austerior tum cortex,
tum planta, tum fructus apparet.

Caucalis.

Caucalis.

EXcalfacit & desiccatur. Præterea urinam ciet, mu-
riaq; ad repositionem conditur.

Carpesium.

Carpesium.

Simile est ualerianã, tum gustu, tum facultate. Sed
plus habet tenuitatis. Proinde magis ea uiscerum
obstructiones extergit, urinam mouet, renesq; calcu-
lis degauatos expurgat.

Cenchrum, Milium.

Cenchrum.
Milium.

Primo ordine refrigerat. Exiccat uerò tertio exolu-
to, aut certè secundo intēso. Paululum etiam tenui-
tatis sortitur. Quibus de causis inter omnia frumenta-
ria edulia minimum nutrimenti largitur. Ventrem ta-
men desiccatur, forisq; ad motū in sacculis, idoneū fomē-
tum est ijs que citra morsum exiccari postulant.

Cedrus.

Cedrus.

Cedrea.

Cedrus specie est duplex: altera fruticosa iunipero
assimilis: altera arbor non exigua. Vtraq; est cali-
da siccaq; temperaturæ tertij quodammodo ordinis
secundum utrunq;. Ceterum cedrea (uocatur ita cedri
oleum) quartum etiam ordinem attigisse uidet, admo-
dum calida & tenuium partium. Quare mollem uiuen-
tium carnem promptè, citraq; dolorem putrefacit. Nā
mortuorū corpora exiccat, simulq; à corruptione tue-
tur: utpote humiditates eorū depascens: at solida haud
quaq; attingens corpora. Nec mirum uideri debet, si
quā tanta ui polleat, lendes, pediculos, tineas, auriumq;
uermes interficere ualeat: tum foetum uiuentem quidē
interimat: extinctum autem eiiciat: quemadmodū &
ipsum semen, si coeundi tempore, pudendo ea circūli-
natur. Proinde partui aduersum est medicamē. Quod
etiam dentium foraminibus instillatum, eos & cōfrin-
git, & à dolore liberat. Extenuat quoq; oculorum cica

trices, & uisus hebetudini ab humorū crassitudine or-
te medetur. Utuntur autem ea plebei, quum ad uulne-
ra ouibus inter tondendū à forfice illata, tum etiā con-
trā ipsarum scabiem & ricinos, quos *κρότωνας* uocat.
At fructus moderatiores existūt, adeò ut comedi pos-
sint. Quanq̃ si ijs liberalius utare, capiti dolorem infe-
rent, ardoremq̃; ac morsum in uentre percipies.

Centaurium maius.

R Adix eius gustui acris simulq̃; astringens appa-
ret, cum leuicula quadam dulcedine. Quòd uerò
ad actiones pertinet, menses prouocat, uiuum foetum
extinguit, extinctumq̃; propellit. Præterea ulcera glu-
tinat, sanguinemq̃; reſcientibus prodest. Exhibentur
autem eius binæ drachmæ, febrientibus quidem cum
aqua: feбри uerò liberis, cum uino. Quinetiam ruptis,
conuulsis, dyspnœg, inueteratq̃; tusi est auxilio. Eadē
quæ radix, & succus ipsius præstat.

Centaurium minus.

H Vius radix planè inefficax est: at caulis & folia, et
flores, utiliora sunt. Vincit enim in eis qualitas
amara, paululum habēs & astrictionis: ob idq̃; admo-
dum exiccatorium est medicamen, expers mordacita-
tis. Ulcera itaq̃; magnæ herbæ ipsius recētis illitu glu-
tinantur: & ue: uſta, quæq̃; egrè ad cicatricem perducī
queunt, cicatrice obducuntur. Arefacta uerò glutina-
torijs & desiccatorijs miscetur facultatibus. Miscetur
etiam ijs quæ rheumaticis medi: tur affectibus. In qui-
bus ea medicamina præstantissima sunt, quæ uehemē-
ter desiccantia cum quadam astrictione nullam habēt
mordacitatem. Decoctum herbæ quidam infundūt is-
chiadicis, ceu biliosa & crassa extrahens: nam & talia
purgat. Succus eius præter dicta, cum melle oculis illi-
nitur, mensesq̃; & foetum euocat. Iecinoris quoq̃; ob-
structiones optimè aperit, bonumq̃; durato: lieni est
remedium, & impositum foris, & bibitum.

Cedri fructus.

*Centaurium
maius.*

*Centaurium
minus.*

Cerasia.

Cerasia.

Quæ dulcia sunt, magis aluum subducūt, sed minus grata stomacho sunt. Austera uerò, cōtrario modo. At acida, pituitosis excrementosisq; stomachis sunt idonea. Siquidem austeris magis exiccant, & non nihil etiā incidunt. Ipsius arboris gummi, arterias asperas lenit, calculisq; uexatos adiuuat,

Ceratonia.

Ceratonia.

Exiccantis astringētisq; facultatis est, tum arbor ipsa, tum fructus. Qui quidem si sumatur humidus, magis uentrem subducit; si autem siccus, magis eundem sistit.

Cestrum, Betonica, Psychotrophon.

Cestrum.
Betonica.
Psychotro-
phon.

Vim habet incidendi, ut gustus indicat. Est enim subacris & amariuscule. Quare calculos renum frangit: pulmonem, pectus, & iecur expurgat: menses promouet: comitialibus prodest: rupta conuulsaq; curat, omnibusq; bestiarū moribus illita auxiliatur. Postremo acidū ructantibus & ischiadicis, bibita pdest.

Cecis, Galla.

Cecis.
Galla.

Quæ omphacitis dicit, admodum acerbum est medicamen, pleraq; sui parte essentia terrena & frigide, per quā desiccatur, repercutitq; fluxiones. Esto uerò tertij in desiccādo, secūdi autē in refrigerādo ordinis. Altera autē galla, flaua illa & magna, laxaq; & ipsa desiccatur quidē, sed tantò minus, quāto minus acerbae qualitatis est particeps. Cocta itaq; ipsa per se in aqua, aut si magis astringere uis, in uino aliquo austero, ac dein trita, cataplasma est nō instrenuum sed inflammatae, procidenti q; Gallae combustae, extinctaeq; in aceto aut uino, sanguinis reprimendi facultatem acquirunt.

Cera.

Cera.

Inter primas quatuor qualitates mediū quodāmodo obtinet. Habet uerò quiddam crassae essentiae & emplasticum. Quamobrem aliorum medicamentorū

materia existit. Ipsa autem per se ex genere fuerit debili-
liter concoquentiū. Habet tamē quiddam digerentis,
calidāq; potentiā, quæ plurima melli inerat.

Cici Ricinus.

VT fructus eius expurgat, detergit, & digerit, sic Cici.
etiam foliū, sed unde quaq; debilius. Oleū quod Ricinus.
ex semine conficitur, calidius atq; tenuius est, q̃ cōmu-
ne oleum, ac proinde potentius digerit.

Cinnamomum.

Summè tenuium est partium, atq; ex tertio ordine Cinnamomū.
calfacientium. Nihil autem æquē desiccāt, eorum
que pariter calfaciūt, ppter tenuitatē essentię. At Cin- Cinnamomis.
namomis, ueluti imbecillum est cinnamomum.

Circæa.

DIoscorides ait radicem eius ex uino dulci potā, Circæa.
secundas purgare. Est enim boni odoris, & cal-
factoria. Semē autem eius in sorbitione exhibitum, ad
lactis generationem conducit.

Cisthus.

FRutex astringens est. Folia eius & parua germīna Cisthus.
trita adeò desiccant, astringuntq; ut ulcera' gluti-
nare ualeant. Sed flores efficaciores sunt, adeò ut cum
uino poti dysenterias, uētris imbecillitates, fluxusq; &
humiditates persanent; Cataplasmatibus ritu illiti, ulcerū
putredinosa iuuant. Desiccant enim secundo excessu.
Hypocistis multò est magis astrictoria q̃ folia, admo Hypocistis.
dum efficax remedium ad omnes fluxionū affectus.
Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ ui-
delicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmi-
tudinem illi haud segniter addit. Quo nomine antido-
to ex uip. ris inditur.

Cisthos, Ladanum.

PRimo excessu medicamen est quodammodo com Cisthos.
pletè calidum, ita ut secundum attingat, habens etiā Ladanum.
astrictionis nonnihil. Est præterea substantia tenui, &

emolliens, necnon moderatè digerens, cōcoquensq;. Peculiariter igitur ad uteri vitia est aptum. Diffuentes tamen capillos retinet. Cæterum alopecias & ophthalmias sanare non potest, quòd hi affectus ualētiora medicamenta desiderent.

Cissos, Hedera.

Cissos.
Hedera.

EX contrarijs facultatibus cōstat. Habet enim quidam astringentis substantiæ, quæ terrea & frigida existit: habetq; nonnihil acris, quam calidam esse uel gustus cōprobat: præterea si uiridis sit, obtinet etiā quandam aqueam & tepidam. Viridia igitur folia in uino decocta, grandia ulcera glutināt, malignaq; ad sanitatem reducunt. Igne factas exulcerationes cicatrice obfirmant; cum aceto decocta lienosis opitulantur. Flores autem quodāmodo ualidiores sunt. Succus medicamen est errhinō; uetustas aurium fluxiones sanat, necnon uetera ulcera tum aurium, tum narium. Lachryma hederæ perimit lentes, pilisq; nudat. Adeò quippè est calida, ut etiam obscure adurat.

Clinopodium.

Clinopodiū.

CAlfacit simulq; siccatur in tertio ordine, estq; subtilium partium.

Clematis.

Clematis.

HVius folia acrem & adurentem obtinent facultatem: adeò ut lepras excoriēt. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacientium initio. Dicitur etiam Clematis illa herba, quam nonnulli polygonoidem appellāt. Quæ tantum abest ut exulceret, ut profluuijs & dysenterijs cum uino pota auxilietur, mansaq; dentium dolores mitiget, ac deniq; doloribus uteri in pello ad mota sit usui.

Cnicos.

Cnicos.

CNici semine duntaxat ad purgationes utimur. Estq; tertij ordinis excalfacientium, si quis foris eo uti uolet.

Coccus cnidius, Granum gnidium.

E Tipsum quoq; purgat, sed acris est, adurentisq; facultatis. Coccus cni-
dius.

Coccus baphicus, Granum tinctorium.

A Stringentem simulq; amaram possidet qualitatem. Coccus baphi-
cus.
Vtraq; sine morfu desiccatur. Proinde ad ingentia Granum tin-
ctorum.
uulnera congruit, & ad neruorum uulnerationes.

Coccymelea, Prunus.

P Runi fructus uentrem subducit, recens quidem plus, Coccymelea.
aridus minus. Minus tamen subductiua sunt Da- Prunus.
mascena pruna ipsa quae ex Iberia aduehuntur. Quin et
ipsae arbores fructibus proportionem respondent. Por-
ro quorum in germinibus astrictio quaedam manifesta
in esse apparet, ipsa decoctis, phlegmone in columella
aut consillis consistentes idonee colluuntur. Iam ue-
ro agrestium fructus, euidenter est astrictorius, uen-
tremq; sistit.

Colla, Glutem.

G Luten quod ad libros preparant ex similagine & Colla.
garo, emplasticæ, & coctoriæq; facultatis existit. Glutem.

Colocynthe, Cucurbita.

H Vmida & frigida est in secundo ordine. Quare Colocynthe.
succus eius rosaceo mistus, aurium dolori contra Cucurbita.
cto ex phlegmone, est utilis. Præterea restinguit sitim.

Colocynthis.

G Vstu amara est, uehementerq; purgatoria facul- Colocynthis.
tate prædita. Ipsius uirentis succus intritus, is-
chiadicis prodest.

Comarus, Arbutus, Cuius fructus Vnedo.

F Ructus una cum arbore acerbus est. Est autem hic Comarus.
& insensus stomacho, & capiti dolore concilians. Arbutus.
Vnedo.

Commj, Gummi.

I Achryma est concreta in truncis arborum ipsam Commj.
producentium: estq; exiccatoria & emplasticæ fa- Gummi.
cultatis, asperitatibusq; medetur.

Conia, Lixiuum.

Conia.
Lixiuum.

OMnium maxime absterforium exiccatoriumq; est, quod ex cinere ficus & tithymallorum efficitur: fereq; putrefacientis est facultatis.

Conyza.

Conyza.

COnyza & maior & minor adsimilis sunt, tum temperaturæ, tum facultatis, gustu amaræ & acres. Luculenter autem excalfaciunt: siue quis folia cum teneris ramulis parti infricet: siue ubi oleo incoxerit, eoutatur. Siquidem rigores per circuitum redeuntes, sanare tale oleum uidetur. Consimilis quoq; flores sunt facultatis. Quos quidem nonnulli ex uino propinant, ad educendos menses, atq; pellendum foetum. Est & tertium conyzæ genus in locis humidioribus nascens, utrisq; illis graueolentius & imbecillius. At primæ memoratæ, calfaciunt & siccant in tertio ordine.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

Coriannon.
Corion.
Coriandrum.

HAncherbam refrigeratoriā esse Dioscorides prodidit, q̃ mistapani aut polentæ, illitaq; erysipelas curret. Quanq̃ certè exactum aliquod erysipelas, quod utiq; inflammatum est, & flauum, haud unq̃ a tali cataplasmate persanabitur: sed illud tantum quod refrigeratum iam fuerit. Coriandrum itaq; ex contrarijs facultatibus constat, plurimū habens essentie amaræ, quæ tenuiū partium est & terrena. Nec parum etiā aqueę humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis. His adiunctum est quoq; astrictionis paxillū. Quod autem longè a refrigeratione absit coriandrum, hinc constat, q̃ choeradas siue strumas, cum lomato discurtiat: id quod nullum refrigerantium medicamentorū facere est aptum.

Coronopus.

Coronopus.

Coronopodis radix coeliacis prodesse creditur manducata.

Costus.

L Euiculam planè amaram: plurimam autem acré *Costus.*
 & calidam in se qualitatem simul et facultatē ob-
 tinet, adeò ut etiam exulceret. Quare in quibus ex cal-
 facere partem quāuis, aut ex alto in superficiem extra-
 here quippiam est opus, ad costum cōfugitur. Eadem
 de causa urinas mensesq; puocat: & ad rupta, conuul-
 sa, & laterum dolores congruit. Porro ob amaritudi-
 nem quæ illi inest, latos lumbricos enecat, maculasq;
 à sole cōtractas exterit, illitus cum aqua aut melle. In-
 est item flatuosa quædam illi temperiei humiditas, per
 quam & uenerem excitat cum uino mulso.

Cotyledon, Umbilicus Veneris.

H Vmidam, subfrigidam, obscurè astringentem, ac *Cotyledon.*
 leuiter amaram obtinet facultatē. Vnde refrige- *Umbilicus*
 rat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phlegmonas *Veneris.*
 erysipelatodeis, & erysipelata¹ phlegmonode persa-
 nat: æstuantiq; uentriculo commodissimum cataplas-
 ma existit.

Crania, Cornus.

F Ruētus eius admodum acerbus est, esuiq; aptus: *Crania.*
 proinde ualenter aluum restringit, quemadmodū *Cornus.*
 & mespila. Folia quoq; & germina pacerba sunt gu-
 stui, ualenterq; desiccant. Itaq; maxima uulnera gluti-
 nare possunt, potissimumq; durorum corporum.

Crambe, Brassica esculenta.

D Esiccādi uim habet, tum esa, tum foris imposita: *Crambe.*
 non tamen admodum acrem. Præterea & uulne- *Brassica escu-*
 ra glutinat, & maligna ulcera sanat, phlegmonasq; iā *lenta.*
 induratas, atq; ægrè solubiles, necnon erysipelata id
 genus, epinyctidasq; et herpes curat. Habet quiddā
 etiam in se absterforiū, quo lepras elicit. Porro semen
 eius potum, amarum quum sit, lūbricos perimit. Eadē
 facultate ephelidas, lentes, & quæcunq; modicam ab-
 stersionem postulant, adiuuat. Cineres caulium brassi-
 cæ desiccant usq; adeò, ut causticæ facultatis partici-

pes esse uideantur. Quibus sanè cum adipe mistis contra inueteratos laterum dolores utuntur. Sic nāq; ualenter digerens pharmacum redditur.

Crambe agria, Brassica agrestis.

Brassica agrestis.

C Alidior sicciorq; et amarior q̄ domestica est: quā obrem nec citra noxā intra corpus sumit. Extergit autem & degerit q̄ domestica etiam ualentius.

Crambe thalattia, Brassica marina.

Brassica marina.

N On solum aluū deijcit, subsalsa & subamara exstēs, sed etiā ē ad externos corporis usus idonea,

Cratæogonos.

Cratæogonos

F Ructus eius & acris gustanti est, & utenti frigidus, similis milio.

Crethmon.

Crethmon.

G Vstātibus falsum est, cum paucula amaritudine: quā obrem uis eius est exiccatoria, & abstersoria.

Crithe, Hordeum.

Crithe.
Hordeum.

P Rimi est ordinis in exiccando & refrigerando. Habet etiam abstersionis paxillum. Præstat in cibo fabis, q̄ flatuosam naturam exuat. Quantūcūq; enim fabas coxeris, flatuosa semper illis natura remanet. Sunt quippè crassioris essentiae quā hordeum, ob idq; eo plus etiam alunt. At polenta multò plus hordeo deficcet.

Crimnon.

Crimnon.

P Lus nutrit quā polenta, sed ægrius concoquitur. Sorbitio quæ ex eo conficitur, si ex zea fiat, leuiter uentrem sistit.

Crinos, Lilium.

Crinos.
Lilium

L Ilī flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aquea, eaq; temperata. Quare quod ex eo conficitur oleum, digerendi, emolliendiq; citra morsum facultatem sortit: unde fit, ut uteri sit duritiibus aptissimū. Porro radix foliaq; per se trita, deficcant, abstergunt, & digerunt.

moderatè. Proinde quoq; ambustis compeunt. Radicem ergo tostam, ac dein rosaceo cōtritā, ambustis quoad obducāt cicatrix, imponunt: quū sit etiā ulcerū aliorum remedium. Emollit; præterea uteros, mēsesq; prouocat. Ceterū quum aut uirilignes, aut pforam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, cōmiscemus illi aliquod aliorum medicaminum ualidius extergentium, cuiusmodi est mel. Imposuimus uerò etiam quandoq; & foliorū succum cū melle & aceto coctum. Eratq; respectu utriusq; portio ipsius succi quincupla. Atq; itaq; conficiebatur insignis medicamentum ad omnia ulcera, quæ exiccati absq; morfu postulant.

Crocodilion.

Crocodilij semen acre est, atq; odoratum, urinam mensesq; ciens; itaq; facultatem habet calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis sint facultatis, nephriticos adiuuat. Radix pectoris excreationibus ualenter conducit. Trahit uerò etiam per nares sanguinem.

Crocus.

Secūdi quidem est ordinis excalfacientium: primi uerò exiccantiū. Proinde concoquendi quoq; uini obtinet, adiuuante etiā ad id, quadā exigua astrictione.

Crommyon, Cæpa.

Cæpa ex quarto est ordine excalfacientium. Essentia eius potius crassarum est partium. Vnde etiā hæmorrhoidas aperit, tū apposita, tum cū aceto inuncta. In sole alphas abitergi, tū alopecij attrita pilos alcyonio citius restituit. Succus eius n̄s q; suffusi sunt, aut aciem oculorum obtusam præ crassitudine humorum habent, inunctus prodest. Ob huius temperaturā tota cæpa flatuosa est, manducata. Itaq; quæ temperie sicciore sunt, minus flatuum generant.

Cyamos, Faba.

Cyamos.
Faba.

MEdiocriter exiccat, refrigeratq;. At caro eius paulum quoq; abstergentis facultatis cōtinet: sicuti putamen nonnihil astringentis. Porro ut edulium, flatulēta est, & coctū difficilis, si quid aliud: excreationibus ex pectore & pulmone idonea. Vt medicamentū uerò, foris imposita, desiccat innoxie. In podagricis ea sæpenumero usi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. Ad neruorū tum contusiones, tum uulnera, farinā eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos quos ex ictu iam occupauerat phlegmone, cum polenta. Sed & testū & uberum aptū est cataplasma. Quo quidem & lac ipsum extinguitur, & puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra pmanet.

Cyclaminus, Rapum, Tuber terræ.

Cyclaminus.
Rapum.
Tuber terræ.

Abstergit, incidit, ora uenarum aperit, attrahit, & digerit. Succus eius hæmorrhoidas reserat, uiolēterq; ad secessum puocat, in floccis appositus. Sic etiā facultatibus phymata, strumas, aliasq; durities digerētibus cōmiscetur, ac suffusis cum melle illitus competit. Ad hæc per nares expurgat. Adeò uehemens eius facultas est, ut abdomine illito, subducatur aluum, & foetum perimat. Tota autem radix succo imbecillior est, q̄q̄ & ipsa uehemens satis. Nam & mēses siue epota, siue apposita, euocat, & aurigini prodest. Modus eius bibendi est drahmarū trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem detergit, ac tū alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curat: necnō auxilio est lienī indurato. Fructus etiam alterius cyclamini, quā nonnulli cyssanthemon nominant, cum uino pluribus diebus potus, sanat lienem, urinas mouens, atq; aluum subducēs. Locos quoq; eiicit, atq; asthmaticis auxiliat. Qualitas eius gustui acris est & sublentā.

Cyminum, Cuminum.

Cyminum.
Cuminum.

CYmini semen calfacit in tertio ordine, urinā mouet, extinguitq; flatus.

Cynos batus, Sentis canis.

H Vius fruticis fructus non segniter astringtorius *Cynos batus.*
 est. Folia uerò mediocriter, lanugo fructus, arte. *Sentis canis.*
 riam uitiat.

Cyparissus, Cupressus.

C Vpressi folia, germina, pilulæ recentes & molles, *Cyparissus.*
 magna ulcera glutināt in duris corporibus. Qua *Cupressus.*
 re resiccandi uim habent absq; insigni acrimonia aut
 calore. Tāta enim ei acrimonia inest, caliditasq; quā-
 ta satis sit deducēdæ in altū acerbitati. Proinde in alto
 latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humi-
 ditates, innoxie depascit et populatur. Sic enterocœli-
 cos iuuat, exiccans, roburq; addens corporis partibus
 præ humiditate laxatis. Quidam ea utuntur ad carbun-
 culos, herpesq; polentæ miscentes. Sunt qui ad ery-
 sipelata utantur.

Cyperus, Iuncus quadratus.

C Yperi radices exalfaciunt pariter & siccāt absq; *Cyperus.*
 mordacitate. Itaq; ulceribus inueteratis mirifice *Iuncus qua-*
 profunt. Habent etiam quippiam astringens: quapro- *dratus.*
 pter ulceribus item oris conueniunt. Quin & inciden-
 di uim quampiam illis inesse testificandum est, qua &
 calculos exterunt, & urinam mensesq; prouocant.

Cypros.

H Vius arboris folia summaq; germina habent in *Cypros.*
 se quiddam digerēs cum aquea substantia modi-
 cè calida: habentq; & astringtionem quādam ex terre-
 na substantia frigida. Itaq; eorum decocto quidā am-
 busta fouent, necnon igneas phlegmonas, carbuncu-
 losq;. Nam absq; molestia siccant. Sed sponte ortis in
 ore ulceribus cōmansa folia cōmodissima sunt.

Cytisus.

C Ytisi folia digerendi facultatē obtinent, aquæ & *Cytisus.*
 temperatæ mistam, ut malua.

Coneion, Cicuta.

Conion.
Gicuta.

Quod extremè sanè refrigeret, omnes norunt.
Conos.

Conos.
Strobilus.
Cocalus.

Coni fructus, quem cocalum & strobilum appellant, uiridis totus, habet cum humiditate amaritudinem quampiam & acrimoniā. Proinde purulentis, & ijs quibus facile expuere est opus, accommodatur. Quod esculentum est, nutrimentum est coctū difficile & ualidum. Vt medicamen autem asperitati leniendæ congruit, si præmaceratus in aqua, omnem acrimoniā exuerit. Nam reliquū sic minus mordax efficitur, in medio calidæ & frigidæ qualitatis consistens: ex aquea et terrea mistū substantia, minimum participās aeris.

Lagopus.

Lagopus.

Facultatis est desiccantis, adeò ut fluxus alui probe exiccet.

Lathyris.
Esula.

Lathyris.

Et succo, & purgatoria ui, tithymallū refert: nisi quod semen apparet dulce, licet maximè sit purgatoriū.

Lampfane.

Lampfane.

Esa quidē succos prauos procreat. At illita, abstergendi, digerendiq; nōnullam facultatē sortitur.

Lapathum.

Lapathum.
Oxylapathū.

Digerit moderatè. At oxylapathum, nonnihil etiā repercutit. Manifestè ipsorum semen astringit: ita ut dyarrhæas & dirrhœas persanet.

Limonium.

Limonium.

Eius fructum, utpote acerbum, ex uino exhibēt coeliacis, dysentericis, et hæmoptoicis. Iuuat & profluuium muliebre. Satis est oxybaphi mensura.

Leichen.

Leichen.

Leichenas curat, extergentem, modicèq; refrigerātem, ac siccantem obtinens facultatem. Nascur enim in humidis roreq; perfusis saxis.

Leontopetalon.

Leōtopetalō.

Radix eius, digerendi facultatem, et exiccandi, cal

faciendūq; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

EX quarto est ordine excalfacientium, simile prorsus Lepidium. nasturtio, nisi q̄ minus desiccet.

Leucas.

A Crem possidet qualitatem exuperantem: tempe-
faturam uerò calidam, siccamq; in tertio quo-
dammodo ordine.

Leucacantho.

H Vius radix amara est, ac p̄inde incidit, exiccatq; Leucacantho.
in tertio ordine. Calfacit autem in primo.

Leucoion.

EXtergit ac tenuium est partium: plus tamē flores, Leucoion.
ac præcipuē qui sunt sicciores. Hi quippè & oculorum crassas cicatrices extenuant. Præterea menses eorum decoctum mouet, secūdas, & partum emortuū elicit, bibitumq; facit abortum: maximè amarum quū sit. Quòd si eius uires multa mistione aquæ frangant, erit contra phlegmonas, & difficilia ulcera, cōmodum medicamen. Semen etiam eiusdem est facultatis, radicesq; similiter, nisi q̄ hę sunt crassioris essentię, terreęq; magis. Cum aceto tamen lienes induratos p̄sanant.

Leuce, Populus alba.

EX aquea, tepida, & terrena extenuata essentia con-
flatur. Quamobrem & abstergentis facultatis est
particeps.

Leuce.

Populus alba.

Libanotus, Thus.

EXcalfacit secundo ordine, desiccet primo, habet
quoq; astrictionem pusillam. Cortex eius euiden-
ter astringit, desiccetq; in secūdo ordine. Est autē cras-
siorum partium q̄ thus, & minimum acrimonię pos-
sidet. Quare in hæmoptoicis, stomachicis, cœliacis, &
dysentericis eo utimur. Ramus eius, siccioris & cali-
dioris ē facultatis q̄ ipsum thus, adeò ut ad tertiu usq;
excessum perueniat. Habet uerò etiam & abstersoriū

Libanotus.

Thus.

*Andreas mat-
thiolas cōtē-
dit legendi*

*Nota Juligo. no' Ramus. ipsū legito cap: de
Thus in Dioscoridam.*

144 GAL. PER. DE
quiddam. Vnde expurgare & implere oculorum ul-
cera potest.

Libanotides.

Libanotides.

Libanotides tres existunt: una sterilis, duæ fructum
ferentes. Omnes uerò emollientis, digerentis, inci-
dentis, & abstergentis sunt facultatis. Succus tum radi-
cis, tum herbarum mistus melli, obtusam oculorum aciem
ab humorum crassitudine emendat. Decoctum eius
quam rorem marinum appellant, potum, regio mor-
bo auxiliatur.

Lignys, Fuligo.

Lignys.
Fuligo.

Fuligo omnis exiccatoria est, ob idq; terrenæ essen-
tiæ: habēs quasdā etiā ignis etsi pusillas reliquias:
ratione quarum tenuium est partium. Ceterū quæ spe-
ciatim in ea differentiæ sunt, eæ pro uita materia eue-
niunt. Thuris fuligine utimur ocularibus medicamē-
tis permista, ijs uidelicet, quæ ad oculos etiānum phleg-
mone tentatos, & qui adhuc fluxione affliguntur, exul-
cerati uel sunt, accommodantur. Nam & illa expurgat, &
carne implet. Terebinthinæ etiam myrrhæq; fuligo,
molestia caret: non secus q̃ thuris. Sed styracis quodā
modo ualentior est. Magis etiā picis liquidæ. Qua ad-
huc magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia su-
perciliorum uocata pila, & erosos angulos oculorū,
& citra phlegmonem humidos.

Lybisticum.

Libisticum.

Lybistici radix et semen, ex genere excalfacientium
sunt, aded ut et menses cieant, & urinas prouocēt,
flatusq; discutiant.

Linospermon, Lini semen.

Linospermon.
Lini semen.

Flatuosum est esum, etiam si frangatur. At calfacit
quidem quodāmodo in primo ordie, humiditatis
& siccitatis, in medio existens.

Linozostis, Mercurialis.

Linozostis.
Mercurialis.

Eutuntur omnes ad subductiones alui duntaxat:
Quandq;

Quandq̃ etiam admota, ualenter digerit.

Lonchitis.

R Adix eius quæ semē gerit triangulare, urinā ciet. *Lonchitis.*
Folia eius quæ scolopendriæ similis est, uiridia
quidem, uulnera glutinant; sicca autem, & cum aceto
epota, lienes induratos persanant.

Lycion.

A Rbor est spinosa, ex qua lycium fit, medicamē id *Lycion.*
liquidū, quo ad sugillata, sedis orisq̃ phlegmo-
nas, ulcerationes, herpetas, putredines, ulcera cōtuma-
cia, aures pure fluentes, intertrigines, & paronychias
utuntur. Est enim facultatis exiccatorix, compositum
ex diuersi generis substantijs, altera quidem tenuium
partium, digerente atq̃ calida; altera terrestri & frigi-
da, ex qua astrictionem exiguam obtinet. Ceterū dige-
rit & siccat in secundo ordine: in calore autem medijs
est proximum. Est porrò lycium Indicum ad omnia
ualentius.

Lyfimachios.

S Vperantem astrictionem sortitur: per quā omnes *Lyfimachios.*
sanguinis fluxus reprimat, tum pota, tum cataplas-
matis modò admota.

Lychnis.

S Emen eius calidum & siccum est, secundo quodā. *Lychnis.*
modo, aut etiam tertio ordine.

Lotos herba.

L Otos domestica, quam trifolium nominant, ut me *Lotos herba.*
diocriter cōcoquendi, sic etiā exiccandi uim pos-
sident, in caliditatis frigiditatisq̃ coniugio, media quo-
dammodo existens. Semen agrestis loti, secundi est or-
dinis calfacientium: habetq̃ nonnihil abstersoriū. Por-
rò Ægyptiæ loti semen etiam in panes fingitur.

Trifolium.

Lotos arbor.

N On ita multæ astrictorie qualitatē est particeps, *Lotos arbor.*
sed & tenuium partiū est, & exiccatoria. Cuius

siccę ramenta profluuiio muliebri, dysenterijs, capillorum effluuiio, cœliacisq; affectibus accōmodantur, aut in uino, aut in aqua concocta.

Macer.

Macer.

Cortex est qui ex India aduehitur, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata. Constat autem ex mista essentia, pleraq; terrena frigida, paucula uerò calida & tenuiū partium. Itaq; ualenter desiccatur, astringitq;: ob idq; cœliacis & dysentericis medicamentis miscetur, in tertio exiccantiū consistēs ordine: in caloris frigorisq; discrimine, neutrum insigniter præstans.

Malabathrum.

Malabathrū.

Malabathri folium cum spica nardi simillimam obtinet facultatem.

Malache, Malua.

Malache.
Malua.

Agreftis, quidem digerētis paululū & emolliētis leuiter est facultatis: hortēsis uerò, quāto plus habet aqueę humiditatis, tāto facultate ibecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto & siccior. Cæterū Althea omnium efficacissimè digerit.

Mandragora.

Mandragora.

Refrigerat tertio excessu. Nonnihil tamē pomis caloris atq; humiditatis inest. Vnde soporem conciliant. Radicis cortex non tantū refrigerat, sed etiam siccatur. Quod eo includitur, imbecillimum est.

Marathrum, Fœniculum.

Marathrum.
Fœniculum.

Calfacit in tertio, desiccatur in secundo ordine: proinde lac gignit, auxiliatur suffusis, mensesq; et urinas pmouet. Radix & semen hippomarathri, amplius q̃ domestici siccant: quare & uentrē uidentur sistere. Possunt etiā & calculos frangere, curare ictericos, mensesq; & urinas mouere: minimè tamen lac gignere.

Mastiche.

Mariche.

Candida quidem & Chia, astringit simul emol-

litq; Proinde stomachi, uētris, intestinorum, iecorisq; inflammationibus competit, utputa secūdo ordine exal faciens & siccans. Nigra uerò, quæ Ægyptia dicitur, magis desiccet, minusq; astringit: quamobrem aptior est ad ea quæ ualidiorem digestionem per halitum postulant. Porrò oleum, quod præcipuè ex Chia conficit, similis est cum mastiche facultatis.

Melanthium, Nigella.

Excalfacit & siccet in tertio ordine, estq; amarum, atq; tenuium partiū. Quare catarrhos sanat in linteo admotum, atq; assiduè olfactum: flatus potū extinguit: lumbricos enecat, non esum modò, sed etiam foris applicitum: lepras, clauos, atq; myrmecias exterit: orthopnoeam iuuat, & menses puocat: in summa uerò ubi sectione, extersione, desiccatione, exalfectione est opus, præstantissimum id remedium existit.

Melanthium,
Nigella.

Melilotum.

Quidam habet astringens, digerit tamen, concoquitq;. Copiosior enim in eo est substantia calida q̃ frigida.

Melilotum.

Mel.

Desiccet exalfacitq; secundo ordine: ac detergentem facultatē obtinet. Porrò coctū, minus acre abstersoriumq; redditur. Itaq; ad sinuosorum ulcerū glutinationē eo utuntur. Cæterum quod mel est amarum, mistæ facultatis existit. At Saccharo, quod ex India et foelici Arabia conuehitur, concreuit in calamis, estq; mellis species, minus certè nostrate dulcius, sed similes ei uires obtinens, quod ad abstergendum, desiccandum, & digerendū pertinet. Quatenus uerò nec inimicum uentriculo est, ut nostras, nec sitim adferēs, eatenus ab illo substantia differt.

Mel.

Saccharum.

Melissophyllon, Citrargo.

Marrubio similis est facultate, sed plurimū ab eo uiuicetur. Quamobrē nec utitur eo quispiam, quū

Melissophyl-
lon.
Citrargo.

larga marrubij copia suppetat.

Mespilum, Tricoccon, q̄ tria grana gerat.

Mespilum.
Tricoccon.

F Ructus eius admodum est acerbus, uixq; edi possit, uentrem extremè coercens. Quin & in germi-
nibus & folijs acerba hæc qualitas non pauca reperit̃.

Medion, Trifolium odoratum.

Medion.
Trifoliū odo-
ratum.

R Adix quidem eius austera est, omnesq; fluxiões
cohibet. At semen tantum abest ut id moliat̃ur,
ut etiam menses cieat: nimirum tenuium partium quū
sit, & facultate incidendi præditum.

Mecon, Papauer.

Mecon.
Papauer.
Roxas.

Q Vum quatuor eius insignes species sint, facul-
tas omnium existit refrigeratoria. Cæterū sati-
ui semē, mediocriter somnum conciliat, uisu candidū:
proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum
esitant. At ex syluestribus, eius quod rhœas dicit̃, quia
flos ipsius celeriter defluit, semen ualidius refrigerat.
Itaq; nequaquā eo quis innoxie solo uti possit. Illius ue-
rò quod calicem incidentem sustinet, atrum existit se-
men, medicamentosumq; atq; impensè refrigerans.
Quod autem longiorem emittit calicem, medicatis-
simum omnium est, admodumq; refrigerans, idq; om-
nibus partibus suis. Adeò quippe refrigerat, ut stupo-
rem ac mortem etiam inducat. Est enim ex quarto &
ultimo refrigerantium ordine.

Mecon ceratitis, Papauer cornutum.

Papauer cer-
tutum.

V Im habet incidendi, extergēdiq;. Itaq; radix eius
in aqua ad dimidiū decocta, hepaticos affectus
adiuuat. Folia & flores sordidis & contumacibus ul-
ceribus prosunt. Sed ea reſc̃ere oportet ulceribus iam
repurgatis: alioqui sanam carnem exedent.

Papauer Her-
culeum.

Mecon Heracleia. Papauer Herculeum.

S Emen habet pituitam expurgans.

Melea.
Malus.

Melea. Malus.

M Alus non omnis eiusdem naturæ est, sicuti nec

eiusdem fructus. Succi siquidem, cortices, foliaq;
arborum, etiā inter se dissident. Itaq; si acidiora auste-
rioraq; sint, illis uulnera glutinare possis, tum in phleg-
monarum initio repercutere influxum, ac uētriculum
exolutum & lāgnum roborare: at aquosioribus, me-
diocres phlegmonas incipientes & gliscentes remitte-
re. Quod autem plurima pomis omnibus recrementi-
tia frigidaq; insit humiditas, hinc liquet, q̄ nullus eorū
succus seruari possit: uerūm acescāt corrumpanturq;
uniuersi. Solus enim cydoniorum & struthorum (que
propter astrictiōem uehementem, cæteris minus sunt
humida) succus coctus cum melle durare potest: per
se autem minimè.

Succi qui ser-
uari possint, et
quomodo.

Melea Persice, Persica malus.

Ingerminibus & folijs uincentem habet qualitātē Persica malus
amaram. Proinde folia eius trita & super umbili-
cum posita, lumbricos enecant: estq; digerens medica-
men. Fructus humidior est, & temperie frigidior.

Melea Armenice, Malus Armenica.

Fructus humidior frigidiorq; est: Vtrunq; secun- Malus Arme-
do quodammodo excessu. nica.

Melea Medice, Malus Medica, Citrium.

Quod in fructu semen amplectitur tertij est or- Malus Medica.
dinis resiccantium atq; refrigerantium. Cortex
desiccatur quidem in excessu secundo, non tamen frigi-
dus est, sed temperatus, aut paulò infra. Caro eius pa-
riter crassi succi est, & pituitosa, frigidaq;. Semen ama-
rum est, digerereq; & exiccare potens, secundo quo-
dammodo ordine à temperatis recedens. Folia exiccā-
di & digerendi uim obtinent.

Meum.

Radices eius sunt calidæ tertio excessu, in secundo Meum.
siccæ. Proinde urinas mensesq; mouent. Quòd si
liberalius sumantur, capiti dolorem conciliant.

Milax tracheia, Milax aspera.

Milax aspera.

V Arijs clauiculis suis arboribus circūuoluitur Folia eius & acria gustanti, & utenti calida existūt.

Milax lenis.

Quodāmodo iam dictæ similes uires obtinet.
Milax lenis.
 Morca, Morus.

Morus.

Mori fructus maturus quidem aluū subducit: immaturus uerò, ubi aruerit, restringit admodum. Quare ad fluentes affectus est cōmodus. At maturorū succus, propter astrictiōem quam habet, ad stomatīca medicamenta est utilis. In radicis cortice purgatoria uis cum quadam amaritudine exuperat, ita ut latos uermes enecet.

Myagros.

Oleum quod ex semine ipsius funditur, emplasticam facultatem obtinet.
Myagros.
Mycetes, Fungus.

*Mycetes.
Fungus.*

Frigida humidaq; admodum plāta est, quare proximè ad enecātem facultatem accedit. Et sanè inter eos sunt qui interficiant: maximè qui ex natura mistam habent qualitatem putrilaginosam.

Myle.

Radix eius contrahentis est facultatis. Quam cum farina lolij apertā uuluā sanare ait Dioscorides.
Myle.
Myosotis, Auricula muris.

Myosotis.

Desiccat secundo ordine, cæterū nullam euidētem caliditatem sortitur.
Myrice, Tamarix.

*Myrice.
Tamarix.*

Abstergit & incidentis est facultatis, absq; perspicua desiccatione. Habet uerò etiam astrictiōem nōnullam. Igitur cum aceto decocta prodest lieni indurato. Sanat etiam dentium dolores. Fructus & cortex non paucam possident astrictiōem. At cinis myricæ, admodum desiccatoriæ facultatis est, plurimam habens abstergerendi uim, astringendi pauxillam.

Myriophyllon.

A Deo exiccat, ut uulnera glutinet.
Myrrhis.

Myriophylli.

R Adix eius est odorata et dulcis, mensesq; mouet,
nec nō thoracem atq; pulmones purgat. Calfacit
itaq; secundo ordine, cum partium tenuitate.

Myrrhis.

Myrrhine, Myrtus.

I N hac planta uincit terreum & frigidum. Habet ta
men aliquid tenue & calidum. Quare ualenter de
siccat. Porro quod ramis & trunco adnascitur tubero
sum, quanto siccus cæteris partibus est, tanto delic
cat & astringit uehemētius. Folia item arida uiridibus
plus desiccant. Itaq; omnes partes eius restringunt, tū
foris imposita, tum intro assumpta.

Myrrhine.
Myrtus.

Moly, Ruta syluestris.

R Adicem habet nigrā, & florem lacteū. Vis eius
tenuium partiū est, & calida tertio ordine; unde
crassos humores desiccatur, digeritq; & urinā mouet.

Moly.
Ruta sylue
stris.

GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIUM
MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber VIII.

Nardus stachys, Spica nardi.



ALFACIT excessu tertio. De
siccat secundo completo. Constat ex
astringēti, acri, & leuiter amara sub
stantia. Quare radix iecori et uentri
culo cōuenit, & pota, & admota ex
trinsecus. Urinam ciet; morius sto

Nardus sta
chys.
Spica nardi.

machi sanat, uentris, capitis, & thoracis, fluxiones de
siccat. Valenter tamen est Indica; quæ nigrior quā
Syriaca existit.

Nardus Celtica, hoc est Gallica.

Nardus Cel-
tica.

A Domnia est imbecillior dictis, præter quæ ad pro-
uocandam urinam. Nam calidior illis est, sed
minus astringit.

Nardus oreæ; hoc est montana.

Nardus mon-
tana.

P Lurima in Cilicia nascitur, sed prædictis infirmior:
Narthex, Ferula.

Narthex.
Ferula.

S Emen eius calfacit et tenuat. Medulla autem atri-
tionis est particeps. Vnde hæmoptoicis & cœ-
liacijs conuenit.

Napy.

Napy.

C Alfacit desiccaturque ordine quarto.

Narcissus.

Narcissus.

E Ius radix desiccatur adeo, ut uel maxima tendonum
uulnera glutinet. Habet uero quiddam absterfo-
rium & attractorium.

Neuras, Poterium.

Neuras.
Poterium.

D Esiccatur citra morsum, adeo ut icisos neruos glu-
tinare credatur: ac præcipue radices eius.

Nerium, Rhododaphne.

Rhododaphne.

F Oris quidem illitus is frutex, digerendi uim obti-
net. At si intra corpus sumatur, uirulentus homini
& plerisque pecudibus est.

Nymphæa.

Nymphæa.

T Vm radix eius, tum semen, desiccandi citra mor-
sum uim habet. Itaque uentris profluvia, semenque im-
modice profluens sistit. At cui adest candida radix, ea
& muliebri medetur profluvio, ex uino nigro & auste-
ro epota. Vtraque autem abstergendi quandam uim pos-
sidet. Quare maceratae quidem aqua, sanant alphos, li-
quida uero pice, alopecias. Ad hæc tamē aptior est ea
cuius radix est nigra.

Xanthion.

Xanthion.

S Emen eius digerendi uim obtinet.

Xyris.

T Enuium partium, attractoriæ, digerendi, & desiccandi facultatis est, quæ radix, tum multo magis fructus: qui quæ idem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

Xyphion, Gladiolus.

X Yphij radix, maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccatur; Xyphion. Gladiolus.

Oe, Sorbus.

A Stringentem uim obtinet, at multo quæ mespilus imbecilliore. Proinde fructus eius gustui iucundus est, minusque uentrem quæ mespilus constringens. Oe. Sorbus.

Oenos, Vinum.

E X secundo est ordine calfacientium: sed quod admodum uetus est, ex tertio: sicuti mustum ex primo. Caliditati proportionem respondet siccitas. Oenos. Vinum.

Olynthi, Grossi.

A Crem facultatem sortiunt. Cocti itaque duros tumores discutiunt: crudi myrmecias & thymos eiciunt. Olynthi. Grossi.

Olostium.

D Esiccandi uim obtinet cum astrictione: ideoque propinatur ad rupta. Olostium.

Olyra.

M Ediam tritici & hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum, quæ ut medicamentum. Olyra.

Onagron.

H Vius radix arefacta uinosum quiddam redolet, maximeque ad uini facultatem accedit. Onagron.

Onosma.

A Cri & amara substantia constat. Cuius folia in uino pota foetum extinguere expellereque credunt. Onosma.

Onobrychis.

R Arefaciendi digerendique uim obtinet. Proinde folia eius uiridis illita, phymata digerunt: arefacta uero, & cum uino pota, strangurias sanant: sudoresque eliciunt, cum oleo inuncta. Onobrychis.

Ononis.

Ononis.

R Adix eius calfacit quodāmodo in tertio ordine, abstergitq; & nonnihil incidit. Itaq; non tantum urinas prouocat, sed & lapides frāgit, & crustas detrahit. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuerit cocta, colluuntur.

Oxos, Acetum.

Oxos.

Acetum.

EX frigida calidaq; substantia constat: utraq; tamen tenuium partium. Verum calidam frigida exuperat. Desiccat porrò in tertio gradu.

Oxyacanthos.

Oxyacanthos.

VT specie, sic facultate hæc arbor pīro syluestri est similis, Cæterū piri syluestris fructus, prorsus * acerbus est: oxyacāthes uerò, & tenuium est partium, & nonnihil incisorium sortitur: estq; rubeus & rarus. Qui quidem affectus omnes fluxionum conhibet.

Opos, Succus.

Opos.

Succus.

CYrenaicus quidem reliquos omnes caliditate & tenuitate exuperat: ideoq; omnium maximè per halitum digerit. Quancūq; sanè & cæteri admodum calidi sint, & ipirituosi. Porrò licet complures etiam sint alij succi, qui effluunt, incisa radice: ob excellentiam tamen sic dicitur Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus.

Origanus.

Origanus.

HEracleotica quidē efficacior est onitide: agrestis tamen est ualentior utraq;. Omnes uerò incidenti, extenuandi, calfaciendi, & exiccandi obtrinent facultatem, in tertio nimirum excessu. At Tragoriganus etiam quippiam astringit.

Tragoriganus

Orobus, Eruum.

Orobus.

Eruum.

DEsiccat quidem excessu secundo intēso, calfacit uerò primo. Porrò quatenus amaritatis est par-ticeps, eatenus incidit, extergit, atq; obstructiones expedit. Cæterum si sumatur copiosè, sanguinem per urinas euocat.

Orobanche, Eruangina.

Orobanche.
Eruangina.**S**iccæ frigidaq; temperaturæ est, in primo ordine.

Oryza.

Habet astrictorium quippiam, quare mediocriter
aluum sistit.

Orchis, Testiculus canis.

Radici eius bulbosæ & geminæ, uis inest humida
& calida, gustantibusq; dulciuscula. Cæterū ma-
ior radix multam habere uidetur humiditatem excre-
mentitiam, & flatulentam: quapropter epota uenerem
excitat. Minor uerò, quum ad calidius & siccius uer-
gat, tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etiam co-
hibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, tostæ.

Orchis, Serapias.

Orchis.
Serapias.**S**iccat ultra primū excessum. Quare nō ita est ad ue-
nerē cōmodus. Oedemata illitus discutit. Ulcera sordi-
da expurgat. Herpetes sanat. Siccatus multo amplius
desiccatur. Nam putrescētia contumaciaq; restituit ulce-
ra, & subastringens quū sī, uentrē sistit ex uino potus.

Osiris.

AMara est, & aperiendi uim obtinet. Quare iecur
obstructum adiuuat.

Pancratium.

Pancratium.

Radix huius, scillæ similem gustū refert, & uires,
multo tamē imbecilliores. Ea itaq; pro scilla, ubi
hæc non adest, utuntur.

Paliurus.

Paliurus.

Folia eius & radix adeò perspicuè astringūt, ut flu-
xum uentris cohibeant: adeoq; digerunt, ut mitio-
ra phymata curent. At fructus, tantam incidendi uim
possidet, ut calculos uesicæ cōminuat, & pectoris pul-
monisq; excretionibus auxilietur.

Papyrus.

Papyrus.

OXycrato uino'ue macerata, recentia ulcera gluti
nat, maximè in circulum circumposita, ut mate-

Chartæ cinis.

ria sanantia medicamina excipiens. At ubi usta fuerit, medicamen exiccatorium existit, ut chartæ combustæ cinis. *Hoc tamen cinis papyri est infirmior.

Panax Heraclium.

Panax Heraclium.

Opopanax.

EX hoc conficitur opopanax, radicibus et caulibus eius incisis. Porro opopanax ipsum tum mollit, tum digerit. At calfacit quidem in tertio ordine; in secundo autem siccat. Cortex radice excalfacit etiam & siccat, minus tamen quam succus. Cæterum abstergerendi nonnullam facultatem sortitur. Quare eo utimur & ad nuda ossium, & ad ulcera contumacia. Sufficienter siquidem quæ talia sunt, carnem procreant. Fructus calidus est & ipse, ac mensibus mouendis accommodus.

Panaces, Asclepium.

Panaces Asclepium.

MInus est calidum supradicto panace. Quare floribus eius & semine melli mistis ad ulcera, phymata, & phagædænas utuntur.

Panax cheironium.

Panax, Cheironium.

PRædicto similem facultatem obtinet.

Paronychia.

Paronychia.

PAronychias & fauos sanat, digeritque ea quæ discuti postulant. Calfacit enim & desiccatur in tertio ordine, estque tenuium partium, & sine mordacitate.

Pentaphyllum.

Pentaphyllum.

RAdix eius desiccatur uehementer, nimirum in tertio ordine, citra mordicationem tamen. Minimum si quid habet quàm acrimoniam, tum conspicue caliditatis.

Peplos.

Peplos.

SVccum habet similem tithymallis, quum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

Peplium.

Peplium.

ETiam fruticulus hic succum habet ut tithymalli, ualidumque, non tamen admodum utilem. Radix eius uidetur superuacanea. Semen utile est, & flatulentum, pepli semini similiter purgans.

Peperi, Piper.

Piperis radix uires costo similes obtinet. Fructus nuper germinātis, longum existit piper: quare maturo est humidius. At fructus qui ueluti omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam ueluti superassatum uidetur. Vtrunq; tamen ualenter & calfacit, & desiccatur.

Peperi.
Piperis disse-
rentiæ.

Persea.

Persea folia modicè astringunt, ita ut nonnunq; si- ftere queant sanguinem erumpentem.

Persea.

Periclymenos, Volucrum maius.

Fructus eius & folia adeò uehementer incidunt & calfaciunt, ut si diutius bibatur, urinam sanguinolentam efficiant: principio tantum urinam mouentia. Foris cum oleo illita etiam excalfaciunt. Iuuant & lenos, & difficulter spirantes. Competens mēsurā est drachmæ unius cum uino. Desiccatur etiam semē, & (ut quidā tradunt) si liberalius bibatur, sterilitatē inducit.

Periclymenos
Volucrum ma-
ius.

Peristereon.

Vim habet hæcenus desiccantem, ut & uulnera glutinet.

Peristereon.

Petalites.

Ex tertio est ordine desiccantium: quāobrem ad ca- coethe & phagedænica ulcera eam adhibent.

Petalites.

Petroselinum.

Eius semen est gustu acre, cum amaritudine. Sic & in operibus calidum, unā cum incidendi effectu. Hinc menses & urinas affatim prouocat, flatusq; discutit. Calfacit itaq; & siccatur in tertio ordine. Tota herba similem, sed imbecilliolem possidet facultatem.

Petro selinum.

Peucedanum.

Svecus eius admodum excalfacit & digerit, estq; tenuium & incidentium partium. Quare omnibus neruorum affectibus creditur opitulari: tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine humorum ortis.*

Peucedanum.

Nec uerò intra corpus sumptus duntaxat, sed olfactu etiam prodest. Ad hæc sæpe foratorum dentium dolores, cavitati impositus, primum mitigauit. Quin etiam induratos lienes iuuat. Ad quæ omnia, licet etiam uti radice, quæ & squamas celerrimè ab ossibus detrahit, & arida illita ulceribus contumacibus remedium est optimum: minus quidem quàm succus exalfaciens, nempe in secundo ordine iam completo: desiccans uerò in tertio incipiente.

Peganon. Ruta.

Peganon.
Ruta.

A Crestis quidem, in quarto ordine exalfacit: Dolestica uerò, in tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ex quo sanè digerere, incidereque crassos & lentos humores potest, atque mouere urinas. Quin et tenuium est partium, flatusque extringuit. Quare ad inflationes competit, ac ueneris appetentiam inhibet: digeritque atque exiccat strenuè.

Pissa. Pix.

pissa.
pix.

Sicca quidem siccatur, & calfacit secundo ordine. Atque plus siccare ualet quàm calfacere. Humida uerò contra, plus calfacit quàm siccatur: habetque partium tenuitatem nonnullam, qua asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mistæ. Abstergendi etiam, cõcoquendi, digerendique, quandam uim habent, ueluti in gustu leuem amaritatem & acrimoniam. Sic leprosos ungues eximunt mistæ cum cera, lichenasque deterunt. Coquunt item duros & crudos tumores, cataplasmaris inditæ. Atque ad ea omnia, humida ualentior est: arida uerò glutinandis uulneribus aptior.

Pisselæon.

Pisselæon.

EX humida pice efficitur, genere quidem ei simile, sed essentia tenuioris.

Pistacium.

Pistacium.

FRuctus eius quodammodo tenuioris essentia est,

subamarum quid, & odoratum retinens. Obstructio-
nes itaq; oīum uiscerum aperit, sed precipuè iecinoris.

Pityides, Picearum fructus.

A Stringit, simulq; acris ē, cū amaritudine quadā. Pityides.
Vnde thoracis pulmonisq; expuitiōibus cōfert. Picearum fru-
ctus.

Pityis, Picea.

PIceæ cortex uincens facultatem astrictoriā for- Pityis.
titur, sic ut intertrigines sanat, uentremq; potus si- Picea.
stat. Sed & ambusta cicatrice icludit. Tedæ cortex illi Tedæ cortex.
ad similis est, uiribus tamen moderatioribus. Vtriusq;
arboris folia, glutinant ulcera. In coni folijs & cortice
ualidior facultas est, adēd ut cum molestia mordicet.
Fuligo quæ ex dictis colligitur, ad pilos superciliorum
est commoda, itemq; ad angulos oculorum erosos, lip-
pientes, & lachrymantes.

Pityusa.

Viribus est similis tithymallo, succumq; sortitur Pityusa.
similem, & similiter purgat.

Platanus.

Humidioris frigidiorisq; est essentia, non ita mul Platanus.
to q̃ symmetra Proinde folia uiridia trita & illi-
ta, non obscure nascentes phlegmonas adiuuāt. Cor-
tex & pilulæ magis desiccantem uim obtinent: ut ille
quidem in aceto coctus ad dentiū adhibeatur dolores;
pilulæ uerò cum adipe, ad ulcera ambusta. Vitandus
est puluis folijs arboris insidens. Alioqui si attrahatur
spiritu, arteriā offendit, ualenter siccans, exasperansq;.
Nec non uocem lædit, sicuti & auditum & uisum, si in
oculos aut aures inciderit.

Polygonon, Centinodia.

VTi astrictiōis est particeps, ita in eo frigidum Polygonon.
aqueum uincit: ut secundo excessu refrigeret, aut Centinodia.
etiam initio terij Itaq; æstuanti uentriculo, erysipela-
ti, atq; calidis phlegmonis, si illinatur frigidum, auxi-
liatur. Sistit præterea uniuerfas fluxiones; qua ratione

uidetur exiccatorium. Quare ad herpetas, ulceraq; bonum remedium est. Quin etiam cruenta uulnera glutinat, auriumq; puri & ulceribus confert. Stillicidio & stranguria affectis exhibitum, urinam mouet, ut Dioscorides ait. Fœminæ ad omnia mas præstat.

Polygalon.

Polygalon.

EIus folia modicè astringunt, uidenturq; si bibantur, lac generare. Itaq; superauerit in eo calidum humidumq;.

Polygonatum.

Polygonatū.

A Strictionis pariter & acrimoniæ habet quippiā, cum fastidiosa quadam amaritudine. Quare non usq; adeò est uescū. Sunt qui radicē eius illinant uulneribus. Alij eo næuos in facie detergunt.

Polemonium.

Polemonium.

TEnuium partium est, & desiccandi uim obtinet. Vnde quidam radicem eius cum uino ad ischiadas, dysenteriam, lienemq; induratū propinant.

Polium.

Polium.

A Marum est ac modicè acre. Obstructione itaq; omnia uiscera liberat, urinamq; & menses promouet. At uiride magna etiam uulnera glutinat, & maximè species eius fruticosa. Aridum sanat rebellia ulcera: præcipuè quod minus est.

Polium minus.

Polium minus.

ACrius & amarius est hoc q̃p̃ maius, adeò ut ex tertio sit ordine desiccantium; ex secundo autem completo calfacientium.

Polycnemon.

Polycnemon.

DEsiccatur & calfacit secūdo excessu; itaq; & ipsum uulnera glutinat.

Potamogeiton.

Potamogeitō.

AStringit & refrigerat similiter polygono; sed essentia eius crassior q̃p̃ polygoni est.

Polypodium.

Dulce m

D Vlcem simul & aufteram uincentem obtinet Polypodium. qualitatem: ut facultatis fit citra morfum admodum exiccantis.

Praſium, Marrubium.

Praſium amarum quum fit, iecur ac lienem liberat obſtructione, thoracem & pulmonē expurgat, ac mēſes pmouet. Sed illitū etiam detergit et digerit. Calfacit itaq; ſecundo exceſſu completo; ſiccatur autem tertio inēite, aut completo. Succo eius ad aciei oculorū claritatem utuntur cū melle: per naresq; auriginē purgat, ipſumq; ad inueteratos aurium dolores adhibent.

Praſium,
Marrubium.

Propolis.

M Odicē quidem extergit, cæterū ualidē trahit. Eſt enim eſſentia tenui. Excalfacit porrò ordine ſecundo completo, aut certē incipiente tertio.

Propolis.

Ptarmice.

F Lores eius ciendæ ſternutationis uim obtinēt. Sugillata et cæteras ecchymoliſis digerit. Viridis porrò calfacit ſecundo ordine: tertio autem ſiccatur.

Ptarmice.

Ptelea, Ulmus.

V Lmi folijs quandoq; recens uulnus conglutinauimus: confidentes aſtringentem ſimul & abſtergentem ineſſe eis facultatem. Cæterū cortex magis amarus eſt, aſtrictoriusq; magis. Itaq; cū aceto & lepras ſanat. Quòd ſi uiridis circūligetur uulneribus, ea glutinare poteſt. Radices etiam eandem uim obtinent. Quarum decocto ſunt qui perfundant fracturas, quæ callo obduci deſyderant.

Ptelea.
Ulmus.

Pteris, Filix.

R Adix eius latum lumbricum perimit, ſi in melicrato pōdere drachmarum quatuor bibat. Quare ipſam partem uiuum necare, mortuū autem expellere, nō eſt mirum. Siquidem amara exiſtit, paulumq; aſtrictionis obtinet. Vnde ualidē ulcera deſiccatur: citra morſum tamen. Similē ei uim habet Thelypteris.

Pteris.
Filix.

Pynocomum.

Pynocomū.

Radix, fructus, & folia eius, digerendi attrahēdiq; obtinent facultatem: acria nimirum quum sint. Folia itaq; phymata furunculosq; discutiunt. Fructus ualentior est. Nam & palos, & tela infixa, ad extimam cutem elicit. Radix ad supradicta est infirmior, cæterū flauam bilem expurgat.

Pyrethrum.

Pyrethrum.

Radix eius causticam possidet facultatem, qua dentes refrigeratos mitigat. Porro ad rigores ante periodum cum oleo confricatur: stupidosq; & resolutos adiuuat.

Pyros, Triticum.

Pyros.
Triticum.

Foris impositum, primi est ordinis calfacientium: *cæterum nec siccare, nec humectare manifestò potest. Habet uerò etiam quiddam lentoris, obstruentisq; naturæ. Quod ex eo amyllum conficitur, ipso est tum frigidius, tū siccus. Quod ex pane fit cataplasma, magis digerit, q̃ quod ex tritico: salis & fermenti ratione. Fermentum quippe uim attrahendi habet, digerendiq; quæ in alto residet.

Rhamnus.

Rhamnus.

Desiccat & digerit excessu secundo. Refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente. Proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida.

Raphanis, Radicula.

Raphanis.
Radicula.

Excalfacit excessu tertio: desiccat uerò secundo. Agrestis in utroq; efficacior est. Semen etiam efficacius est planta. Ei enim inest digerendi facultas.

Rheum, Rha.

Rheum.
Rha.

Quidam habet terrestre frigidum, ceu indicio est astrictio: adiuncta est illi tamē quædam caliditas. Siquidem si mandatur plusculum, subacre conspicitur. Est etiam aeris cuiusdam substantiæ subtilis particeps: quod indicat laxitas, leuitasq;. Quare con-

uulſis, ruptis, orthopnœæq; prodeſt. Sic quoq; liuen-
ria & lichenæ cum aceto illitum perſanat. Aſtriçtio-
nis ratione, ſanguinem expuentibus, cœliacis, & dy-
ſentericis confert.

Rhetinæ, Reſinæ.

Reſinæ omnes deſiccant & excalfaciunt. Lentifci-
næ tamen (quam uocant maſtiche) primæ de-
bentur partes. Nam præter q̃ q̃ paucula ei ineſt aſtri-
çtio, qua ſtomachi, uentrisq; & iecoris imbecillitati-
bus, phlegmonisq; etiam accōmodatur, deſiccet inſu-
per citra mordacitatē. Minimum enim acris eſt, & ma-
ximè tenuium partium. Inter ceteras præfertur terebin-
thina, manifeſtam quidem, non tamē ſimiliter atq; ma-
ſtiche aſtriçtionem poſſidens. Verūm adiunctam ha-
bet quandam amaritudinem, per quam magis q̃ ma-
ſtiche digerit. Per eandem etiam uſq; ad eò abſtergit,
ut pſoras ſanet. Quin etiam quæ in profundo reſident,
magis ceteris extrahit, ob maiorem tenuitatem partiū.
Attamē pinea, & hac etiam magis ſtrobilina, acriores
ea ſunt, ſed non magis tamen digerunt, attrahunt ue.
Media inter has ſunt picea & abietina. Habet porrò
& emolliens quiddam terebinthina. Secūdum locum
habet in emolliendo lentifcina, ſicuti cypariſſina in
ipſa acrimonia.

Rhetinæ.

Reſinæ.

Maſtiche.

Terebinthina.

Rhodos, Roſa.

Ex aquea ſubſtantia calida, duabus alijs qualitati-
bus miſta, aſtringenti uidelicet & amaræ, compo-
ſita eſt. Flos tamen, magis q̃ ipſa roſa, eſt aſtringens:
ac proinde etiam exiccatorius eſt.

Rhodos.

Roſa.

Rhodia Rhiza, Radix Rhodia.

Tenuium partium & digerentis eſt facultas. In
calfaciendo uerò ſecundi ordinis eſt cēſenda: aut
certè tertij incipientis.

Radix rhodia.

Rhododaphne.

Tota ſua eſſentia uenenū eſt & homini & plerisq;

Rhododa-
phne.

pecoribus. Porro calfacit excessu tertio: primo autem desiccet.

Rhoea, Malum granatum, siue punicum.

Rhoea.

Malum grana-
tum, pun. cāue.

OMne malum granatum astringentem qualitatem sortitur: nō tamen in omnibus ea exuperat. Nam inter ea quædam sunt acida: quædam plus dulcia q̃; auſtera. Pro ratione quarum qualitatum uincetium, suos usus præstant. Porro acini astringentiores, & exiccantiores sunt succo. Sicuti & his putamina: quæ ſidia dicuntur. Ad ſimilem illis uim habent flores qui cytini dicuntur.

Rhus.

Sumach.

Rhus, Sumach.

AD desiccandum & astringendū coriarij hac plāta fruticosa utuntur. Medicis in usu sunt fructus eius & succus, auſteræ admodū q̃litis. Exiccatur itaq; in tertio ordine: refrigeratur uerò in secundo.

Rhypos.

Sordes.

Rhypos, Sordes.

* **S**ordes quæ à gymnasioꝝ statuīs æreis abraditur, digerendi emolliendiq; uim obtinet: quæ autem ab ijs qui in palestra exercentur, quantum accepit pulueris, tantum ab ea est diuerſa: atq; hanc sordem πᾶτον Græci nominant. Prior igitur, quæ ob contractā æruginem, acrior etiam exiſtit, cruda phymata digerit. Secunda autem, optimum est phlegmones mamillarum remedium. Conſtat enim ex puluere reperiētēte, oleo emolliente, ac deniq; sudore & sordibus digerētibus.

Sagapenum.

Sagapenum.

Liquor est calidus et tenuium partium, ſicuti & aliq̃ liquores. Sed abſterſionem quādam obtinet, quæ oculorum cicatrices expurgat, extenuatq;. Suffuſionibus etiam & hebetudinibus oculorum, quæ à craſſitie humorum proueniunt, non malum est medicamen. At planta ex qua prouenit, ſerculæ aſſimilis, imbecilla est & inutilis.

Sampſychon, Maiorana.

T Enuium partium & digerentis est facultatis. De Sampsycum.
 siccat enim & calfacit ordine tertio. Maiorana.

C Saprotēs ξύλων, Caries lignorum.
 * **C** Aries eorum præcipuè lignorum quæ partici- Caries ligno-
 pia sunt astrictionis & absterfionis, ut ulmus, expur- rum.
 gat, impletq; ulcera humida.

Sarcocolla.

M Istam uim habet ex emplastica quadam substan Sarcocolla.
 tia, & paucula amara. Itaq; citra morsum desic-
 cat, ac proinde glutinare ulcera ualet.

Satyrion, Triphyllon.

H Vmidum calidumq; est temperie, ob idq; dulce. Satyrion.
 Recrementitiam tamen & flatuosam humiditatē Triphyllon.
 possidet. Quocirca ad uenerem incitat.

Selinon, Apium.

A Deò calidum est, ut & urinam & menses cieat. Selinon.
 Flatus quoq; digerit, & magis semen q̃ herba. Apium.
 Oreoselini & hipposelini similis uis existit. Verū hip-
 poselinum imbecillius est; oreoselinum ualentius.

Seris, Cichorion.

H Olus est subamarum, & magis quod agreste est. Seris.
 Id nāq; est frigida & sicca temperaturæ, secun- Cichorion.
 do excessu. Cæterum domestica magis q̃ agrestis re-
 frigerat. Porro utraq; astringentis qualitatis est parti-
 ceps, ut chondrilla, quæ est etiam sereos species.

Seriphum.

A Bsynthio est tum specie, tum gustu simile. Cæte Seriphum.
 rum non æquè astringit. Sed calfacit ualentius,
 necnon amaritudinem quandam saluginosam refert,
 uentriculoq; est infestum; magisq; absynthio lumbri-
 cos enecat. Calfacit itaq; secundo ordine intenso. Sic-
 cat autem in tertio.

Seseli.

A Deò excalfacit tum radix, tū fructus, ut moueat Seseli.
 urinas. Est etiam tenuium partiū, ut & comitia-

libus morbis, & orthopnceis competat.

Sesamon.

Sesamon.

Viscofum & pingue quum fit, emplasticum etiam existit, emolliensq; ac modicè calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsius herbae decoctum, eiusdem sunt facultatis.

Sesamoides magnum.

Sesamoides
magnum.

Semen eius ut helleborus purgat, similiterq; abstergit, calfacit, & desiccatur.

Sesamoides album.

Sesamoides
paruum.

Huius semen nonnullam * acrimoniam sortitur, uehementerq; est amarum. Excalfacit itaq; rumpit, extergitq;.

Sideritis.

Sideritis.

Non nihil abstergit, sed plurima pars eius est humida & mediocriter frigida, cū exigua astrictione, qua phlegmonem sedat & glutinat. Sideritis autē Achillea, dictā superās astrictione, sanguinis eruptioni, dysenteriae, & muliebri profluuiio est aptissima.

Sicyos, Cucumis.

Sicyos.
Cucumis.

Maturus tenuioris essentiae est; immaturus crassior. Sed incidendi & abstergendi facultas eis inest. Quare & urinam mouet, & corpus splendidū reddunt. Sunt enim humidi frigidiq; quasi in secundo ordine. At arefacta tum radix tum semē, siccant primo, aut secundo incipiente, ordine, magisq; abstergunt, q̃ ipsius melonis caro.

Sicyos agrios, Cucumis agrestis.

Cucumis agrestis.
Elaterium.

Tum ipse, tum eius succus quem elaterium uocāt, aut ex folijs & radicibus pressus, utilis ad medicaciones existit. Elaterium itaq; menses ciet, foetumq; perimit applicatum, ceu alia omnia amara et tenuium partium. Summè siquidem est amarū, calfacitq; in secundo ordine, ac proinde etiā digerit. Sic enim eo angina laborantes inungunt quidam cum melle aut oleo

ueteri. Bonū item est regio morbo affectis infusum cū lacte in nares. Similiter dolores capitis sanat. Radicis atq; foliorum succus similem sed imbecillio rem facultatem sortit̃. Radix etiam abstergit, digerit, emollitq;. Cortex potentius desiccatur.

Silphium, Lasepitiū.

Silphij liquor calidissimus est. Necnō folia, caulis, & radix, strenuē etiam sunt calida, omnia tamē flatulentæ magis essentiæ sunt, ac proinde difficilia concoctu. Foris autē imposita corpori, efficaciora, liquor præcipuē admodum trahentem facultatem possidens. Attamen & excrescentias exterit, & quandam liquandi uim possidet.

Silphium.

Lasepitiū.

Sifion.

Calidus & subamarus existit: Vnde urinam mouet, concoquit, menses prouocat, omnesq; uiscerum obstructions referat.

Sifion.

Sion.

Quantum gustu * aromaticum est, tātum etiam excoficientis facultatis est particeps. Quare & digerit, & urinam mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

Sion.

Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho grata est, & urinā mouet, secundo ordine excoficiens, cum amaritudine & astrictione leuicula.

Sisaron.

Sisymbrium.

Tenuium est partium, facultatisq; digerentis, calfacientis, & exiccantis in tertio ordine. Quidam semen cum uino exhibent singultientibus, torminaq; patientibus.

Sisymbrium.

Sisymbrium, quod Cardaminem uocant.

Si siccum sit, tertij est ordinis calfacientium & exiccantium; si humidum, uirideq;, secundi.

Cardamine.

Scandix.

Scandix.

Agreſte eſt olus, ſubacre & amarū. Calfacit itaq; & ſiccāt ſecundo ordine intenſo; ualenter mouet urinam: uiſceraq; liberat obſtructionibus.

Scilla.

Scilla.

Admodum quidē incidit: calfacit autem ſecundo ordine. Porrò præſtat eam aſſam aut elixam ſumere; q; ſic eius uehementia exoluatur.

Scolymos.

Scolymos.

Radix eius, ſi quis illam in uino coctam bibat, graueolentem urinā abundanter elicit, foetoriq; alarum medet̃. Succus enim eius eſt purgatorius. Calfacit porrò ſecundo & completo ordine, aut tertio incipiente: ſiccāt uerò ſecundo.

Scordion.

Scordion.

Non nihil amarum obtinet, & acerbū, & acre: ipſiusq; acrimonia, aliq̃ acrimoniæ eſt perſimilis. Expurgat igitur, excalfacitq; uiſcera: mēſes urinamq; prouocat: Conuulſa, rupta, doloresq; laterū ab obſtructione & frigore obortos, epotū ſanat: illitum uiride, magna uulnera glutinat: purgat ſordida: inſperſumq; aridum contumacia ad cicatricem perducit.

Scorodon, Allium.

Scorodon.

Allium.

Deſiccāt & excalfacit exceſſu q̃rto. Porrò ophiſcorodō, allium agreſte eſt, domeſtico ualētius.

Scorodopraſſon.

Scorodopraſſon.

Vt guſtu & odore, ſic uiribus inter allium & porum mediam naturam ſortitur.

Scorpiodes.

Scorpiodes.

Excalfacit ordine tertio. Deſiccāt ſecundo.

Smilax, Cactus arbor.

Smilax.

Facultatis eſt uenenosæ.

Smyrna, Myrrha.

Smyrna.

Myrrha.

Secundi eſt ordinis calfacientium & exiccantium. Vnde capitis uulnera glutinat. In eſt illi amaritas non exigua, qua foetum & lumbricos enecat, eijcitq;.

Habet etiam & abstergerendi uim moderatam. Quare ocularibus miscet medicamentis; & ijs quæ ad ueterē tusim, atq; anhelationem administrantur.

V Smyrna Boice, Myrrha Beotia.
Im habet calfaciendi, fundendi, emolliendi.
Smyrnium.

Myrrha Beotia.

EX eodem genere cum apio est & petroselino: fueritq; apio quidem ualidius, imbecillius uerò petroselino. Itaq; & urinas & menses proritat, calidum siccumq; tertio ordine.

Smyrnium.

Sonchus.

DUm uiridis est, aquea terreaq; essentia constat, Sonchus.
Utraq; leuiter frigida: nam & astrictionis cuiusdam est particeps, & manifestè refrigerat, tum illitus, tum estus. At arefactus, terrestrior reddit, modicam asciscens caliditatem.

D Esiccantis est facultatis.
Sparganium.

Sparganium.

Spartum, Genista.

SParti (quo & uites alligant) tum fructus, tum succus uirgarum, ualentem trahendi uim possidet.

Spartum.
Genista.

Staphilinus, Pastinaca.

SAtiua imbecillior, agrestis ad omnia potētior est. Urinas mensesq; puocat, abstergitq; nonnihil, quū herba quidem tota, tum uel maximè semen & radix.

Staphilinus.
Pastinaca.

Stachys.

GVisu est acri & amaro, tertijq; calfacientium ordinis. Vnde menses rationabiliter prouocat. Facit tamen abortum, atq; secundas eiicit.

Stachys.

Stoebe.

Fructus eius & folia astringunt citra mordacitatē: desiccantq; in tertio ferè incipiente ordine. Quare decoctum eorum inijcitur dysentericis, auribusq; pure fluentibus; quod etiam magna uulnera glutinat, præcipuè cum uino atro & austero. Valenter enim desic-

Stoebe.

cat omnes præter naturam humiditates. Folia uiridia illita erumpentem sanguinem supprimunt, suffusionibusq; oculorum ex ictu medentur.

Stœchas.

Stœchas.

Ammara est & mediocriter subastringens, quum nimirum ex terrena essentia frigida exigua; & extenuata altera terrena copiosa, pset. Quare obstructio ne liberat, extenuat, extergit, roboratq; & uiscera & uniuersum corpus.

Stratiotes.

Stratiotes.

Aquaticus quidem humida & frigida facultate est: terrestris uerò, nonnihil habet astrictionis. Proinde & ulcera glutinat.

Struthion.

Struthion.

Radix eius est acris, calida, siccaq; temperameto, ex quarto pmodum ordine excalfaciētium. Sed & abstergit, & irritat, pinde & sternutationē puocat.

Syrax,

Syrax.

Excalfacit, emollit, concoquit. Quamobrem tusi, catarrho, pituitæ destillationibus, raucedinibusq; auxiliatur. Tum menses, seu potum, seu admotum pliait. Combusti eius fuligo, thuris fuligini est similis.

Syca, Ficus.

Syca.
Ficus.

Aridæ excalfaciunt ordine primo, aut secundo incipiente: habentq; partium tenuitatem quandam: quare tubercula dura concoquunt, digeruntq;, tum ipsæ, tum ipsarum decoctum. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi uerò plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio. Porro quæ sunt pinguiore, magis possunt concoquere: quæ acriore, magis tum extergere, tum digere re. Ficus uirides, imbecilliores sunt. Vtræq; tamen & ficcæ & humidæ aluum subducunt.

Syce.
Ficus arbor.

Syce, Ficus arbor.

Calidæ, tenuiumq; partium tēperaturæ est, sicuti

Indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim calfacit uterq;. Itaq; non mordicat tantū, aut uehementer absterget, sed & ulcerat, & ora uasorū re-ferat, & uerrucas extirpat. Quin & uim purgatoriā habet. Porro lachryma & succus agrestis ficus, quam caprificum uocant, ad omnia, q̃ satiuæ, ualentior est. Ceterū ipsarum surculi adeò calidi sunt, atq; tenuium partiū, ut carnes bubulas duras, si coquendis adijciantur, friabiles ac teneras reddant.

Caprificus.

Symphytum petræum.

Habet quandam uim incidendi, qua collectum in thorace pulmoneq; pus expurgare potest: ac si- mul cōtrahendi facultatis est particeps, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: estq; humidū, ac non imodice calidum, unde & dulce apparet, atq; odoratu iucundum. Ad hæc, mansum sitim extinguit, & arterię sanat asperitates. Liquet igitur ipsum etiā & digerere, & constringere posse. Vnde & enterocœlijs imponitur, et ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur.

Symphytum petræum.

Symphyton magnum.

Similem dicto uim habet. Cæterū neq; uidet̃ dulce, neq; odoratum. Est uerò secundum uiscositatē mordacitatemq; scillæ simile

Symphyton magnum.

Spondylon.

Fluctus eius acris & incidens est: itaq; ad asthma & comitiale morbum aptum est medicamen. Prodest & aurigini. At radix ultra iam dicta, fistularū callos tollit, si sit circūrasa. Floris succus, ad diuturniora aurium ulcera conueniens reponitur.

Spondylon.

Schinos, Lentiscus.

Ex aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca, constat. Desiccatur itaq; secundo ordine completo, aut tertio incipiēte: in caloris frigorisq; medio consistens, quodāmodo. Astringit autem ex æquo, moderateq; omnibus partibus suis. Succus bibitur &

Schinos.

per se, & cum alijs medicamentis, quæ dysenterias & alui affectus sanāt. Quin & ad sanguinis expuitiones, flores miliebres, necnō sedis uuluaq; ꝑcidentias idoneus est, utpote ad hypocistida nōnihil accedēs ꝑpe.

Schinu-anthos, Schini flos.

Schini flos.

MOdicè calfacit, modicèq; etiam astringit, nec plānē à tenuitatis natura est alienus. Quare urinam & menses mouet, siue potione, siue fomēto adhibitus. Prodest etiam iecoris, stomachi, & uentris inflammationibus. Cæterū magis astringit radix: quanq̃, flos etiam astringat omnibus partibus suis. Proinde medicamentis quæ hæmoptoicis exhibentur, miscetur.

Schœnos leia, Tuncus læuis.

Schœnos leia.
Tuncus læuis.

QVidam oxyshœnos, alius oligoschœnus dicitur: gracilior duriorq; oxyshœnos, crassior laxiorq; oligoschœnos. Fructus huius somnū conciliat. Oxyshœni autē duæ sunt species: altera sterilis, cuius nullus usus in medicina: altera quæ fert semen somni cōciliatiuū, sed minus q̃ oligoschœni. Vtrūq; si cum uino bibatur, uentris fluxus desiccet, & muliebre profluuium rubrum sistit. Est itaq; eorum temperies composita ex terrena essentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida.

Terminthos, Terebinthus.

Terminthos.
Terebinthus.

Cortex, folia, & fructus eius astringunt, & secūdo ordine excalfaciunt: unde etiam q̃ siccant, liquet. Porro fructus aridus propinquus est tertio ordini desiccantium: calfacitq; ualenter. Quare & urinam prouocat, & lienibus auxiliatur.

Teutlon.
Beta.

Teutlon, Beta.

Nitrosæ facultatis est particeps, quātum digerit, tum extergit, & per nares expurgat. Cæterū cocta nitrositatem exuit, euaditq; leniter digerens. Ad detergēdum tamen, digerendumq; ualidior est beta alba.

Teucrium.

Incidit et tenuium est partiū: quare lienes sanat. Ac Theucrium.
 exiccat quidē in tertio, calfacit autē secūdo ordine.
 Thephra, Cinis.

EX partibus cum terrenis, tum etiā fuliginosis (que Tephra.
 & tenues sunt, & cum aqua in qua macerati prius Cinis.
 fuerint cineres, excolantur) constat. Pro materiæ tamē
 combustæ differentia, cineris temperies uariat. Quare
 haud scio qua ratione Dioscorides astringere cineres
 omnes prodiderit: quum ficulneus cinis eiusmodi om
 nis qualitatis sit expers: nimirum ipsa arbore nulla par
 te sui acerbam qualitātē reddente. At ex acerbis lignis
 confectus cinis, non parum quidē astringit: meminiq;
 me eo aliquando sanguinis suppressisse eruptionē. Ve
 rū nullus unq̃ ad tale uti ficulneo audeat. Siquidem
 hic acrimonię plurimum, urentisq; facultatis obtinet,
 mistæ absterfionis. Est & calx cineris quedam species, Catx.
 cæterū tenuioris essentia, q̃ qui ex lignis fit. Porro
 elota, medicamen est citra morsum desiccās, magisq;
 si bis ter ue lauetur. Cæterū si marina aqua abluta
 sit, admodum digerit.

Telephium.

Exiccandi & detergendi facultate est, non tamen Telephium.
 insigniter calida, sed forsan secundi ordinis. Desic
 cat etiam secundo, intenso tamen, aut tertij principio.
 Proinde ad putrida ulcera congruit, & cum aceto u
 tranq; uiriliginem sanat.

Telis, Fœnum Græcum.

Calfacit secundo ordine, desiccatur primo. Proinde Telis.
 feruentes phlegmonas irritat: quæ uerò minus Fœnū Græcū.
 sunt calide, & magis duræ, eas digerendo persanat.

Tithymalli.

Tithymalli omnes uincentem habent acrem, cali
 damq; potentiam, cum amaritudine quadam. Va
 lidissimus eorum est liquor: Dein fructus & folia. Po
 stremò radix. Hęc aceto incocta, sanat erosorum den

trium dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Cæterū si aliam partem contingat, cōtinuò adurit ulceratq; illam, ex quarto existens calfacientiū ordine, qui ad exurētia pertinet. Sic pilos quoq; & uerrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo intectus succus euellit: detergitq; lichenas & psoras, propter amaritudinem: necnon ulcerum phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia ualēter calfacit & desiccāt, aliquādo iuuare poterit. Ad hæc, fistularū callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus p̄stare possunt, sed ibecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiēdos, uti assolēt. Celerrimè enī ab illis in uertiginē acti, ac semimortui redditī, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint rithymallorum genera, ualētissimus est quem characiam maremq; nominant: & foemina nūcupata myrsinites: & qui in petris nascitur arborescens. Deinceps qui phlomo assimilis est: & cyparissias. Dein marinus: ac deniq; helioscopius. Proportione autem facultatis ipsorum, & cinis & lixiuium existet.

Tragacantha.

Tragacantha.

EMplasticam facultatem similem gummi obtinet, necnon obtusiores acredinem. Ac sanè similiter illi desiccāt.

Tragion.

Tragion.

TRagion folia, fructus, lachrymaq; trahentis digerētisq; sunt facultatis. Est uerò & tenuium partiū, & facultate in principio tertij ordinis calida. Stipites, & infixa corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet, drachmę pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisco simile. Alterū minus, cuius folia scolopēdrio similia sunt, uisitur quidem multis in locis, sed non parum habet facultatis astringentis: ut & ad fluxionum affectus conueniat.

Tragoriganon.

DE hoc in sermone de origano diximus.

Tragoniganū

Tribolos,

Tribolus.

EX humida essentia modicè frigida, & sicca nō mediocriter, cæterum similiter frigida, cōstat. Vnde contra phlegmonarum generationes, & contra omnes influxus congruit. Porro terrestris ipsius fructus, quū tenuium sit partium, potus renum calculos conterit.

Tripolation.

Tripolation.

RAdix huius est acris, & facultate calida in tertio excessu.

Triphyllum.

Triphyllum.

Calfacit & siccatur in tertio ordine, ut bitumen, cui odore est simile. Proinde potū laterū dolores ab obstructione natos iuuat; & urinam mensesq; puocat.

Trichomanes.

Trichomanes.

EAdem præstat quæ adiantum.

Trychnon, Solanum, Strychnon

ESculentum quidem astringit, refrigeratq; in secundo ordine. At eorum quæ esui non sunt, unum quidem dicitur Alicacabum, fructum habens rubeū, acino uuæ persimilem. Alterum uerò est fruticosum, à cōciliando somno Hypnoticum appellatum. At tertium quæ ad insaniam adigat, omnes manicū nominant. Alicacabum igitur, fructum fert ciendæ urinæ idoneum, compluribusq; facultatibus quæ ad iecur, uesicam, & renes accommodantur, miscetur. Solani uerò hypnotici cortex radicis, si cum uino bibatur, somnum accersit, drachmæ pondere sumptus, existens succo papaueris similis, nisi quæ imbecillior: utpote tertij refrigerantium ordinis: quū ille sit quarti. Huius solani semen urinam ciendi uim habet. Si plus tamen duodecim corymbis hauseris, demētiā asciscet. Quod reliquū est ex solanis propositis, est ad medicationes intra corpus, inutile. Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mortem inferet: si pauciores, insaniam. Vna certè innoxie sumi-

Trychnon.

Solanum.

Strychnon.

Alicacabum.

Solanū Hypnoticum.

Solanum manicum.

tur: nihil tamen utile præstat. At foris corpori illitum, ulcera maligna persanat. Verùm ad talia, radicis cortex præfertur, desiccās secundo ordine iam completo; aut tertio incipiente: secūdo autē incipiente refrigerās.

Hyacinthus.

Hyacinthus.

R Adix eius bulbosa est, desiccās primo ordine: secundo autem, aut initio tertij refrigerās. Fructus leuiter extergit, astringitq; unde & regio morbo laborantibus exhibetur in uino, ordine quidem tertio desiccans, at in medio caloris frigorisq; consistens.

Hydnon, Tuber terræ.

Hydnon.

Tuber terræ.

S Vbstantiam habet uincētem terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permistam.

Hydropeperi.

Hydropeperi.

N On usque adeò calidum est, ut piper. Viridis ipsa herba cataplasmatris instar imposita, sugillata & tumores induratos digerit.

Hyoscyamus, Altercum.

Hyoscyamus.
Altercum.

C Vi semen atrum est, insaniam ac soporē inducit: cui uerò mediocriter flauum, propinquam ei obtinet facultatem. Vtriq; tamen fugiendi sunt, ut deleterij & inutiles. At cui semē & flos est candidus, sanitati idoneus existit, ex tertio quodāmodo refrigeratiū ordine.

Hypericum.

Hypericum.

C Alfacit & siccatur, essentia tenui, adeò ut mēses urinasq; puocet. Illitum uiride, ad cicatricē omnia perducit ulcera. Siccum contusumq; si inspergas, mollia, humida, & putrilaginosa sanabis. Sunt qui & ischiadicis bibendum propinent.

Hypecon.

Hypecon.

R Efrigerat tertio ordine, parūq; à papauē distat.

Hypoglosson.

Hypoglosson.

R Adix eius & succus, emolliendi uim possident.

Hyssopum.

Hyssopum.

D Esiccatur & excalfacit ordine tertio, sed tenuium est partium.

est partium.

Phaci, Lentesc.

Valenter astringunt, mediumq; tenent inter calorem & frigiditatem. Desiccant tamen in secundo ordine. Ipsum itaq; earum corpus siccant & sistit alium. Ceterum decoctum puocat. Proinde prior aqua abijci-
tur, ubi retentionis causa exhibentur.

Phacos, Lenticula palustris.

Humidæ frigidæq; temperaturæ existit, utrinq; ex secundo ordine.

Lenticula palustris.

Phaleris.

Succus, semen, & folia eius, commodè potari creduntur contra vesicæ dolores, ceu in se habeat tenue quiddam & calidum.

Phaleris.

Phalangites.

Sic dicitur, qd morsis à phalangijs auxilio sit. Est autem facultatis tenuium partium, & exiccatis, quare tormina lenit.

Phalangites.

Phlomis, Verbascum.

Huius herbæ duæ sunt species. Quædam enim folijs est candida: quædã uerò nigra. Rursus, albæ quidem mas est, cuius folia angustiora; scemina cuius maiora uisunt. Est & alia phlomis agrestis, flores habens aureos & luteos; necnò alia quam phlomida appellant. Priorum duarum radix acerba gustu est, et fluxionum affectibus prodest, atq; adeo dentium doloribus: q; q; folia digerendi uim habent. Similiter & aliarum folia. Omnium quippe folia desiccandi & detergendi uim possident.

Phlomis.

Verbascum.

Phlomis.

Phoenix, Palma.

Astrictorie facultatis est particeps oibus partibus suis. Igitur ramorum succus austerus est, ex aquea substantia tepida, & terrea frigida constans. Similis facultatis est eius cerebrum, esui aptum. At fructus, et maximè, dulcis, non paruam obtinet caliditate.

Phoenix.

Palma.

Qui quidem quum edendo sit, magno est usui, non tãtũ foris impositus, ubi roborare, desiccare, contrahere, stipareq; est consilium, sed tanquã cibus sumptus, & simul cum alijs, & per se. Porro tenerum palmę germen, eãdem cum eius cerebro facultatem sortitur. At cortex, astringit quidẽm, ac plus q̃ dicta omnia desiccatur: * utpote minimum habens humiditatis. Quare ad ulcera putrescentia, laxatos articulos, hepatis & uentriculi imbecillitates eo itus & foris administrato utuntur. Radix citra morsum desiccatur, cũ nõnulla astrictione.

Phormion.

Phormion.

P Hormij semine cum melle ad leucomata * utuntur. Sed spicula etiam extrahere creditur: ueluti & ipsa herba. Quare tenuium partium, & attrahendi digerendiq; potentiam obtinet.

Phu.

Phu.

O Dorata quodammodo eius est radix, nardo uiribus similis: ad pleraq; tamen infirmior. Mouet autem urinam, ut nardus Gallica.

Phycos, Alga.

Phycos.
Alga.

E X mari exēptus & uirens, siccatur refrigeratq; in secundo ordine: habet enim quiddã modicẽ acerbũ.

Phyllitis.

Phyllitis.

A Cerba quum sit, meritò & diarrhoeas & dysenterias epota iuuat.

Folium mala-
bathri.

Phyllon malabathru, Folium malabathri.

N Ardo similem possidet facultatem.

Chalbane, Galbanum.

Chalbane.
Galbanum.

S Vccus est plantæ ferulaceæ, molliendi & digerendi ui: Calfacit enim ordine tertio incipiente, aut cõpleto secundo. Siccatur uerò secundo incipiente.

Chamædris.

Chamædris.

V Incentem habet qualitatem amaram. Est & quodammodo acris. Quare meritò lienes colliquat: urinas & menses prouocat: crassitudinẽ humorũ inci-

dit, uiscerumq; obstructiones repurgat. Calfacit itaq;
& desiccatur tertio ordine: plus tamē calfacit q̄ siccatur.

Chamæcissos.

Flos eius admodum amarus quā sit, iecur obstru- Chamæcissos.
ctum aperit, daturq; & coxendice laborantibus.

Chamælea.

Vincens habet qualitatem amaram. Quare ad- Chamælea.
modum sordida ulcera, & quæ maximis induc-
tæ sunt crustis, purgare cum melle est potens.

Calfacit quodāmodo tertio ordine. Siccatur primo. Chamæleuce.

Chamæleon.

Nigri quidem radix, letale quiddam obtinet. Qua Chamæleon.
re foris usus eius ad ea quæ absterfionem postu-
lant, administratur. Præterea digerentibus & emolliē-
tibus pharmacis commiscetur. Etenim siccatur tertio or-
dine, calfacit autem secundo absoluto. At albi radix q̄
non sit perinde acris, potui datur cū uino austero, mē-
sura oxybaphi, laborantibus aqua inter cutem.

Chamæpitys.

Magis amara est quā acris. Quare abstergit, pur- Chamæpitys.
gatq; uiscera, magis quā calfacit. Proinde auri-
ginosis, & quibus facile iecur obstruitur, bonum reme-
dium est. Quin & urinam, & menses ducit tum pota,
tum illita cum melle. Viridis uulnera magna glutinat,
ulcera putrescētia sanat: durities uberum discutit. Est
enim in siccando tertij ordinis: in calfaciendo, secūdi.

Chamæsyce.

Abstergendi simul & acré uim possidet. Itaq; acro Chamæsyce.
chordonas & myrmecias caules eius teneriores
intriti, quiq; ex eis profluit liquor, auferūt. Cum melle
crassas oculorum cicatrices detergunt: hebetudinem
uisus à crasitie ortam, adiuuant: sicuti & suffusio-
num principia.

Chelidonium.

Chelidonium.

Admodū extergit & calfacit. Succus eius ad acū dum uisum est commodus. Quidam radicē eius ad auriginem ab obstructione iecoris ortā in uino albo cum aniso propinant. Mansa etiam confert dentium doloribus. Chelidoniū minus, quā maiori sit acrius, celeriter cutem exulcerat, unguesq; scabros enicit. Succus eius p̄ nares purgat. Hæc itaq; siccāt & calfacit in quarto incipiēte ordine. At chelidoniū maius in tertio.

Chondrila.

Chondrila.

Eiusdem ferē est facultatis cum seri: nisi q̄ amari- uſcula est, ac proinde siccantior.

Chondrus.

Chondrus.

Nutritum quidem est optimum, sicut triticū. Vt medicamen autem emplasticæ est facultatis, temperie tritico similis, nisi q̄ uiscosior existit, qua ratione plus illo nutrit. Est porro hoc semen uelut materia quædam idonea excipiendis medicamentis siccantibus. Ipsum uerò ex numero concoquentiū existit, ut triticum, quæ minimè profecto desiccant.

Chrysocome.

Chrysocome.

Radix uincentes habet acrem & astringentē qualitates. Quare nō admodū multi usus est. Quāq; cocta in melicrato peripneumonij & morbis hepaticis auxiliatur. Sed & mensuris purgandis est utilis.

Pseudodictamnium.

Pseudodictamnium.

Vim dictamni sed imbecillam sortitur.

Psyllium.

Psyllium.

Semen habet admodum utile ex secundo refrigeratium ordine. In desiccando uerò & humectando, quodammodo est symmetrum.

Ocimum.

Ocimum.

Ex secundo est ordine calfaciētium. Habet autem recrementitiam humiditatem: proinde nec commodum est, ut in corpus sumatur. At foris illitum, concoquit, digeritq;.

Ocimoides.

S Emen tenuium est partium, & citra morsum, facultatis desiccatoriæ. Ocimoides.]

GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM.

Facultatibus. Lib. IX.



QUOT plantarum sunt partes, fruct⁹, succi, & liquores, supra dicta sunt omnia. Nunc autem de reliquis medicamentis, quæ ex metallorū sunt genere, quæq; species ipsius terre existunt, differere ppositū est. Post quæ deinceps nonnihil tractabitur, de partibus animalium, quibus ceu medicamentis ad curationes utimur. Meminisse autē in uniuersum oportet, astringentibus medicamentis facultatē inesse cum acribus pugnātissimā. Astringentia siquidē contrahunt, constipantq;, & condensant substantiā nostram; ac proinde in quāuis corporis nostri partem extrinsecus imposita, continuo illam & rugosam, & contractā efficiunt: contrā q̄ acria, quæ admota cuti; perspicuū eam excalfaciunt, atq; in molem attollunt, rubente colore: ac si diutius immorentur, exulcerant. Hæc itaq; euidenter apparent incidere, excalfacere, a uicinisq; partibus ad sese sanguinē trahere. At astringentia, refrigerādo, contrahendo, cōstringendoq;, in illis etiam cōtentum repellere. Porro combustorum nonnulla calidiora q̄ antea redduntur, & ad gustum, & ad tactum, & ad eam quæ in usu cer nitur, facultatem Quædam contrā, ab unctione minus apparēt calida, id quod tactu & usu manifeste discer-

Astringentium facultas.

Acrium facultas.

Vulnorum differentia.

Combustorū
nullum est fri-
gidum.

nitur. Igitur acris multum caloris amittunt usta: quæ uerò non sunt eiusmodi, assument. Cæterum combustorum, nullum planè est frigidū. Relinquitur enim in illis ueluti acrimonia ignis, quæ per ablutiones extinguitur: ita ut aqua in qua medicamentum ablutum fuerit, calidam facultatem comparet, eamq; tenuium partium: quod reliquum uerò est, sit terreum simul & frigidum, ac deficcare citra molestiam possit.

De differentijs terræ.

Terræ differē-
tix.

Terra communiter ac secundum agricolas dicitur illa quæ agriculturæ est aptissima: quæq; humore macerata lutum efficitur. Atq; in ea sanè plures differentias constituunt: aliam exempli gratia pinguem esse dicentes, ex qua lutum fit uiscosum & lentum. Aliā contrario modo dispositam, hoc est quæ lutum efficiat friabile. Atq; hoc unum uocabulū terræ est omnibus usitatum. Alterum est solis Philosophis usurpatū, quā aiunt elementa corporum esse terram, aquam, aerem, & ignem. Corpus nāq; extremè siccum, & frigidum, terram nuncupant. Secundum quos nullum compositorum corporum terra censetur elementaris. Aiunt tamen quanto corpore fuerint durior, tātō magis ea esse terrea: contrā q̄ agricolæ, qui eam exactissimā esse terram contendunt, quæ q̄ longissimè à saxi consistētia recesit. Pro hoc itaq; secundo significato, quod à Philosophis celebrat, tribus claudunt generibus differentix ipsius terræ. Quorum unū genus est lapis: alterum corpus metallicum: tertium terra quæ colitur.

De differentijs nominatæ passim terræ.

Terræ passim
vocatæ differe-
ntiæ com-
plures.

Terra itaq; uel Latinis etiā dicitur usitatè, quæ iniecta aqua soluitur, & fit lutum. Quæ sanè quādam differentias sortitur: secundum propriam quidē rationem: ut uidelicet pinguis si sit & uiscosa, quæ utiq; omnino & atra colore est: aut contra, friabilis, & pinguitudinis expers, quam argillam appellant, quæ quo-

dammodo candidior existit: aut si inter has maximè cōtrarias habeatur. Secūdum misturam autem alienorū corporum, ut dum dicimus lapidosam aut arenosam hanc esse terram. Porro talis substantia admista, segregatur larga aque affusione, maceratione q; donec uniuersum perfluat. Sic enim qd lapidosum & arenosum est, subsidit, & terra exacta supernatat: in quem modū præparatur etiam & terra Lemnia, quam alij sphragida lemniam (ob impressum illi sigillum Dianæ sacrū) cognominant. Quæ quidem à Lemnia rubrica differt, q; contactu non contamineat, perinde ut illa: q; q; secūdum collem in Lemno qui totus colore est fuluus, et in quo nec arbor, nec saxum, nec plāta nascitur. tantū huiusmodi terra uisitur. Cæterū eius tres differentie assignantur. Vna quam Lemniam sphragidem diximus: quam q; alij nemini, præter q̃ uni sacerdotissæ, contingere fas est: altera uerò eius, quæ milto est, siue rubrica: ac deniq; tertia, quæ detergendi uim habet. Utuntur autē priore illa, ad uulnera uetera & cōtumacia, ad omnes q; ferarum morsus, sicuti aduersus medicamenta letalia. Distinguere itaq; ab ea terra quæ colitur, medicamentosam oportet, qua ad curationes utimur. Tāetsi eius quoq; quæ colitur, si qua pinguis est, utilis ad curationes existit earum omnium partiū, quæ desiccari postulant. Desiccandi nāq; uim terra quæuis possidet. Quum enim eius corpus natura sit siccū, omnino q; igneæ substātis expers, citra mordacitatē excicat. Ad quod quidem etiam ablutio iuuat.

De terræ lotionē.

A Clauatur sanè terra omnis, ut lemnia. Primò si quidem maceratur aqua, quæ nullā habet medicamentosæ qualitatis suspicionem. Dein effunditur qd innatat, colligitur q; id quod est à lapidosis & arenosis secretum. Gustus autem docet, quæ nam terra lotionē indigeat: aut quæ minimè. At Lemnia, quum sit à sa-

Terræ purgandi ratio.

Lemniam sphragidis.
Lemniam rubricam.

Lemniam tres differentias.

Terra quæuis desiccandi uim possidet.

Terram ablutiōis ratio.

certote abluta, rursus elui non exigit.

De terra Samia.

Samia terra.
Samius aster.

AT Samiam ne lauari quidem est opus. Vtuntur autem altera eius specie magis, quā Samiū aster cognomināt, ad sanguinis exuptiones, muliebriaq; profluvia, ueluti & Lemnio sigillo, necnō aduersus ulcera dysenterica, prius q̄ putrescentia euadant. Quāq; etiam & putrescentibus, quæ depascentia uocant, interdum Lemnia ipsa profuit: iniecta quidem per arnaglossæ succum; bibita uerò ex oxycrato aquoso: prius tamen ablutis ulceribus; idq; primò quidem, melicrato; dein autem, muria. Cæterū Lemnia terra q̄ Samia non parum efficacioribus esse uidetur uiribus. Quare ab ea, quæ phlegmone tentari cœperūt partes, exasperantur: quum tamen à Samia iuuētur. Ex qua & oleo rosaceo mitissimum conficitur pharmacum, etiam cōtra alias feruentes phlegmonas, incipiētesq; bubonas & fluxiones podagricas, & ad ea breuiter, quæ refrigerare cum mitigatione est animus. Vnde constat Samiā refrigerare. Quin & magis aerea eius essentia existit, collata ad lemniam: cuius argumento est leuitas. Aestimabis porrò omnem terram medicaminosam, tum leuitate, tum grauitate, præterea circa gustus asperitate & lenitate; ad hæc tenacitate & abstergendi potētia. Tenax enim & uiscosus est Samius aster, quum & Lemnia sphragis eiusmodi paululum quiddam habeat. Absterforiam quoq; facultatē moderatam obtinent & Selinusia terra, & Chia: quamobrem mulieres quædam ipsæ ad faciem utuntur. Porrò quicquid abstergit leuiter, producendæ ulcerum carni est idoneum. Quod si etiam siccet, cicatrici inducendæ est habile. At omnium aptissima sunt & ad ulcera quæ in summa cutē cōsistūt, & ad ambusta, illa quæ citra morsum excicant, nec manifestò excalfaciunt, nec refrigerant. Quocirca terra Selinusia et Chia, pulcherrima sunt ad am-

Selinusia terra
Chia terra.
Abstergentia
leuiter, produ-
cendæ esse car-
ni idonea.

busta ulcerum remedia. Iam uero Cimolia terra, quā
 mistæ sit facultatis, partim sanè refrigerat, partim leui
 ter d'gerit, operaturq; pro natura illorū quibus misce
 tur. Verū unicè ambustis conuenit: ueluti & alię om
 nes, illitæ ex aceto, aut oxyerato: nimirum bullas existe
 re prohibentes. Aduertendum tamen est, corpora mol
 lia, ualentem medicaminum uim haud posse perferre:
 dura uerò posse. Terra itaq; mistionis expers, uim ha
 bet citrà morsum siccandi. Quum autem nullum repe
 rire sit corpus à mistione alienū, inspiciendū est, qua
 lem nam miscellam ipsa terra sortiatur. Si qua ergo in
 ea astrictio sentiatur, tantū frigiditatis assumpsit, quan
 tum habet astrictionis. Sin acrimonia, tātum scito illi
 inesse caliditatis, quantū & acrimoniæ. Similiter, quā
 to leuior terra ipsa fuerit, tanto acrior existit. Quanto
 grauior, tanto etiam syncerior terra. At proprium ter
 ræ est, qđ igni admota non soluitur, aut liquefcit: id qđ
 accidit plumbo, stanno, auro, & argēto. Quum igitur
 audis nominare terram argenteam, aut auream, mini
 mē intelligas ipsum argentum, aut aurum, per totū ter
 ræ corpus misceri: sed particulas quasdam exiguas tū
 auri, tum argenti, illi coniunctas, atq; contiguas existe
 re: easq; ab igne in fornacibus fusas coire inuicē. Eun
 dem in modum quæ uitrum cōtinet terra, arehosa est.
 Sed & auri quoq; glebulę exigue frequenter nō paruo
 numero in quibusdam reperiuntur arenis. Terrarum
 autē id genus omnium quæ in metallis sunt, ubi ab eis
 separatur id metalli aut eris quod cōtinent, reliquiæ ui
 dentur lapideæ, nec macerari, rigari ue, aut humectari
 per totam substantiam possunt: ut medicaminosa illa,
 quæ cum aqua in lutum degenerat: quæq; uiti circūli
 ta nascentes in ea uermes interimit, unde ampelites uo
 catur. Cadmia etenim ex illarum lapidearum est gene
 re: neq; rigari potest. Terra Cretica admodum imbe
 cilla est, multum habens, substantiæ aeris. Inest tamē

Cimolia terra.

Ambustis quæ
conferant.Corpus nullū
dari a mistio
ne alienum.Terra igni ad
mota non sol
uitur.Vitrum conti
nens terra.Aurum reperi
ti in arenis.Ampelites ter
ra.

Cadmia.

Cretica terra.

Eretriensis ter-
ra.

ei quædam citra morsum eius extergendi. Eretriensis, q̃ Lemnia, ualentiorē possidet astrictionem: hæc tamen ut nondū mordicet. Expedit uerò hanc terram bis terq; lauare, ut Cimoliā, quo moderatior redatur. Eam etiam urunt, ut subtiliorē, acriorem, & magis digerentem efficiant. Quod si postea q̃ combusta fuerit, abluatur, replendis & cicatrice inducendis ulceribus multò magis opitulatur. Cæterum quæ colore cinericio est, illi quæ alba existit, præferē. Est & alia

Pignites.

Boli Armeni
descriptio.

terra dicta Pignites, tota quidē facultate terræ Cimoligæ similis, cæterū atra colore, quæadmodū Ampelites. At terra, siue lapis, siue bolus Armenus, colore est pallido, promptissimeq; soluitur in lauorē omnino equalem, ut calx, ualidamq; desiccandi uim possidet. Si quidem ad dysenterias, uētris profluvia, sanguinis excretiones, catarrhos, et putrescentia oris ulcera, in primis competit. Quin & illos magnificè iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit. Quare & is quibus ex tali occasione, anhelitus difficilis est, ualde auxiliat. Sed & eos, qui tabe laborant, adiuuat: ulcus enim ipsorum desiccatur. Maximè etiam confert Armenus bolus contra pestilentes affectus. Ii siquidem usu eius non persanantur, qui prorsus immedicabiles sunt. Cæterū bibitur ex uino albo, cōsistētia tenui, modicè diluto, si is qui morbo est correptus, aut planè feбри careat, aut leuiter ea teneatur. Sin grauius febriat, admodum aqueo. Non sunt tamen calore uehementes febres pestilenciales.

Febres pestilē-
tes nō esse ue-
hementer cali-
das.

De lapidibus.

EX corporibus sponte natis sunt lapides, hoc diuersi si a uulgo nuncupata terra, q̃ rigari nō sustinent. Vires habent partim secundum totius substantiæ proprietatem: partim secūdū qualitates effectrices. Nunc autem sermo nobis esto de illis uiribus, quæ secūdum effectrices agunt qualitates: in quibus sanè est & utē.

di ratio & methodus. Nam facultates quę proprietatis totius substantiæ ratione insunt, à methodo sunt atq; ratione alienæ, & per solam experientiam noscuntur. Nam cur hic lapis tacto uulnere unde sanguis prorumpit, cursum eius reperimat, haud nouimus. At cur hæmatites lapis in oculares facultates indatur, nouimus: qđ sit rationis inuentum. Nam si in cote oculari cum aqua eum teras, donec accipiat crassitudinem mellis, astringentem facultatem percipies. At didicisti qđ gliscentes etiānum phlegmonas restringentibus medicamentis repercutere oporteat: ubi autem iam sanguis non fluit, astringentibus medicamentis digerentia adiungere, & sensim ad ipsa sola transire. Itaq; de his lapidibus prius disseram, qui mortarij aut cotis attritu, in liquorem soluuntur.

Ciferis, Pumex.

Pumex quidem abstergit. Sed Smiris acrimoniæ quiddam obtinet. Proinde causticis & desiccantibus facultatibus additur, eisq; quę curant gingiuas laxas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior Smi re, eosdem ad usus.

Lapides qui in spongijs reperiuntur.

FRangendi uim obtinent, non tamē ita ualidam, ut lapides in uestica comminuāt. Rumpunt eos tamē qui coguntur in renibus: ueluti qui aduehuntur ex Cappadocia.

Ostracites.

HVnc lapidem aiunt desiccandi ualenter facultatē habere, temperatam ex astrictione, acrimoniaq;: ut Geodem expurgare pupillas, uberumq; & testium sanare phlegmonas, inunctum ex aqua. At Cotis Naxiæ ramentum uirginibus māmās prohibet tumescere: sicuti & testes puerorum: tanquam facultatis refrigeratoriæ sit particeps.

Ophites.

Facultates quę proprietati ratione insunt, à methodo alienas.

Hæmatites lapis commode ocularibus medicamentis miscetur.

Phlegmonarū generalis curatio.

Ciferis.
Pumex.
Smiris.

Spongiatum
lapides.

Ostracites.
Geodes.
Cotis Naxiæ
ramentum.

Ophites.

EXtergendi confringēdiq; uim possidet; ceti etiam uirum. Admodū enim ipsum ex uino albo ac tenui epotum lapides uesicæ conterit; atq; confringit.

Iaspis uiridis.

Iaspis uiridis.

Ventriculum adhæsu, ipsiusq; os adiuuat. Porro Ophitem lapidem suspensum, iuuare morsos à uiperâ tradiť. Sed eiusmodi facultates non constant methodo. Veluti etiam quum Hieracites & Indicus profuentem ex hæmorrhoidibus sanguinem sistunt.

Hieracites.

Indus lapis.

Sapphyrus.

Sapphyrus.

Ictos à Scorpione iuuare creditur.

Aphrofelinus.

Aphrofelinus.

Liberat comitiali morbo uexatos; id quod nōdum sumus experiri.

Dioscoridis Thyites.

Thyites.

Subuiridis est ut Iaspis, soluiturq; in succum colore quidem lacteum, gustu uerò acrem; ac proinde nemo illum oculorū miscet medicamentis, nec fluxiones reperiētibus, nec ulcera sanantibus. Sed eo tantū utuntur ad purgandum & abstergēdum quæ pupillam absq; phlegmone offuscant; quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

Iudaicus.

Iudaicus lapis

Colore est candido, specie concinna, lineas habēs ceu torno ductas. Utunt ad uesicæ lapides in cocte soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Præcipue uerò ad eos qui in renibus hærent, est efficax.

Pyrites.

Pyrites.

Validam possidet facultatem, eoq; utimur digerenti emplastro admisto. Adijcitur etiam ei & schistos. Ab hoc medicamine & pus sæpenumero, & consistentia grumosa in spatijs intermedijs musculorum nata, per halitum sunt degesta. Nisi autē dum in usum ueniunt, pollinis instar comminuantur hi omnes lapi-

des, ut profundū corporū quibus applicantur subeāt, assimiles manent istis marinis fluuiatilibusq; arenis: quæ & ipsæ cōmunem omnium lapidum uim possident. Siquidem exiccant tumentem ab aqua inter cutem carnem, si in ipsis excafactis decumbat gger. Nō tamen ad aliud quippiam eis utimur.

Phrygius.

Hoc semper uitor combusto quidem ad ulcera putrida: idq; ipso aut p se, aut ex aceto, aut œnomyelite, aut oxycrato. Ad oculos uerò ex eo permisto alijs, medicamen siccū efficio. Validè enim desiccat, habēs quiddam astrictionis simul & mordicationis.

Ageratus.

Astringit simul & digerit. Atq; astrictione quidē euidēter iuuat phlegmone columellas grauatas.

Astius.

Colore & consistentia est topho similis, friabilis, lususq;. Innascitur ei quiddam instar farinæ tenuissimæ, qualis in molarum parietibus adherescit. Appellant hoc medicamen petræ Asiæ florem. Est uerò & tenuiū partium, ut sine morfu nimis fluidas carnes eliqueat. At petra ipsa in qua nascitur, actionis uehementia est inferior. Habet etiā & salfedinem quādam ipse Asiæ petræ flos, ita ut inde uideatur ducere originem, quod ros ex mari in petram residens, à sole postea exiccetur.

Gagates.

Colore est atro, qui ubi igni fuerit admotus, persimilem bitumini odorem exhibet. Confert autem ad discutiendos flatulentos tumores consistentes in genu, diuturnosq; & ægrè curabiles: ac præterea cruenta uulnera glutinat. Est et lapis Thracius, cuius in hūc modum Nicander meminit.

Si lapis uratur candenti Thracius igne, & Post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem

Arena quomodo exiccet tumentē ab aqua inter cutē, carnem.

Phrygius lapis.

Ageratus.

Astius lapis.

Petræ Asiæ flos

Gagates.

Thracius lapis.

Nicander.

Mox oleo affuso penitus restinguitur, Et c.
Nullus tamen eius in medicina usus, nisi quòd sufficit
abigit feras.

Magnitis.
Magnes.

A Magnitis, Heraclia, Magnes.
Ssimilem hæmatiti uim obtinet.

Arabius lapis.

Arabius.

L Apis est elephanto similis, desiccantis abstergentisq; potentia.

Alabastrites.

Alabastrites.

C Ombustus in medicinæ usum ingreditur. Quidā
eum bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Smiris.

V Ehementer quidē abstergit. Quare ipso ad annu-
los exculpandos utunt, & ad dentes purificandos.

Hæmatites, Galactites, & Melitites.

Hæmatites.
Galactites.
Melitites.

HÆmatites & Galactites lapides, à colorum simi-
litudine, quos repræsentant, sic nominantur. Ille
siquidem sanguinis, hic in succum solutus, lacti uidet
similis. At Melitites, non à colore, sed à sapore mellis
talem nomenclaturam sortit. Quum igitur succus om-
nis dulcis à temperato calore proficiscatur, astringens
uero à frigore, habebit sanè hæmatites lapis tantū fri-
giditatis, quantum et astrictionis; Melitites uero tem-
peratam caliditatem: at mediam utriusq; temperiem.
Galactites. Merito itaq; ocularibus medicamentis la-
pis hæmatites miscet. Ac solo eo uti possis supercilijs
exasperatis, si quidē cum phlegmone sint aspera red-
dita, ex ovo ipsum diluens: ac si magis, etiam per deco-
ctum scenigreci. Sin uero citra phlegmonem, ex aqua.
Hic idem lapis similiter in cote cōtrit, sanguinis ex-
puitioni cōducit, ulceribusq; uniuersis. Porro siccus,
reductusq; in tenuissimum pollinē, reprimit excrescē-
tia: ipsaq; oculorum ulcera solus per se cicatrice inclu-
dit attritus, cæterum aut affusus, aut inunctus.

Schistos.

Hæmatiti per similem uim obtinet, sed infirmiorē Schistos: ac post eū Galactites. At Melitites nō nihil caliditatis asciuit. Vt igitur unusquisq; leuiter ac sensim ab hæmatitis facultate recedit, ita in usum oculorum accommodatur. Est tamē mitior. Etenim mitiora remedia partibus etiānum phlegmōe afflictis semper gratiora sunt. Quæ quidem, liberis iam à phlegmone partibus, infirmiora sunt, q̃ ut persanare ualeant. Porro quum lapidibus omnibus cōmune sit, ut desiccant, quotquot ex ijs in succum soluti, aut redacti in pollinē, nullam continuō qualitātē in gustu obtinent, hos putandum est esse tum infirmissimos, tum mitissimos, tum minimē mordaces. At qui manifestam qualitātē exprimūt, ij pro qualitatis rōne potentiā possident. Ac si qdem astringtā, ad cōprimēdū, cōstringēdū, spissandū, & contrahendū: si uerō mordicēt, ad excalfaciēdū, digerendum, et colliquandum. Medij eorum sunt, qui absterget citra mordicationē. Igitur Hæmatites, Schistos, Galactites, & Melitites, in succū uertunt. Quāq̃ sunt & alij in succū solubiles, ut Moroxus qui in Ægypto nascit, omnium dictorū minimē qualitatis particeps. Quare tantū desiccandi uim possidet.

Metallica medicamenta.

Metallica medicamēta appellare medicis mos est, quorum generatio in metallis consistit, siue spontanea, siue per fornacem facta. Vt igitur lapidibus uniuersis, & terræ medicaminosæ cōmune est ut siccent, ita metallicis quoq; medicamentis omnia. Est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris terræ significatum. Porro caliditate diutina, mistam ex terra & aqua, nonnunq̃ etiam aere, substantiam uniēte, temperanteq; ac postea desiccante, metallicorum medicamentorum consistentiæ proueniunt. Quemadmodum igitur in differentijs terræ plurima essentia terræ elementaris habetur, paulum uerō aeris, ita in metallicis mul

Schistos.
Galactites.
Melitites.

Lapides oī
communitē
siccant.

Moroxus.

Metallica quę
dicantur.

Metallica om
nia siccare.

Metallificis plu-
rimū igneꝝ sub-
stantiæ esse im-
mistum.

tum igneæ substantiæ est immistum. In medio autem eorum sunt lapides. Proinde alia metallicorum semel aut bis, alia frequentius lota, idonea sunt, ut citra morsum exiccent. At locorum, in quibus hæc proueniunt, natura, pro ut plus, minusq; est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelatq;.

Hales, Sales.

Hales.
Sales.

S Al partim ex mari sit in salinis: partim è terra effoditur. Ceterū utriq; uis est assimilis, ipse u. delictet exiccatrix. Porro aphronitri sapor amarus est, & abstergens: salis uerò, tanto in abstergēdo inferior, quāto in astrictione superior. In utriusq; medio sapor nitri consistit.

Armeniacum.

Armeniacum.

V Im habet extergentem cum leuicula tum acrimonia, tum astrictione. Vnde merito miscetur ocularibus facultatibus. Præterea ipso per se redactio in pollinem, atq; sicco, utuntur ad pilorum in supercilij incrementum: ubi præ humorū acrimonia partim excidunt, partim nec crescunt, nec nutricantur.

Arrhenicum, Auripigmentum.

Arrhenicum.
Auripigmentum.

F Acultatis est causticæ, tam combustum, q̃ ustionis expers. Ceterū per ustionem tenuiorum partium efficitur. Utuntur porro ipso ad denudandam pilis quāuis particulam. Verū si diutius hæreat, necuti quidem parcit.

Aphronitrum.

Aphronitrum.

A Phronitum ab aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentum exiccatorū existit, aspectu triticeæ farinæ similis. Etenim alba est, non ut Asiæ petræ flos cinericea. Aphonitrum uerò farinæ speciē nō habet, neq; solutū est, sed concretum & congelatum. Quod quidē adeo extergit, ut nō modò sordes expurget, sed etiam pruritum sanet. At spuma nitri, eiusdem cum nitro est tum naturæ, tum facultatis: licet essentia

Aphonitrum.

Nitrum.

tenuioris

tenuioris. Dictum autē est paulō ante in medio aphronitri et salis, facultatē nitri cōsistere. Aphronitro enim sola inest uis detergendi; sali uerò etiam astringendi, sed multò magis, q̄p detergendi.

Gypsum.

Gypsum quidē tum desiccatur, tum uires habet em-
plasticas. Quare siccis medicamētis quæ ad san-
guinis eruptiones accōmodantur, utiliter commiscet̃.
Nam ipsum per sese lapidosum sit, coactum & conge-
latum. Ac proinde diluendum est oui tenui & candida
albugine, q̄ & ad ophthalmias est utilis, admisso illi te-
nuissimo farinæ triticeæ pollione, qui residet in mola-
rum parietibus. Excipere uerò quod sic maceratū est,
tenellis leporis pilis, aut q̄ pinde sint molles, expedit.

Gypsum.

Albugo oui ad
ophthalmias
utilis.

Gypsum ustum.

Non habet æquē emplasticā uim, cæterū tenuio-
rum est partium, & ualentius desiccatur. Quin &
repercussorium est, maximè si maceretur oxycrato.

Gypsum ustu.

Diphriges.

Mistam habet tum qualitātē, tum facultatē. Habet
enim in sese qddā & mediocriter astringēs, & medio-
criter acre: unde ulcerū rebellīū optimū medicamē est.
Eo siquidē ad putrescētia oris ulcera, siue per se, siue cū
melle, cum detracta erat spuma, tum ad anginam, ubi
iam per astringentia medicamenta constitit quod in-
fluebat, ac breuiter ad columellam præcisam, puden-
diq; & ani ulcera cicatrice obducenda, sum q̄p foelicif-
simè usus. Porro quo pacto adulterētur dictorum me-
dicamentorum singula, non uidetur pretium operæ
scribere, quum talia posse discere homines sceleratiss-
simi in lucro ponant.

Diphriges.

Adulteria me-
dicamētorum
cur docenda
non sunt.

Theion, Sulfur.

Sulfur omne trahendi uim possidet, estq; tempera-
menti calidi, atq; essentiæ tenuis, adeò ut ad multa
uenenatorum animalium resistat, si siccū ictui insper-

Theion.
Sulphur.

gatur: aut cum saliuā, aut urina, aut oleo ueteri, aut melle, aut resina terebinthina illinatur. Quin & p̄foras, & lichenas, & lepras, non raro hoc medicamēto cum resina terebinthina sanauit. Extergit enim omnes id genus affectus, absq; hoc ut in profundum repellat.

Ios, Ærugo.

Ios.
Ærugo.

G Vstantibus acrem exhibet qualitatem, digerens, detrahens, & liquans non teneram modò, sed & duram carnem. Hallucinātur igitur qui talia medicamenta, epulotica appellant, hoc est, quæ cicatricem inducant: quum nimirū epulotica pharmaca contrahāt, constipent, & in calli morem ipsam carnem indurēt. Quin & gustum mordicat ærugo, non tantū ulcera. Quòd si pauculū eius cerato non pauco admisceas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum exterget.

Epuloticonum
opera.

Cadmia.

Cadmia.

C Admia fit, ubi in fornacibus æs paratur: nempe tota terra, aut lapide ex quo æs gignitur, in sublimem partem fornacis egerente ueluti fuliginem aut fauillam quandam. In argenteis etiam metallis simili secretionē efficitur. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus usto fit cadmia. Cæterū absq; fornace in Cypro cadmia inuenitur, quam iure quispiam lapidem uocat. At eius quæ combusta est, aliam botryitin, aliam placitin Medici nuncupant. Botryitin quidem, * quæ in editioribus ipsius fornacis muris colligit. Placitin uerò, quæ in humilioribus. Ac liquet sanè Botryitin partium esse tenuiorum: crassiorum uerò Placitin: utrāq; autem ui desiccandi, ac mediocriter digerendi præditam. Quæ autem colligitur in fornacibus, igneæ qualitatis necessariò etiam aliquid habet. Meritò itaq; eā

Cadmiz diffē
rentiæ.

Cadmiz uires.

abluentes, medicamen efficiunt mediocriter tum desiccans, tum extergens absq; mordicatione: utile ad cauulcera præhumida, & putrescentia, quæ in oculis & in toto corpore habētur. Igitur respicientes ad tempera-

tam & mediam inter omnes excessus naturam, leuiter desiccatoriam absterforiamq; cadmige inesse facultatē dicimus In caliditatis autem et frigiditatis differentia, cadmia quodammodo temperata existit.

Cinnabari.

M Odicē acrem facultatem obtinet. Habet uerò & Cinnabari.
astrictionis quippiam.

Ciferis, Pumex.

I N sarcotica medicamenta inditur, & ea quæ den- Ciferis.
tes extergunt, partim uersionem non expertus, par- Pumex.
tim etiam exustus: quādoquidem alijs omnibus com- Exusta omnia
bustis similiter, substantiæ tenuioris efficitur. Cæterū reddi substantiæ
uersione quiddam acquirit acrimoniæ, quā rursus lo- tenuioris.
tione exuit. Videri autem poterit, & cōciliare splendo-
rem, nō tantū facultatē, sed etiā asperitate: ueluti si smi-
rin, aut testam tritam admoueas. Eundem in modum
cornua deusta dentes reddunt splendidos.

Conia, Lixiuum ex cinere.

A Bluto cinere fit. Cinerem autem, ustorum corpo- Conia.
rum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixiuū Lixiuum,
pro eius quod eluitur natura. Cineris siquidē qui acri Cinis.
moniam igneam habet acerrimam, ipsum quoq; acer-
rimū est: eius quod tale non est, etiā moderatius. Qua-
re & putrefacientibus medicamentis miscetur: utpote
causticam facultatem possidens: sed propter substantiæ
suæ tenuitatem, citra dolorem adurens.

Cyanos, Cæruleus.

A Crem possidet facultatem, ac tum detrahendi, tū Cyanos.
digerendi, q̃ cinnabari, potentiorē. Inest quoq; Cæruleus lapis
ei nonnulla astrictio.

Lepis, Squama æris, & ferri.

S Quama, alia est grisea, medicamē multo utilissimū: Lepis.
Squamæ ferri, & stomomatis: alia deniq; quam nōnulli Squama.
uocant helitin. Atq; omnes sanè uehementer siccant. Helitis.
Cæterū helites principem in desiccando locum ob-

tinēt: nam subtilissimæ omnium substantiæ est, nimirum quæ æruginis non nihil assumpserit. Maiorē obtinet astrictionem squama ferri, & hac etiam maiorem stomomatis. Quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt quæ squama æris. Detrahit & liquat carnem potentius squama æris, & hac etiam ualentius helictis. Omnes autem squamæ non instrenuē mordaces sunt. Quare essentia ipsarum non est admodū tenuis. Siquidem inter ea quæ parem uim possident, minus est mordax quod est tenuius.

Mordacia minus esse quæ sunt tenuiora, si parem facultatē obtineant.

Lithargyros.

Lithargyros.

Desiccat quidem, sed omnium moderatis simè: & secundum alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio consistit. Modica tamē astringendi, abstergendiq; facultas ei inest. Cæterum ad intertrigines femorum utilis medela est. Iure itaq; medi ordinis in metallicis habebitur. Proinde frequēter utimur lithargyro ceu aliorum materia: sicuti in liqueſcentibus ad pleraq; medicamenta adhibemus ceram, tamquam materiam mediam eorum quæ ualentem possident facultatem.

Cera.

Nitrum.

Nitrum.

Inter aphronitrum & salem uires medias fortitur. Cæterum uſtum propius ad aphronitrum accedit, utpote ex uſtione tenuius redditum. Desiccat itaq; & digerit: quæ si intra corpus sumat, secat & extenuat crassos & lentos succos, multo potētius quæ sal. Aphronitrū uerò, nisi grauis urgeat necessitas, deuorandū non est, nimirum inimicum stomacho: quandoquidem plus etiam nitro incidit. Porro ad suffocantes fungos, nitro uſto simul & non uſto, & multo etiam magis eius spuma, uti consueuimus.

Aphronitrū inimicum stomacho.

Melanteria.

Melanteria.

Valde quidem astringit, astringentiaq; omnia per modum tenuitate superat.

Melan graphicum, Atramentum scriptorium.

A Dmodum & ipsum desiccatur aqua solutum. Vice Atramentum
 ra autem igni ambusta protinus illitum iuuat. & scriptorium.
 si acetum quoque habeat, multo magis.

Misy.

I N metallis ipsis, super chalcitim nascitur misy, ut Misy.
 ærugo super æs. Ac suspicor etiam fori longo tem- Ærugo.
 pore mutationem in chalcitim posse accipere. Quare Sori.
 mirum non est, tria hæc medicamina eiusdem genere Chalcitis.
 facultatis esse, fori dico, & chalcitim, & misy, tenuita-
 te & crassitudine inter se diuersa. Crassissimum enim
 est inter ipsa fori, tenuissimum misy, mediam utriusque
 facultatem habet chalcitis. Adurunt uniuersa hæc tria,
 & escharas efficiunt. Attamen non nihil etiam astrin-
 gunt. Cæterum misy admotum corporibus duris minus
 chalcitide mordicat, tametsi ea non minus sit calidum:
 id quod beneficio tenuitatis sortitur. Porro quum utraq;
 hæc in decoctionibus fundatur, & magis chalcitis, quam
 misy, fori tamen non liquefcit: nimirum quia lapidosius
 sit, & uehementius compactum: sicuti rursus misy, quia
 à congenito calore elaboratius est, ac proinde siccius
 chalcitide, ideo merito quoque liquefcit ægrius.

Molibdæna, Plumbago.

S Imilem lithargyro uim possidet, tantum à media tem- Molibdæna.
 perie ad frigidius paulum quid recedens. Sed neque Plumbago.
 abstergentis facultatis est particeps. Vtrumque autem me-
 dicamentum liquari potest, celerrimeque; ubi oleo non-
 nihil aceti est additum. Liquantur tamen etiam admi-
 sta aqua, sed coctione longissima. Vidi equidem mo-
 libdænam proiectam plurimum cum multis alijs lapidi-
 bus in ea uia quæ ad ergasteria ducit à Pergamo.

Molibdos, Plumbum.

F Acultatis est refrigeratoriæ. Siquidem non modò Molibdos.
 multam habet substantiam humidam à frigore cō Plumbum.
 gelatam, sed & aeriam: paucam autem terream. Igitur

**Plumbum vni
cū mole & pō
dere augetur.**

**Plumbeū mer
tariū conferre
ad conficiēda
medicamenta
refrigerātia.**

**Plūbi lamina
admota lūbis
nocturnas pol
lutiones coer
cet.**

**Plumbū vstū
qbus cōducat
affectūbus.**

q̄ plurimum habeat essentiaē humidæ coactæ à frigo
re, indicium tibi esto, q̄ ubi admotū est igni, celeriter
funditur fluitq̄. Quodd uerò & aeris sit particeps, hoc
habeto signum. Omnium quæ nouimus unicum plū
bum tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur
in ædibus subterraneis, aerem habentibus turbidum,
ita ut quæcunq̄ illic ponantur, celeriter situm contra
hant. Iam uerò si in mortario plumbeo liquorem quē
libet plumbeo pistillo cōtriuēris, ita ut ex pistillo ipso,
atq; etiam mortario exprimatur etiam aliquis succus,
id quod ex utroq; conflabitur, multò erit frigidius, q̄
liquor infusus fuerat. Cæterū si uis magis refrigera
torium medicamen efficere oleum omphacinū, aut ro
faceum, aut mellinum, aut myrtinum, sit liquor is, quē
infundes: eritq; remediū optimū ad sedis phlegmo
nas cum ulcere aut rugis, & ad eas quæ in pudendis, te
stibus, uberibusq; consistunt: similiter aduersus cæte
ras omnes fluxiones quæ articulis accidunt. Sed & ul
ceribus rebellibus etiam utile est. Nam ad canculos eo
utens, uirtutem medicamēti miraberis. Quodd si celeri
ter multum succi plumbei uelis colligere, conare in so
le terere, aut quocunq; certè modo aere exalfacto.
Multò autem utilissimum habebis medicamentum, si
affuso refrigerantium succorū aliquo teras, ut semper
uiui, cotyledonis, intybi, lactucæ, condriles, psylli, om
phacis, portulacæ. In laminam etiam diductum plum
bum, lumbisq; admotum, pollutionem per insomnia
coercet, nimirum haud obscurè refrigerās. Sed & bra
ctea tenuis probè ganglio illigata, ipsum dissipat. Illi
gabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit
in ipsam noxam potius firmandum, q̄ hinc uel inde.
Porro plumbum ustum, ac dein ablutū, refrigerat, cō
fertq; ad implenda ulcera, eademq; cicatrice obducen
da. Conuenit & chironis dictis, & omnibus cācrosis
ulceribus. Ante lotionem autem, ulceribus pertinaci

bus etiam auxilio est.

Ostracon, Testa.

DEsiccandi abstergendiq; uim possidet, maximè quæ ex fornacibus est. Ex qua quidem præperata emplastrum, optimè cicatricem inducit.

Ostracon.
Testa.

Pompholyx, Spodium.

Pompholyx fit & ī æris fornace, ueluti & cadmia: fitq; & dum in fornacibus cadmia uritur, nimirum ab ipsa cadmia in tectum fornacis quadam fauilla ascendente: quæ dum colligitur est pompholyx. Nā quod reflectens in pauimentum recidit, nominatur spodium. Cui uidetur similem habere facultatem, quod antispodium appellant. At ego illo usus sum nūquam, quum largè mihi semper pompholyx suppetere. Nec enim quisquam ubi hæc adsit, spodio uti uelit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum propè omnium quæ citra morsum desiccant, si elota fuerit, præstantissimum. Quamobrem ad ulcera cācrofa idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; inditur collyrijs quæ ad oculorum imponūtur fluxiones, quæq; bullas in eis natas curant. Præterea ad pudendorum & sedis ulcera optimum est remedium.

Pompholyx.

Spodium.
Antispodium.

Pompholyx
quibus uisita.

Sandarache.

Vrentis est facultatis, ut arsenicū. Meritò itaq; digerētibus facultatibus & extergētibus cōmiscet.

Sandarache.

Sandix.

Qua sit facultate prædita, in sermone de psimythio explicabitur.

Sandix.

Scoria.

Scoria omnis resiccatorium est medicamen: potissimum autem ferri. Siquidem ad leuorem redigēs ipsam in aceto q̄ acerrimo, posteaq; decoquens, ad aures iam pridem fluentes pure, ea uitor pro medicamentō maximè exiccatorio.

Scoria.

Stimmi.

Stimmi.

Cum facultate deficcatoria habet astringentem adiunctam. Quamobrem & ocularibus medicamentis miscetur.

Stypteria schiste, & Strongyle, & hygra. Alumen fisile, rotundum, & humidum.

Stypteria.

Aluminis differentia.

Alumen uehementissimè astringit. Ceterum quò sit crassarum partium, tenuius quodammodo est quod uocatur fisile. Proximum est rotundum, & astringalotum: Admodum crassum est tum liquidum, tum placites & plinthites dictum.

Titanos, Calx.

Titanos.

Calx.

Via quidem uehementer urit, adeò ut crustas efficiat: extincta uerò protinus etiam crustam molitur & ipsa: at post diem unum & alterum minus urit, minusq; inducere crustam potest. At uerò temporis progressu prosum nec crustam quidem gignere ualet, tametsi etiamnum calfaciat, carnemq; liquet. Porro si lauetur in aqua, suam mordacitatē exuit, efficitq; nunc cupatum lixiuium. At ipsa absq; morfu deficcet.

Hydrargyros, Argentum uiuum.

Hydrargyros.

Argentū uiuū.

Non est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex ijs quæ parantur, ueluti psimythium, ærugo, psoricum, lythargyros. Cæterum interima ne deuoratum aut admotum extrinsecus, nondum feci periculum.

Phycos.

Phycos.

Facultatem eius, ubi de psimythio age, exponam. Chalcanthos, Atramentum sutorium.

Chalcanthos.

Atramentū sutorium.

Calcanthos (qui in Cypro ex uiridi quadam aqua cōcrescit) extrema sui parte in chalcitim temporis processu degenerat. Habet autem cum astringentia maxima, caliditatem non uulgarē coniunctam. Vnde omnium maximè cōdire seruareq; carnes humiditas potest: nimirum caliditate humiditatē absumēs, astringentiaq; substantiam contrahens, atq; constipans. Constringit itaq; siccatur, & cōtrahit in sese totius substantiā carnis.

Chalcitis.

Mistas habet astringentem acremq; facultates. Ceterum uincit acris, utpote adeò uehemens, ut carnem urat, necnon inducat escharā. Vstum hoc medicamentum mordicat, nō tñ minus desiccāt. Verum non parum astrictiōis remittit. Itaq; melior est undequaq; chalcitis tum adusta, tum lota; quum euadat sic minus mordax.

Chalcos cecaumenos, Æs ustum.

Habet & acrimoniam quādam, sed & astrictiōis est particeps. Proinde si lauetur, pulcherrimū est medicamentum cicatrici inducendæ.

Chalcranthos, Flos æris.

Tenuioris essentia est q̃ aut æs ustū, aut squama. Quare ex eo factis collyrijs extergunt, auferūtq; superciliorum magnas asperitates.

Chrysocolla.

Carnem liquat, non tamen ualēter mordicat: q̃q̃ sit facultate admodū digerente, exiccanteq;. Preparare autem hāc chrysocollā debes tempore æstiuo, aut aere prorsus calido: urinam pueri, mortario & pistillo, utroq; ex rubro ære, etundens. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus contumacibus, tum per se, tum alijs mistum. Nam quanto plus q̃ chrysocolla metallica desiccāt citra morsum, tanto etiam ipsam excellit tenuitate.

Psimythium, Cerussa.

Si ex acri aceto soluatur, gustu tamē neq; acre erit, neq; mordax, sed emplastīcū, & refrigeratorium. Cerussa adusta, in sandyca transit, medicamentū seipso tenuius, non tamē excalfaciēs. Phycos autē seruata cerussæ frigiditate, tenuitatem assumpsit.

Pforicum.

Conficitur dupla chalcite admista lithargyro: ante tamē utrisq; acerrimo aceto solutis, sicq; in ol-

Chalcitis.

Chalcos cecaumenos.
Æs ustum.Chalcranthos
Flos æris.Chrysocolla
duplex.Psimythium.
Cerussa.
Sandyx.
Phycos.

Pforicon.

lam nouam coniectis, quam fimo estate media diebus
quadraginta obrutam sepelies. Hoc medicamen ma-
gis deficcatorium est, minusq; chalcite mordax: quum
partibus sit tenuioribus.

GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber X.



IXPOSVIMVS igitur quinque
cōmētarijs prioribus qualitates quas
secundas appellant, in medicamētis
quæ effectricibus qualitatibus agūt,
pro earūdem effectricium specifica-
rumq; qualitatū mistura nasci. Ostē-
sum præterea est, quo pacto uniuerſalis facultas unica
experientia inueniatur, neq; ea uulgari, sed quæ certis
adhibeatur limitationibus. Porro in sexto, septimo, &
oçtauo libro, materiam quæ ad plantas pertinet, expli-
cauimus: in nono autem, eam quæ circa terrena & la-
pidosa uersatur. Reliquum uerò nunc est, ut eam quæ
ab animalibus sumit in hoc decimo persequamur ma-
teriam. Nam ad finē undecimi agemus de ijs quæ pro-
uenientia in aqua, nec plantæ, nec terra, nec lapis, nec
animalia sunt.

Hæma, Sanguis.

Hæma.

Sanguis nullus
est frigidus.

Sanguis suillus,
temperie est hu-
mano persimi-
lis.

PRO natura animalium uariat. Huic siquidē anima-
li est liquidior: sicciior illi: calidior alteri. Nullus au-
tem sanguis est frigidus.

Sanguis suillus.

HUMIDUS & minus calidus est, temperie humano
persimilis. Siquidem & carnes suum similes hu-

manis existunt. Vnde quidam ab hospitibus prauis appositas, auidissimè humanas carnes ederunt. Etenim ex ipso sanguine, tum generatio prima, tum postea nutritio ipsis carnibus constat. Itaque quisquis humanum sanguinem morbo alicui utilem esse ait, in suillo primum id comprobet. Nam & si aliquatenus inferior is sit humano, saltem asimile quippiam efficiet: quo cognito, ab humano plenior fore utilitatē sperabimus. Porro similia efficere posse similia, experti sumus. Nam columbæ sanguinem, qui capitis ossa cōfracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum effundere assolent. Quidam autem, quum nō esset columba ad manum, palumbi sanguine est usus, foeliciterq; successit. Alius turturem eundem ad usum applicans, nihil hominem lesit. Similibus siquidem ad eosdem affectus utimur, ubi quæ antea experti sumus non adsunt.

Hæma peristeras, Sanguis columbæ.

EO ad hyposphagmata in oculis consistentia quidam utuntur, uenis ad alarum exortū incisīs, quo sanguis calidus effluat, ut sic ad multos usus idem paret animal. Alij pullorum tenerorum extractas penas, quæ humore redundant, in ipsum oculum exprimunt. Quancū sunt nobis collyria uaria hyposphagmatis oculorum aptissima, cuiusmodi est quod plurimum recipit myrrhæ, & quod multum thuris admittit: necnon quæ ex croco conflantur. Quin & fœnigræci succus sanguini colūbino in hoc utiq; præstat. Preterea sexcentos noui eorū quibus Romæ perforata fuisse capitis ossa, nec quicquid ab usu rosacei, citra sanguinem columbinum, offensos. Quare id calidū sit æquè atq; columbæ sanguis, necesse est. Cæterū præter moderationem caloris (cuius fortè contactu iuuat) leuiter etiam astringit. Itaque melius inuenire nihil possis in capite perforato, quā ut probo rosaceo utaris.

Hæma nycteridos, Sanguis uestertilionis.

Colūbinū sanguinem in fundi p̄ cranii fracturas.

Sanguis colūbinus hyposphagmatis cōfert.

Hyposphagmatis quæ cōueniant.

Rosaceum cōmode infundi p̄ cranii fracturas, esseq; nō minus calidum sanguine columbino.

Sanguis ves-
pertilionis.

SI ubi hoc sanguine axillas illeueris, postea chalcen-
thon aut cicuta semen inspergas, Xenocrates qui-
dem ait, aut sub illis prorsum pilos nō prodituros, aut
certē lanuginosos. Alij uerō & puerorū pudendis san-
guinē uespertilionis illinūt, ut glabras illas partes con-
seruent. Ergo ex refrigeratione partis uehemēti, eius-
modi quippiā posse contingere, non est à ratione alie-
num. Non tamen adeò frigidæ facultatis est sanguis
uespertilionis: quum in totum nullus sanguis sit frigi-
dus. Porro hædinum sanguinem seruēfactum cum pa-
ri aceti portione, hæmoptoicos iuuare prodidit etiam
Xenocrates. Quod remediū tutò experiri poteris, ubi
nullum aliorum ad manum suppetet.

Sanguis nullus
in totū est fri-
gidus.

Sanguis uiridium ranarum.

Sanguis viri-
dium ranarū.

QUum assereret quidam illitum hunc prohibitu-
rum quo minus euulsi semel palpebrarum re-
nascerentur pili, falsum esse id experimento didici-

Gala, Lac.

Gala.
Lactis optimi
notæ.

Perfectissimum lac, nempe qđ ab omni aliena qua-
litate est immune (hoc est odoris exps, aut exiguū
bonum odorem referens, præterea gustu suaue, paucu-
lam habens dulcedinē, sicuti & saluberrimus sanguis,
ex quo & lacti generatio cōstat) ad acres & mordaces
fluxiones est commodissimum, non abluēs modò eas
ratione feri ab afflictis particulis, sed etiam ob pingui-
tudinem corpora illinens, ut non in nuda cadat, quod
defluit. Porro quum lac omnium alteretur facillimē,
præsertim si ambiēs fuerit calidus, multum à dicta fa-
cultate amittit, nisi prius quis ab uberibus effuso ip-
so calido utatur. Maximē igitur mulieris bene habitæ
& bonam uictus rationem seruantis, lacte utendum:
nam id humano corpori est longē familiarissimū. De-
inde aliorum animalium, quæ quidem ab humana na-
tura non longissimē absunt: id quod scies ex carniū
odore. Nam fastidiosus est eorum quæ multum diuer-

Lactis vsus.
Lac alteratur
omnium facil-
lime.
Lac mulieb-
re est homini fa-
miliarissimū.

ſam habent temperiem, ut canis, lupi, leonis, pardalis, uulpis, hyænæ, urſi, & ſimiliū. Non iniucundus eſt eorum quæ nō porrò abſunt, ut ſuis, capræ, equæ, bouis, ouis, & aſinæ. Quocirca etiam homines docti experiētia, caprino, ouillo, bubulo, aſininoq; lacte utuntur, & caſeos ex eis conficiunt, excepto aſinino. Nā id planè tenue eſt, & plenū humoris ſeroſi, ueluti bubulū craſſum; cæterū conſiſtentia medium caprillum eſt. At ſus crudum aqueumq; lac obtinet. Iam uerò lac omne ex tribus cōſtat eſſentijs, caſeoſa, ſeroſa, et pingui. Hāc plurimam habere conſpicitur bubulum, ex quo butyrum conficitur, facultatis concoquentis & relaxantis. Quare maximè illo utuntur ad parotidas et bubonas.

Serum lactis.

AT ſerum extergendi potentiam poſſidet, adhibeturq; ſubducendi uentris gratia, ac per clyſteres inijcitur, extergens & abluens ſine mordacitate acrimoniam inteſtinorum. Præterea ſi quis ulcera quæ ſanie infeſtantur acri, uice aquæ ſero colluat, optimè ſanè fecerit. Quæcunq; etiam medicamenta digerere ſolent ecchymomata, & atra, ea præſtat ſero q̃ aqua diluere. At quod lacti caſeoſum ineſt, illitū adhæret magis; ob idq; acrimoniam retūdit. Atq; ubi aliam quāpiam deſiccantem facultatem habuerit adiunctā, optimū eſt dyſenterix remedium, & oīum uentris acriū fluxionum. Eam autem accipit à lapidibus, aut etiam ferreis cylindris, qui prædecocto lacti inijciunt igniti. Ferrum ſiquidem aſtringentis facultatis etiam eſt par ticeps. Porrò lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per ſe, tum cum mollium collyriorum quopiam, eſt utile; præterea ad hypopia & hypophagmata. Quin etiam palpebris extrinſecus, ubi qui ophthalmia laborant, ſomno ſeſe dabunt, impoſitū ſimul cum roſaceo, & ouo, phlegmonas eorum cōcoquet. Sed hoc eſto lac mulieris recens ex mamillis expreſſum. Infundimus

Lac aſininum eſt plenū humoris ſeroſi.
Lac bubulū.
Lac caprillū.
Lactis ſubſtantia triplex.

Serum lactis q̃ præſtat.

Caſeoſe lactis ſubſtantię uſus.

Ferri facultas.

Lactis uſus.

Lac collutum
anginā lenit.

Lac auxiliari
iis qui venena
erodentia vo-
rarunt.

ipsum & utero exulcerato Sic eo & ad sedis & pudendorum ulcera utimur, & ad omnia breuiter, quæ leniri postulant. Ea propter & cācrofis applicatur ulceribus, medicamentis anodynis commistum, qualia sunt quæ constant ex pompholyge. Collutum etiam, oris phlegmonas mitigat: necnon tonsillas, columellā, antiadas phlegmone affectas, ac proinde etiam anginam lenit. Est itaq; medicamen leniens, totam quidem substantiam habens mordacitatis expertē, sed multò magis ubi concoctione moderata, potissima pars feri cōsumpta fuerit. Sic mihi uidentur etiam Medici ad uenena quæ erosionem interimunt, lac ppinare: ueluti sunt lepus marinus, & cantharis. Sunt etiam qui & meritò id exhibent, ijs qui aconitum & thapsiā deuorarunt.

Caseus.

Caseus.

Caseus inueteratus ē acrior.

Vbi pinguitudo cū toto lacte concrefcit, seroso dñi taxat^r humore per coagulationē secreto, pinguis caseus efficitur. Qui quidem qualiscunq; sit, temporis spatio acrimoniam acquirit, quam deprehendes gustu & olfactu. Cæterū impense acris inueteratus q; iam redditus, maceratus q; decocto suillarum carnum, topophos arthriticorum discutit. At recēs caseus et mollis, mirè uulnera glutinat: nam reperiendi uim possidet, leuiter nimirum refrigerans. Cæterū oxygalactinus, præter hæc, digerendi etiam quandam uim lenem obtinet.

Butyrum.

Butyri facultas.

Facultatis est concoquentis, paulum etiam habēs digerentis potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem atq; mollitiem. Nam corporum planè durorum tumores præter naturam, hoc nequit medicamen digerere. At quæ in mollibus sunt phlegmongeas & cōcoquit & digerit facilè. Nam parotidas, & bubonas, & oris inflammationes, prorsus illo solo curamus: nimirum puerilibus corporibus, mu-

liebribusq; eas perpetiētib. Sed & gingiuis puero-
rum dentientiū assiduē illitum, nihilo imbecillius mel-
le, extenuat exitum dentibus: ceterosq; oēs oris phleg-
monosos affectus, postea q̄ fluxio restiterit, digerit pa-
riter, concoquitq; Proinde cataplasmatīs inditur quæ
extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs,
bubonibusq;. Deuoratū etiam, distributumq;, magni-
ficē confert expuitionibus ex pulmone, idq; in pleuri-
ticis peripneumonicijsq; affectibus: cum hoc quod eos
etiam concoquat. Quod si solum lingatur, magis qui-
dem concoquit, uerū educit minus: sin cum melle &
amaris amygdalis, plus educit, sed minus concoquit.

Pytia, Coagulum.

Coagulum omne acris & digerentis potentia est,
atq; etiam exiccatoria: nā necessariō id superio-
ra comitatur. Ac leporis quidem coagulum comitalē
morbum, si cum aceto bibatur, præterea profluuiū mu-
liebre sanare proditum est: necnon coactum in uētre
lac dissoluere: id quod nos sumus haud dubiē experti,
non solū in leporino, sed in aliorum etiam omniū ani-
malium coagulo. Sed & sanguinem in uentre concre-
tum simili modo epotum coagulum leporinum dissol-
uit, ac efficacius quidem cœteris, uerū non solū: quū
hoc omni sit commune coagulo.

Hic nonnulli uires castorij tribuunt.

Chole, Fel.

Hic succus omnium qui in quocq; sunt animalium
calidissimus est. Cæterū pro uaria animalium
temperie, calor eius uariat. Sunt autem in uniuersum
quatuor in singulis animalium sanguine præditorum,
humores: sanguis uidelicet, pituita, & bilis tum flaua,
tum atra. Verū dum absolutē dicimus bilem, semp
intelligimus flauam, quæ in iecoris uesica colligitur.
At ipsam flauam bilem interdum Medici pallidā no-

Butyrum exte-
nuat ifantium
exitū dētib.

Butyrum uora-
tū pleuriticis
expuitionibus
confert.

Pytia.
Coagulum.
Coaguli lepo-
rini facultates
insignes.

Coagulum oē
dissoluit lac et
sanguinē in vē-
tre concretū.

Chole.
Fel.
Humores san-
guine præditi
omniū cōmu-
nes, sunt qua-
tuor.

Flauæ bilis pal-
lidæq; disci-
mel.

Castratum ani-
mal reddi simi-
le foeminæ.

Bilis quo pa-
cto accōmode-
tur oculis.

Aures pure flu-
entes, qua spe-
cie bilis iuuen-
tur.

Bilis differētiæ
p animalium
diuerſitate.

minant. Sciendum tamen est flauam tanto esse pallida calidiorē, quanto & crassiorē. Nam seroso recremen-
to flauæ bili permisto, pallidam constitui contingit: si-
cuti & flauam plusculum exalfectam, consistētia red-
di crassam, colore autem flauam. Quin & in animali-
bus apparet flaua quidem, ijs quæ magis sunt calida:
quæ uerò minus, pallida. Et ubi animalia calida, aut fa-
me, aut siti torquentur, ad atrū colorem uergit, interim
illum habens æruginosum, interim cæruleum, interim
accuratè fuscū. Porro ubi ocularia medicamenta pre-
parant, callionymi, scorpij marini, hyæng, galli, perdi-
cis, et aliorum quorūdam animalium bilem admiscēt.
Quare color eius est explorādus. Iam uerò taurorum
bilis calidior & siccior est, q̃ boum castratorum: nam
castratum animal semper simile redditur foeminæ, &
ijs quæ sunt etatis minoris. Itaq; ut hæc humore supe-
rant adulta & perfecta, uincunturq; ab iisdem calidita-
te: ad eūdem modum bos castratus à tauris. Ut igitur
urina à modica portione modicè pallere, & sitim fa-
memq; & multum laborē perpeſſis, flaua esse conspi-
citur: impletis uerò, atq; inebriatis, albicans: ita bilis
colores mutat. At uerò q̃ hic humor sit acris, hinc dis-
cas licet, q̃ referat hæmorrhoidas, q̃q; illis ipsis qui
utuntur mordicare percipitur. Ac proinde cauemus,
ne ad alium morbum, aut symptoma, bilē usurpemus
solam, atq; per se. Quippè dum oculis ipsam accōmo-
damus, miscemus illi tum mel, tum sceniculi succum,
tum opobalsamum. Domesticarū suum bile (quæ im-
becillima omnium, ac maximè aquea existit) utuntur
quidam ad aurium ulcera: medicamento certè non re-
probo. Cæterū ubi ulcus diuturnum fuerit, ac mul-
tam saniem & pus cōtineat, etiam sicciorē bilem per-
feret, puta ouium, quæ paulò est acrior suilla: hac etiā
magis caprarum: cui adsimilis quodāmodo est urforū
& boum. At taurorum his ualentior est: inferior tamē
bile

bile hyænarum; et hæc quoq; inferior bile callionymi, et scorpij marini, & maring testudinis. Volatiliū biles oēs tum acriores sunt, tum sicciore q̄ quadrupedum; & inter ipsas quoq; uolucres, gallinarum & perdicū biles ad medicinæ usum probatiores habent. Miluio- rum uerò & aquilarum, impendio acres sunt: eroden- tes q̄; quamobrem colore ærugineo uidentur, ac non- nunquam atro. Licebit itaq; tibi secundum exigētiam affectuū, hæce differentias bilis methodo ad experi- entiam reducere.

Hydros, Sudor.

Hydres.
Sudor.

E Andem quam urina & materiam & modum ge- nerationis fortitur. Siquidem utriq; generatio ex bibito humore constat, ex calfacto simul in corpore, et biliosæ nonnihil substantiæ adeptæ. Verūm sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutē usq; permeatis om- nibus quæ intersunt partibus, peruenit. Sudores autē inter sese & urinas differre necesse est, tum p animalium tēperaturis, quæ & natura, & ætatum ratione nō parum à seinuicem sunt diuersæ: tū pro ambiētis nos aeris temperie. Quòd sudor saluginosæ qualitatis sit particeps, gustus testimonio pbatur. Nā sepe numero nolentibus in os defluens, dictam qualitatem indicat. Sæpe uerò etiam non obscuram præfert amaritudinē. Sed color etiam, eius naturā designat. Nam sicuti uri- na naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Porro te- nues exercitatorum sordes, plus reperiunt q̄ sudor: minus autem digerunt. At ubi sudor illis pmissus est, multum facultatis digerentis acquirunt. Quare tumo- res præter naturam discutiunt; ad phlegmonas q̄; ube- rum, præstantissimo sunt remedio. Quòd si sicciore esse sordes uideantur, cyprinum superungito: aut eodē ipsas, si ualde sint siccæ, subigito. Si uerò cyprinū ad manū non sit, rosaceū bonū miscuisse sufficit. Hoc me- dicamentū est admodū utile, ad restinguēdū & discu-

Sudorē esse sal-
uginosum.

Sordes exerci-
tatorium,

Vrina.

Vrina omnis,
facultate est ca
lida.

Quanta est in animalibus bilis diuerſitas, tanta
item est in urinis. Atq; omnes quidem faculta
te ſunt calidæ, ſed plus tamen animalium calidorum:
minus autem frigidorum.

Vrina humana.

Vrina huma
na.

Hæc aliarum omnium eſt imbecillima, excepta il
la quam reddunt porci domeſtici, quibus execti
ſunt teſtes. Quorum ut temperies, ita urina ſimilis hu
manæ exiſtit. At montanorum aprorum, ualida eſt, ut
uel ex odore acerrimo cõſtat. Sed et in animalibus ce
teris ex odore uim eius cõſpicere licet. Nam deguſtare
ipſorum urinas, planè fuerit abominandum: quum ne
pueri quidem urinam uir quidã honeſtus uita pariter
& moribus, ebibere ſuſtinuerit, etiã ſi peſtiferè egro
taret in Syria, ubi multi ab humanæ urine potione ſeſe
liberatos profitebantur. Etenim urina hominum, ut ſi
quid aliud, extergendi uim obtinet: id quod ſatis ſullo
nes indicant, qui ſordida uestium expurgāt uſu illius,
atq; extergunt. Quod conſpicati nonnulli Medici, ea
pſoras & lepras detergūt, pſundūtq; ulcera p̃humida,
& ſordida, multoq; magis, cõputreſcentia. Sed & pu
dendis ubi ſic afficiūtur, urinã infundūt, & auribus pu
re fluentibus. Quin & achoras & furfures ea curāt, ca
put idētidem perfundentes. At nos hæc facere odimus,
quum ad manum ſint alia, quæ illis conducant, medi
camenta. Quãq; ulcera digitorum pedis, maximè quæ
ex illiſione inſlicta eſſent, ſæpenumerò, ubi carerent
phlegmone, et ipſe urina curauit: idq; in ſeruis, et homi
nibus ruſticis. Ceterũ medicamentum quod ex urina
pueri cõficiſtur, quod quidam Chryſocollam appellāt,
quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera diffi
cilia ſanatu optimũ eſſe aſſero. Fit autē id, ubi in mor
tario æris rubei, piſtillo etiam ex rubeo ære confecto,

Vrine humane
potione multi
ſeſe liberatos
a peſtiferi mor
bo p̃ſeſi ſunt.

Vrine humane
facultas.

Chryſocolleſa
ciende ratio.

puerilis urina tandiu sub calido cœlo tunditur, donec ob eliquationē attritionemq; pistilli & mortarij, mel-
lis crassitudinem contrahat.

Sielon, Saliua.

V Turina & bilis, sic etiam saliuā, sumpto quidem cibo, imbecilla est; ualida & acris eorum qui in-
genti aut siti, aut inedia premuntur; in medio utriusq;
est, eorum qui probè concoxerunt quidem, nōdum ta-
men cibum potum ue hauserunt. Hac ergo saliuā nu-
trices pueris lichenas curant, paruum uidelicet digitū
rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes. Sed
& triticum mandentes rustici non pauci furūculis im-
ponunt; nam celeriter eos digerit, concoquitq; : quum
si macerarent aqua, non equè prodesset. Ex quo liquet
saliuā iuuandi robur adferre. Atq; corporibus mol-
libus, aut puerorum, panem, non triticum, imponunt
ore cōmansum. Porro cōmansa omnia digerunt & su-
gillata, & cetera ecchymomata omnia, maximè ubi pa-
nis simul cum pauco radicula fuerit cōmansus. Iam ue-
rò uniuersa substantia sua uel maximè aduersa est sali-
ua bestijs hominem interficientibus.

Stercus caninum.

S Tercus omne uim maximè digerentē obtinet. Cæ-
terū canis, qui solis oslibus fuerit integrū biduū
nutritus, durum, candidum minimeq; foetens stercus
est: quod quidem exiccatum, redactumq; in pollinē,
ad anginam, dysenteriam, & summè inueterata ulcera
optimè accommodatur. Ad anginam quidem, ijs mi-
stum, quæ alioqui huic affectui conueniunt; ad dysen-
teriam autem, iniectum lacti decocto, & quod filices
candentes, aut cylindros ferreos extinxerit.

Stercus humanum.

S Tercus pueri siccū, & cum melle Attico ad læuo-
rem tritum, illitumq; , sanat gutturis phlegmonas.

Stercus lupinum.

Sielon.

Saliua ieiunij
uentriculi ad q
conferat.
Triticum man-
sum furūculos
q̄ celemine
concoquit.

Saliua huma-
na aduersa be-
stiis hominem
perimentibus.

Stercus caninū
quibus affecti-
bus conferat.

Stercus huma-
num.

*Stercus lupinū
qbus conferat*

*Lupi & canes
quomō & me
iant, & cacent.*

Quidam lupinum stercus candidum, quale ubi ossa ederint, lupi solent excernere, quodq; non decidisset in terrā (lupi enī ut canes suspēso altero posteriorū crurum, & meiunt & cacāt, in eminente quopiam ex terra loco) aut uino albo, aut aqua distemperatum, colicis potandum dabit: nec tantū in ipsis paroxysmis, sed etiam in interuallis, si quidem uacarent phlegmone: felicissimeq; cedebat illi negotium. Verū illud etiā in eo mirabar, q; uel appensum illis uinculo confecto ex lana ouis à lupo laniatæ, aut ex ceruina pelle, euidenter aliquoties iuisset,

*Stercus capril-
lum.*

Stercus caprillum.

Omnium creberrimè utimur caprillo stercore, digerētis & acris facultatis: adeo ut induratis scirrhorum in modum tumoribus cōgruat, non lienis modo, sed etiam aliarum partium. Miscere tamen illi sole mus farinam fabaceam, nec non oxycratum. Quin & ad aquam inter cutem, & ad spleneticos, uariè caprillo stercore utimur. Sed & ustum tenuioris quidem essentia, uerū haud manifestò redditur acrius. Quamobrem sanè ad alopecias cōgruit, & omnia uitia, quæ extergentia medicamenta postulant, ut psoras, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatis, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & diuturniores bubonas. Est enim uis eius tū usti, tum non usti, abstesoria, & digerens, nec eam par uam habet digerendi potentiam. Nam eo etiam ex aceto quidam medicus utebatur in agris ad uiperarū morsus, ac multo magis aliarum bestiarum: ac profectò ex ijs complures seruauit. Idem etiam ad auriginem spy rathos ipsas propinauit ex uino: & ad profluuium muliebri cum thure apposuit. Acrius tamen est medicamen, q̃ ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Tam uerò animalium temperatura sicciorum, exiccantius stercus est,

*Mors a uipe
ra stercus ca-
prillū auxilio
est.*

sicuti & calidiorū, magis excalectorium. Verū nūllum omnino sterco refrigerat, sicuti neq; ullum humectat. Pro natura etiam eorum quæ edūtur, multa reperitur diuersitas. Proinde in hominibus maior est, q̃ in cæteris animalibus: quandoquidem hoc animal diuersissimis maximeq; uarijs utitur cibis.

Stercus bubulum.

Facultatem habet exiccatoriam, atq; attractoriam etiam, ut sanè ostendit, dum apū, uesparumq; moribus auxiliatur. Quidam autē medicus aqua intercutem laborātes bubulo stercore oblinens, in solē exposcebat. Idem partibus rusticorū phlegmone obsessis, humidum illud Vere collectum, dum herbam boues pascūtur, admouit. Est enim id moderatius alio, quod à paleis comestis excernitur: ac proinde accommodatius ad phlegmonas.

Stercus ouillum.

Ille idem medicus, ouīū utebatur stercore ad achordonas, & myrmecias, & thymos, & furunculos duos, aceto uidelicet diluens. Quin & ulcerum ambusta, ad cicatricem illo ducebat: id cerato rosaceo commiscens.

Stercus columbinum.

Stercore columbarū nomadum sicco, trito, & cribrato, unā cum nasturtij semine, uice napyos utor, ad ea quæ rubrificari postulant: nēpe ad omnes inueteratos affectus, cuiusmodi sunt coxædix, hemicrania, scotomata, uertigines, cephalæa, & in lateribus, scapulis, ceruice, ac lumbis, antiqui dolores: necnon nephritides, affectus cœliaci, & podagricæ arthritides: quando in articulis nondū concreti sunt tophi. Est autē hoc sterco minimè foetidum, præcipuè si sit arefactum.

Gallinaceum sterco.

Tritum, ppinatumq; cum tribus quatuor uē oxy-

Sterco nullū
nec refrigerat,
nec humectat.

Sterco bubu-
lum vesparum
moribus auxi-
liatur.

Sterco ouilla,

Sterco colum-
binum quibus
auxilietur affe-
ctibus.

Sterco galli-
naceum.

Exercitata o-
tiosis sicciora
sunt.

qui à comestis fungis anguntur: nimirum per uomitū crassissimos humores eliciens. Est autem hoc sterminus calidum colūbino. Porro ut animalia quæ exercitantur, otiosis sicciora sunt: & quæ cibis utuntur calidioribus siccioribusq; , ijs quæ frigidis atq; humidis: sic etiam eorum & excrementa, & partes. Quare colūbarum domesticarū sterminus multo imbecillius est eo, quod à montanis excernitur. Gallinarū præterea quæ conclusæ seruantur, & fursuribus alūtur, longè etiam infirmius sterminus est, q̃ earum quæ in agris pascuntur.

Sterminus anserum, & ciconiarum.

Sterminus anseri-
num.
Sterminus cico-
niarum.

A nserinum sterminus præ nimia acrimonia inutile est. Colligo etiam ita esse & accipitrum, & aquilæ. Sunt qui ciconiarum sterminus morbo comitiali mederi scriptitent. Quo epoto credulus quidam nihil adiutus est.

Sterminus murium.

Sterminus murium.

S ic enim & murium sterminus alopecias curare pro-
ditum est.

Sterminus crocodilorum terrestrium.

Sterminus croco-
dilorum.
Sterminus sturno-
rum.

C rocodilorum terrestrium sterminus, & sturnorum, quum solam oryzam ederint, utrūq; abstergēdi, desiccādiq; moderatam facultatem sortitur: ac multo moderatiorem sturnorum sterminus. Porro crocodilorum sterminus, quod mulierum iuxus pretiosum reddidit, ut à facie ephelin tollit, ita & uiriliginem, & lichenas.

Rhypos, Sordes hominum.

Rhypos.
Sordes homi-
num.


Q uod aurium sordes paronychis sit utilis, pro-
ditum est. Quæ uerò in tota cute puenit, illius
sordis quam paton uocant nō nihil actionem adiuuat.
utpote desiccandi uim habens, cum nonnulla calidita-
te. Porro ea sordes quæ lanis ouium inhæret, ex qua cefy-
pon conflatur, similē butyro concoquendi uim possidet:
paulum etiam digerentis facultatis sortita.

Oesypen.

G A L E N I P E R G A

MENI DE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber XI.



LER Æqꝫ ptes sunt animalibus uni-
uersis communes; nulla tamē est equē
communis, ut caro. Hanc enim habet
omne animal. Cæterū eam quæ re-
peritur in musculis, solam Medici car-
nis appellatione dignantur. Nam car-
nem uiscerum nonnulli parenchyma uocandam cen-
sent, propterea qꝫ ex uenis effusus sanguis, circū uasa
omnia (ut ipsi arbitrantur) concreascit. Sed nos nomi-
num contentione neglecta, persequamur propieta-
tes particularum.

Caro uiperæ.

Non omnes animalium carnes hominem nutriūt,
sed quorūdam etiam letales sunt. Tum inter eas
quæ hominem nutriunt, quædam tantū sunt nutriti-
um: quædam etiam medicamētum. Nam uiperarum
carnes palam uidere est excalfacientes, & exiccantes,
ubi condiuntur, ceu anguillæ, oleo, sale, anetho, porro,
& aqua: horum omnium seruato modo. Quòd autem
rotum corpus per cutim uacuent, uel hinc tibi discere
licet, qꝫ elephantici quidam prorsus sint restituti, ex po-
tu uini, in quo uipera quædā fuerat extincta. Præterea
nos elephaticum quendā, misso prius sanguine, atraqꝫ
bile medicamento purgata, uiperis quas capiebat uti
iussimus, præparatis in olla, anguillarum more. Atqꝫ
ita sanatus est, euaporato per cutem affectu. Porrò ui-
perarum caro, adeò ualentem obtinet desiccandi uim
ut quidam qui eam esitarūt, uehemētissima fuerint siti

Carnem omne
animal possi-
det.

Caro pprie qꝫ
dici mereatur.
Parenchyma.

Carnis uipe-
ræ facultas, et
cōcinnādē mō-
dus.

Elephantia-
curatio.

Viperarū esus
sitiū maximū
infert.

**Viperę cur ap-
pellentur di-
psades.**

**Carnes anima-
liū cum cibis
mutari.**

**Viperę caput,
nō caudā abii-
ceſ oportet ad
cōficiendos ar-
tiſcos theria-
cos.**

**Artiſcos the-
riacos cōficiē-
di ratio.**

**Carnis viperę
vires.**

**Cacochymiaę
ſymptomata.**

cruciati. Quamobrem eas diſſadas nomināt. Sunt ta-
men qui dicāt demorſos à uiperis ſatiari potu nō poſ-
ſe, ſed dirumpi potius q̃ liberari ſiti. Cauendum autē
eſt, ne ī locis mari proximis, ſalſuginofis ue, uenemur
uiperas, ſeu ad eſum, ceu ad Theriaces antidoti præpa-
rationem. Quum uerifiſimile ſit, earum quæ in id genus
locis capiuntur, carnes ſalſas exiſtere. Siquidem cum
cibis etiam animalium mutantur carnes. Porrò quo-
niam ex more dū artiſcos Theriacos paramus, non tã-
tū caput, ſed earum etiam caudam abijcimus, ſubijt
mihi frequenter rationabile fortasſis eſſe, caput quidē
totum abijci, ob uenenum quod ore continent; uerū
à ratione alienum eſſe adimere & caudam. Theriacos
autem ipſos artiſcos ſic præparamus. Purgatas illas in
aqua cum anetho elixamus tandiu, donec à carne ſepa-
rari facilē poſſint ſpinæ. Mox pani puriſſimo, probē
cocta in clibano, ſalisq; & fermenti quod ſit ſatis ha-
benti, ac breuiter reſiccato, & ad læuorem trito necnō
macerato cum ipſo uiperarum decocto, carnem prius
in mortario tuſam miſcemus. Poſtea uerò paruos ar-
tiſcos ſingentes, atq; in ædibus calidis & ſiccis ſiccān-
tes, in talibus eos tandem reponimus. Hos ergo ineun-
te æſtate cōficiamus, ſicuti & ſalem ex deuſtis uiperis,
quo potiſſimum tempore optima ipſarū eſt caro. Vt
mur eis poſtea cōtuſis denuò & cribratis, rurfusq; ad
læuorem reductis, adijcentes nonnihil & ſalis, ad ſua-
uitatem cōmpoſiti; cuius etiam aliquid ipſi theriacæ
iniijcimus. Itaq; caro uiperę ſiccet, ualenterq; digerit;
excalfacit uerò mediocriter. Properat enim uis eius ad
cutem, per eam uidelicet, quę in corpore ſunt recremē-
ta exigens. Quibus igitur copia mali ſucci in corpore
abundat, ijs pediculorum numeroſa multitudo exori-
& à cute ceu quædam ſquama abſcedit, deciditq; cu-
ticula extrema, ad quam utiq; ſolēt ſiſti craſſi terroſiq;
humores; à quibus ſanē pſoræ, lepræ, & elephātes na-

scuntur. Quòd autem ad animalia cetera pertinet, pro portione quâ in temperatura excedūt, & carnes quoq; eorum differunt atq; exuperant. Proinde taliū animalium carnes ppetuò exhibere oportet, quale uolumus corpus humanum reddere. Nec parua existit carniū differentia, dum quasdam sale cōdimus. Nam interdū animalis temperie humidissimi, caro salita, longè exic cātior euadit ea, quæ sicca natura existit. Verūm inter eas quæ salitæ non sunt, siccior est assa, q̃p quæ in aqua est elixa. At uerò caro mustelæ, arefacta, ualenter digerit, desiccâtq; : pinde morbo comitiali afflictos iuuat epota. Salitorum etiam heluorum carnem ad leuorum contritam, palos & spicula educere aiunt, impositam: sicuti & Mutulorum carnem ulceribus à mordēte carne inflic̃tis cōgruere. At cochlearū caro, prius in mortario contusa, ac postea ad læuorem redacta, omnium ualentissimè desiccât partes superfluo humore grauatas: adeò ut conueniat hydericis. Ipse autem humor solus, thuri, aut aloe, aut myrrhæ permistus, quo ad cerati accipiat crassitiē, medicamen sit tenax, desiccâtq; purulentos aurium humores. Sed & fronti impositum hēret, oculorum fluxiones exiccans. Quidam etiā ad palos eximendos utuntur totis unà testis ad læuorem tritis: alij ad sistendos menses. Carnes etiam solæ cum farina polline trite, contusorum uulnera glutinant. Ipsa cochlearum humiditas pilos superciliorum præter naturam habentes glutinat.

Pinguedo & adeps.

Differt à pinguedine adeps, q̃p crassior sit: ac propterea animātibus totam naturam terrosiorē habentibus, ut bobus & capris, adeps prouenit: humidioribus autē, ut suibus benè habitis, ipsa pinguedo. Proinde pinguedo celeriter in ignem posita, colliquescit: nec faciliè ubi semel liquata fuerit: rursus cōcrescit, aut cogitur. At adeps, nec faciliè funditur, liquescit'ue &

Carnes assæ sunt sicciores elixis.

Mustelæ caro epilepticis auxiliatur.

Cochlearū carnes, & succus.

Pinguedo. Adeps.

fusus celerrimè congelatur. Porro adeps suillus, aliorum omnium est humidissimus, ob idq; actione sua uicinam oleo uim possidet: q̄q̄ oleo magis tum emolliat, tum concoquat: quamobrè cataplasmatibus quæ ad phlegmonas accommodari solent, miscetur. Qui uerò mordicationes perpetiuntur, aut in recto intestino, aut in colo, ijs potius caprillum adipem q̄ suillum injicimus: nō q̄ plus acrimonias obtūdat, sed q̄ concreascit: suillus autem instar olei defluat. Quare caprillus potius dysentericis & tinesmosis injicitur, quando morsum eorum mitigare est consilium. Quanq̄ ob tenuitatem essentia nonnulla magis acrimonias retundunt, ubi in alto mordicatorum corporum, quod molestum est, hæserit. Hac ratione adeps anserinus magis obtundit quæ in alto corpore mordicant: præterea suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceorum & gallinarū adeps. Porro calidior semper & siccior est masculorum animalium adeps: & horum ipso rum exectorum minus tum calidus, tum siccus. Quippe mas castratus eiusdem semper generis fœminæ assimilatur. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria & excalfactoria humanorum corporum. Cæterū pinguedo suis, ut ad nos quidem, largius humectare potest, sed nō æquè excalfacere, sicuti neq; oleū: talem quippè caliditatem obtinet, qualis spectatur in nobis. Taurorū adeps suillo multo calidior & siccior est. Sic & adeps uitulinus taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hœdorum q̄ caprarum. At caprarū minus q̄ hircorum. Rursus taurorum minus q̄ leonū. Nam horum adeps omnium propemodum adipe potentius digerit. Quippè & caliditate exuperat, & parū tenuitate. Quare nimis ulcera & phlegmonas irritat. Inueteratis tamen tumoribus, atq; scirrhi in morē duratis, tum neruorū curuaturis aptissimus est, in quibus sanè suillus uidetur minimè efficax. Taurinus au-

Dysentericæ auxiliatur caprillus adeps.

Adipum differtentia.

Castratus masculus eiusdem generis fœminæ semp assimilatur.

tem, quanto calidior sicciorq; suillo est, tãto superatur à leonino. Itaq; tanquã in mediò consistens, meritò utriq; medicamentorum miscetur generi, & ei scilicet quod scirrhis medet, & ei quod phlegmonas ad supurationem perducit, cuiusmodi est tetrapharmacum, ex cera, resina, pice, & adipe constans. Verũ omnibus quibus caro est mollior, adeps suillus cõuenit magis. Duram autem & siccam habentibus, taurinus. At uerò adeps dũ inueterascit, seipso & calidior, & acrior, & tenuior efficitur: ac proinde ualẽtius siccans & digerens, id quod omnibus inueterascentibus accidit, nisi interim computrescant. Porrò urforum adipem alopecias curare uerè est proditum: quũ tamen ad eum affectum probatiora remedia habeamus.

Myelos, Medulla.

Vim habet corpora indurata & scirrhis emolliendi. Optimam semper sum expertus ceruinã: dein uitulina. At hircorum et taurorum, tum acrior est, tũ siccior. Itaq; durities scirrhisas mollire nequit. Ex uitulina igitur et ceruina pessi componuntur ad emolledos uteros. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla parantur, uim emolliendi habentia. Accipitur autem nõ solũ medulla ex ossibus, quæ sanè re uera est medulla: sed ex spina etiam: quæ tũ durior, tum siccior est altera. Vtranq; autem hyeme collectam, in sicca editaq; domo cum folijs lauri siccis repono: ne uidelicet computrescat. At si quando am-biente existẽte calido, austrinoq; medullas aut adipẽ uelis reponere, uteris ad id cubiculo q̃ maximè fieri poterit temperato, quodq; ad aquilonem obuersum, apertas habeat paruas fenestras, ut perpetuò flatus inspirantes excipiat.

Myelos.
Medulla.

Medullas reponendi ratio.

Caput mænidium.

Mænidium sale inueteratarũ capitibus uistis ad sedis fissuras utebatur quidã: et ad columellam

Caput mænidium.

diu indurataſm. Videtur ergo uis illarum eſſe deſicca-
toria, non admodum acris.* Nam ut acrimonia adu-
ſtarum nonnullis ineſt, ſic omnibus uis exiccandi.

Caput leporinum.

Caput leporis

Alius capite leporis uſto utebatur ad alopecias
cum adipe urſino.

Caput ſaurarum.

Caput ſaurarum

Sauræ caput contritum quidam palos & ſpicula
extrahere prodiderunt memorię: tum myrmecias,
acrochordonas, & clauos eximere.

Cerebrum leporis.

Cerebrum le-
poris.

Idatritum & eſum, utile dicimus eſſe pueris dētiē
tibus. Quidam etiā aduerſus tremores utiliter edi
cerebrum hoc prodidere.

Cornua ceruina & caprina, uſta.

Cornua cerui-
na & caprina
uſta.

Dentes candidos reddunt, fluidasq; gingiuas con-
trahunt. Quòd ſi ceruinum ab uſtione lauetur,
dyſenteriam, & ſanguinis excreationem, præterea cœ-
liacos affectus ſanat. Aurigini etiam dicunt id eſſe uti-
le. Ex quo quidem duo exhiberi cochlearia ad omnia
iſta præcipiunt. Quidam etiam ipſum miſcuerunt col-
lyrijs deſiccantibus oculorum fluxones.

Pulmo agninus & porcinus.

Pulmo agni-
nus, porcinius,
vulpinusq.

Intertrigines à calceamentis curare credit. At uul-
pinus ſi bibatur ſiccatus, aſthmaticos iuuat,

Iecur canis rabidi.

Iecur canis ra-
bidi.

Si aſſum edatur, remediū exiſtere ijs qui ab ipſo ra-
biēte cane fuerint emorſi, quibuſdā proditum eſt.

Iecur caprinum.

Iecur caprinū.

Quidam ipſum aſſantes, ſaniemq; excipientes
fluentem, ea utuntur ad nyctalopas. Vaporem
autem eius, dum elixatur, oculis apertis excipiendum
præcipiunt. Quin & aſſum ſi edatur, & ad eoſdem af-
fectus accōmodari aiunt, & eos qui comitiali morbo
ſunt obnoxij, coarguere. Idem poteſt hircinum hepar,

Iecur lacertæ.

E Rosis impositū dentibus, eos dolore liberare nō. Iecur lacertæ.
nulli scriptis mandarunt.

Venter mergi.

Q Vod de hoc & de interna tunica uentriculi gal Venter mergi.
linarum proditum est, id uanam esse promissio
nem comperimus.

Castorium.

T Esticulos castoris uocant castorium, medicamen Castorii, vires
& celebre & multi usus. Euidenter siquidem cal
facit. Quum autem calfacientia omnia, quæ consisten
tia sunt sicca, ubi contactæ substantiæ quippiam dige
runt, continuò etiam illa desiccant: manifestum utiq;
est, castorium etiam desiccare haud obscurè: id quod
illi cum multis est medicamenti cōmune. Quia uerò
impense subtilium est partium, ob id plus ualet q̃ alia,
quæ similiter ut ipsum tum calfaciunt, tum siccant. Nā
quæ tenuium sunt partium medicamenta, ijs quæ sunt
crassarum, efficaciora sunt, etiam si parem sortita sint
facultatem: nimirum quia magis penetrant. In conuul
sione igitur à plenitudine, quæ in neruis est, orta, & bi
bendum castorium exhibe, et cuti foris etiam impone.
Vbi uerò ex siccitate nimia conuulsio obuenerit, scito
hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem
modum ijs qui præ plenitudine aut tremūt, aut singul
tum patiūtur, est utilisissimum: aduersissimum uerò ijs,
quibus id ab inanitione, aut acrium humorum morsu
accidit. Vbi itaq; ex calfactione, aut resiccatione, aut
utraq; simul actione est opus, maximam in usu casto
rii experire cōmoditatem: nec ullam parti alicui noxā
afferet, potissimū si homo non febriat, aut febrim non
admodum calidam perpetiatur, sed tepidā, quales ma
ximè in cataphoris & lethargis accidit. Ac multis sanè
castoriū unā cum pipere albo, utrūq; mensura cochlea
rii, ex melicrato propinauimus; nec quisq; ullam per-

Lethargicorū
febres esse te
pidas.

Menses educē
di ratio.

cepit noxam. Sed & retentis mensibus, ubi per uenam
quę in talo est, modicē euacuassē sanguinem, oblato
castorio unā cum pulegio, aut calamintha, semper me-
dicamen hoc sum expertus, purgationē ciere, citra ullā
assumentis læsionem. Præterea locos morantes ejicit
eaq; omnia ex melicrato potū efficit. At quibus ab oc-
cassione frigida ita uenter flatu distenditur, ut agrē cu-
rationem admittat, eos ex oxycrato potum castorium
adiuuat. Quæ porrò iuuat in corpus intrō sumptum,
iis prodest quoq; cuti impositum, cum sicyonio, aut ue-
teri oleo. Quæ uerò ampliori calore indigent, iis etiam
per se infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius
prunis impositi, inspiratione hauriat, illos p̄cipuē affe-
ctus, qui in pulmone consistunt, aut capite. Attamen le-
thargicos & cataphoricos affectus, qui quidē habent
adiunctam febrim, p̄stat nō dictorum oleorum aliquo
macerātes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloq;
imponere.

Lumbi scincorum.

Scincorū lūbi.
Semen q̄ pro-
moueant, & ar-
ceant.

Q Væ circa renes scincorum sunt, bibūtur, tanq;
pudenda intendere ualeant. Cōtrarium autem
moliri uidetur semen lactucæ potum ex aqua.

Vngues caprarum & asinorum.

Vngues capril
li, asininiq;.

Q Vidam ungues caprarum deustos, moxq; ace-
to perusos, alopecijs illinunt. Itaq; fuerit & ta-
lis cinis facultatis exiccatoriæ. Sunt qui combustos as-
inorum ungues comitalem morbum curare dicant, si
scilicet assiduò bibantur. Si uerò macerati oleo appli-
centur, digerere chceradas. Sed & ipsum cinerē, si sic-
cus inspersus fuerit, sanare perniones.

Ossa combusta.

Ossa cōbusta.

Ossa humana

A Dmodum digerentem, exiccantemq; uim obti-
nent; maximeq; (ut quidam ferunt) humana. No-
ui siquidem nostratium quosdam * combusta ossa hu-
mana potui exhibuisse, ac multorum sic epilepsiam

& arthrim curasse.

Seneſta ſerpentis.

Hanc ſcripfere quidam in aceto bullitam, dentiũ Exuuium ſer-
mederi doloribus. pentis.

Pellis ouina recens detracta.

Circumpoſita uerberatis, eos die ac nocte una p- Pellis ouilla.
ſanat. Concoquit enim & diſcutit ſub cute con-
cretum ſanguinem.

Equorum lichenes.

Eas aceto tritas comitiales curare ſcriptum qui- Equorum li-
buſdam eſt. Alij uerò & ad cuiuſuiſ ſerę morſum, chenes.
adhiberi conſulunt.

Tela aranei.

Hanc ſcribunt nonnulli à phlegmone tueri ſum. Tela aranei.
mæ cutis ulcera.

Coria uetera uſta.

Eorum cinis exiccatorius exiſtit. Quare ulcera ex Coria vetera
attritione, & ambuſta, et intertrigines, quæ in foe viſta.
minibus ſunt perſanat.

Oſtreia.

Oſtreia quidam nuncupât teſtacea omnia: oſtreũ Oſtreia.
autem, unam tantũ teſtaceorum ſpeciem.

Buccinæ & purpuræ.

Buccinarum & purpurarum teſta uſta, redacta q; Buccinæ.
in tenuiſſimum pollinem (quod ſit tibi commune Purpuræ
præceptum in teſtaceis & lapidoſis omnibus) deſiccã
di uim obtinet, ac proinde ulceribus malignis opitula
tur: id quod etiam cõmune eſt omnium quæ citra inſi-
gnem morſum uehemẽter deſiccant: quippè quũ alio-
qui fluxionum cauſa exiſtant. Hoc etiam eſt omnium
id genus commune, quòd ex aceto, aut oxycrato,
aut œnomelite, aut oxymelite, idonea ſint ulceribus
putreſcentibus.

Oſtrea.

Oſtreorũ teſta uſta ſimilis eſt facultatis buccinarũ Oſtrea.

testis, tametsi minus crasse. Etenim omnia id genus cogendi quandam in se facultatē obtinent, per quam cōdensata eorū essentia, dura terrosa q; sunt reddita. Quā ubi per uctionem posuerint, digerentem facultatē asci- scūt. * Quod si ea, ubi usta fuerint, laueris, quicquid habebant igneum, in aqua ponūt. Quare aqua sanē ipsa excalfaciens cum tenuitate redditur, adeo ut putrefaciat interdum: reliquū uerò terrosum, morsus expers efficitur: maxime q; implendis & cicatrice claudendis humidis ulceribus auxiliatur. Cæterū ulceribus ca- uis et fistulosis, fluxioni q; obnoxijis ulceribus, ex suillo adipe inueterato foris circūpono ipsum; in sinum autē aliquid eorum quæ talia cauere implent, impono, qua-
Testarū cinis. le existit diaphanes ustum. Quin & dentes splendido res testarum cinis efficit, non tantū extergendi poten- tia, sed & asperitate substantiæ, ueluti & pumex, & testa clibani. Verū in usu eiusmodi nō est necesse quæ sic usta sunt, admodum læuigare, sicuti dum inspergū- tur ulceribus. Porro excrescentiam mediocriter exte- rūt, comprimunt q;. Ad hæc, usta omnia id genus cum sale, dentium sinegma efficacius reddūt, ut non modò laxitatē mollitiem q; gingiuarum deficcet, uerū etiam ulcera putrescentia adiuuet.

Sepiæ testa.

Sepiæ testa.

Sepiarum testa ad modum laxa est, non ut ostreorū lapidosa. Itaq; absterfio illi cum alijs testis cōmu- nis est, ueluti & deficcatio: cæterū partium tenuitas eximia illi præ cæteris inest. Quocirca usta ea utimur ad uirilignes, ephelin, lentes, & psoras. Quin & fossilis sali mista, in oculis existentes ungues, & sycofis uoca- tas eliquat. At anteq; uratur, dentibus splendore con- ciliat, & ulcera deficcet.

Opercula purpurarum.

Purpurarum
opercula.

EA quidam prodiderunt memoriæ turgidos lienes sanare; suffitu eas quæ uteri suffocatione periclitantur, iuuare;

iuuare; præterea retentos eijcere locos.

Lana succida,

I Donec excipit irrigationes, quæ adhibentur contu-
sis, aut quouis modo percussis, ut quæ utilitatē ex
illis proficiscentem promoueat; idq; propter cæsypon.
Lota uerò, apta est humoribus qui irrigantur, excipiē-
dis. Porro uista uim habet acrem, pariter et calidā, unā
cum partium tenuitate. Itaq; molles præhumidasq; ul-
cerum carnes celerrimè eliquat. Inditur & in medica-
men desiccatorium. Vrito eam tanq̃ alia plurima, ol-
lam implens nouam, quam tegat operculum multis fo-
raminibus pertusum.

Pili usti.

S Imiliter ustæ lanæ exalfaciendi exiccandiq; pos-
sident facultatem.

Ouorum facultates,

O Va partes animalium non sunt, sed proportionē
respondent ijs quæ agnascuntur. Sunt autem fa-
cta ad propagationē generis, perpetuitatemq; ac sunt
utilia, ceu nutrimenta. Porro ouorum album & tenue
illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est
medicamentorum mininè mordicantium. At unā pra-
uitatem solū patiuntur oua, quam scilicet affert uetu-
stas; eamq; facillimè effugias, si utaris recentibus. Est
autem ouum symmetro temperie frigidius. Utendum
autem est oui albumine, non tantū ad oculos, sed ad
alia omnia, quæ medicamenta requirunt suauissima;
ut sunt uniuersa sedis & pudendorū ulcera contuma-
cia. Miscetur quoq; idoneè medicamētis profluuium
sanguinis ex cerebri inuolucris reprimētibus, quæ ni-
mirum citra morsum illinuntur, astringuntq;. Cæterū
& ipse uitellus assimilis est naturæ, ac proinde miscet
ceratis morsus expertibus. Verū quanto plus defic-
cant quæ sunt assa oua, tanto minorem mitigandi uim
obtinent. Miscetur & cataplasmatibus phlegmonem ex-

Lanæ succidæ
usus.

Osypon.
Lana uista.

Lanam vtrūq;
ratio.

Pili vsti.

Ouorum facul-
tates.

Oui tēperies.

Albumen oui
quibus affectū
bus conferat.

Vitellus oui.

Ouo toto ad
quæ vitatur.

Ouū in aceto
percoctū, esum
q̄, dysenterię
auxiliatur.

Ambustis ouū
opitulator in-
positum.

Anacollemata

Ouum forbile
quibus conue-
niat.

Echinus.
Erinaceus.

Cochlex.
Limaces.

Dysenterię
optimum me-
dicamen.

tinguentibus. Iam uerò crudo toto ouo utimur admi-
sto rosaceo, ad palpebrarum aurium, māmārum, alia-
rumq̄; omnium partium phlegmonas. Adhæc, in ace-
to coctum ouum si edatur, uentris fluxiones desiccāt.
Quòd si etiam eorum quippiam, quæ ad dysenteriam
aut cœliacum affectum cōueniunt, adiunxeris, atq̄ in
igne modico, fumiq̄; experte frixeris, edēdumq̄; ita p̄-
beas, nōminimè sanè ita laborātes adiuueris. Ad am-
busta etiam ouum est, protinus impositum, utile, siue
quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana exci-
piat: siue etiam cum uitello confundens, comiscensq̄;
applicet. Mediocriter enī refrigerat, & citra morsum
desiccāt. Tale quū sit, & ad anacollemata uocata, quæ
fronti imponuntur, eo utimur, & pilos palpebrarū ag-
glutinamus: nimirum admisto idoneorum quopiam,
cuiusmodi est thus, potissimum pingue, ac non inuete-
ratum & siccum. Ouum igitur, medicamentis quæ hu-
miditates desiccāt, aut elixum, aut assum, aut frictum,
tanquam materia miscetur: ijs uerò quæ lentorem hu-
morum in pectore pulmoneq̄; incidunt, forbile: id q̄d
in aqua eo usq̄ elixari debet, donec incalascāt. Simili
modo sumptum gutturis, stomachi, uentris, intestino-
rum, atq̄; uesicæ medetur asperitatibus.

Echinus, hoc est, erinaceus combustus.

E Rinacei utriusq̄ tum marini, tū terrestis corpus
ustum, cinerem efficit facultatis tum extergentis,
tum digerentis, tum extrahentis.

Cochlex: siue limaces.

C Ochlex si totæ cum testis urantur, admista galla
omphacitide, simulq̄; pipere albo, mirè profunt
dysentericis, in quibus ulcera computrescere non cœ-
perunt. Conuenit autem ut piperis sit pars una: gallæ
uerò duæ: quatuor cochlearum. Hæc ubi ad unguem
læuigaueris, cibis inspergito, bibendumq̄; aut ex aqua
aut ex uino albo & austero, præbeto. Cæterum absq̄;

gallæ mistione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nonnihil ex ustione calidum. Porro cochleg quæ ustionem non sunt expertæ, si unâ cum testis tritæ imponantur, & toti uentri aqua inter cutem laborantium, & in articulorū tumoribus, ægrè quidem diuelli poterunt, cæterum impensè desiccant: uel si uiscidus crassusq; humor in alto contineat. Et sanè inhærere sinere oportet, donec sponte decidât. Idem faciendum in tumoribus ex ictu natis, difficile solubilibus. Carcini, hoc est cancri, usti.

Fluuiatilium cancrorum cinis, q̃p̃ similiter prædictis exiccatorius est: substantiæ tamen proprietate mirabilis est eius in ijs q̃ à rabiente cane sunt morfi, effectus: isq; tum solius, tum cū gentiana, & thure multo præstantior. At thuris partem esse unam oportet: quinq; gentianæ: cancrorum decem. Ex quo quidem medicamine Æschrion Empiricus, conciuus atq; preceptor meus, ijs qui à rabido cane emorfi fuerant, quotidie diebus quadraginta mensuram cochlearis magni cum aqua bibendam dabat. At si non protinus ab initio, uerū aliquot post dies, curâ cepisset demorfi, tūc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uerò uulnus applicabat emplastrū, q̃d ex pice brutia, opopanace, acetoq; cōficitur: habēs picis libram unā: aceti acerrimi sextarium unum Italicum: opopanacis uerò uncias tres. Hæc itaq; monita uolui de cancris, quum nullus eorum qui usi illo medicamento fuerunt, extinctus sit.

Chelidones, siue hirundines, ustæ.

Sed & hirundinum cinere permisto melli permulti utuntur, cōtra omnes affectus gutturis. Utuntur et ad acuendū uisum nonnulli hoc cinere. At alijs eas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent.

Tettiges: hoc est cicadæ.

Cicadis etiam nonnulli utuntur ad colicos affectus,

Carcini.
Cancri usti.

Galenī præceptor fuit Æschrion Empiricus.

Morfos a rabido cane curandi ratio.

Chelidones.
Hirundines uste

Tettiges.
Cicadæ.

cum paribus numero piperis granis. Alij assas edēdas offerunt, quibus affecta uesica est.

Corydos, Galerita.

Corydos.
Galerita.
Corydalis.

Galerita, auis illa pusilla, quæ in capite ueluti gale-
rum ex pilis habet conflatum, in iure elixa colicos
adiuuat, ueluti & ipsa herba corydalis appellata. Verū
assiduè eam simul cum iure esse est necesse.

Alectorides, Gallinæ.

Alectorides.
Gallinæ.
Gallorum ius.

Gallinarum ius simplex retinendi uim possidet, uti
gallorum subducendi. Concoquendi autem sunt
cum sale diuissimè.

Gale, hoc est mustela.

Gale.
Mustela.

Eius cinerem cum aceto illitum podagricos iuuare
est proditum; ipsam uerò arefactam prodesse co-
mitialibus morbis.

Ranæ ustæ.

Ranæ ustæ.

Ranarum inspersum cinerem sanguinis eruptio-
ni mederi referunt; cum liquida autem pice sana-
re alopecias.

Hippocampus.

Hippocampus

Huius etiam cinerē alopecijs prodesse est proditū;
facultatisq; exiccantis & extenuantis existere.

Tellinæ salæ.

Tellinæ salæ.

Salæ tellinas uistas, adeò urētem efficere cinerem
aiunt, ut is cum cedria euulsos radicitus ex palpe-
bris pilos, instillatus in locum, eos renasci prohibeat.

Intestina terræ, siue lumbrici.

Intestina terræ.
Lumbrici.

Contrita, neruisq; diuisis imposita, mirum in mo-
dum ea prodesse est proditum. Præterea cum ui-
no pota, medicamen esse mouendæ urinæ idoneum.

Cimices.

Cimices.

Eas cum aceto bibitas, eicere hirudines aiūt; quas
nos semper esu aliorum eiecimus.

Cantharides.

Cantharidarū
facultas.

Cum idoneis emplastris impositæ, adeò, scabros

lingues educūt, ut toti cadant. Præceptorum meorum quidam, earum nonnihil solet diureticis medicamētis inijcere. At nonnulli solas alas & pedes inijciunt: alij contra. Cæterum nos totas indimus. Porro aptiores sunt ex cantharides, quæ in uetg in frumēto, lutea trāuersim in alis cingula obtinent.

Cātharidas
gendi rano.

A Nimal est cātharidi tum specie, tum uiribus sise.

Buprestis.

E Pityocampe, Eruca picearum.

Eruca picearum.

Iusdem sunt facultatis.

Salamandra.

Salamandra.

S Alamandræ cinerem quidā septicis, lepricis, psoricisq; miscent facultatibus.

Narce, Torpedo marina.

Narce.
Torpedo marina.

S I applicetur uiua cui caput dolet, fieri potest ut dolore liberet, si r alijs quæ sensum obstupefaciūt.

Draco marinus, & Trigle, & alia id genus.

Draco marinus.
Trigla.

V Iuas etiamnum hasce animantes apertas, & protinus partibus affectis appositas prodesse traditū est.

Mus.

Nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum: similiter & Trigla in draconis: mures domesticos in ictum scorpij, ueluti & sauram: mygalem in suum ipsius & sauram chalcidicā, quam ex uino bibendam præbent, tanquā suum ipsius morsum sanet.

Porro scorpium suum ipsius morsum curare, si tritus imponatur, necnon si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs qui à uiperā sunt emorssi: ascalabotā uerò ijs qui à scorpio.

Saurā.
Mygale.

Referunt etiam et in Ægypti regionibus arefactum assiracum exhiberi ijs qui à scorpio percussi sunt: & uocatum cybiū utiliter uulneri à cane inflicto adhiberi.

Scorpius.
Ascalabotā.
Assiracus.

Cæterum in oleo frictis totis animalibus, ipso oleo utebantur nostratum Medicorum quidam: sed & superiorum nonnulli ad pilorum effluuiū: nempe pityocampis, urticis marinis, lepore marino, & scolopendro marino: ad aurium uerò dolorem, fil-

Cybius.
Pityocampe.
Urtica marina.
Lepus marinus.

Silphi.
Onisci.

phis in oleo coctis, & h̄s quos Græci oniscos, Latini
multipedes uocant.

Vulpes.
Hyæna.

Vulpes, & hyæna.

O Leum in quo elixa uulpes est, non est potentio-
ris in digerendo facultatis, q̄ in quo hyæna: quæ
si similiter in oleo elixetur, oleum ipsum lōgè potentis-
simæ facultatis in digerendo redditur. Talia autē me-
dicamenta uim habent ea quæ in alto corpore delite-
scunt, ad extimam cutē trahendi, atq; eo nomine quan-
doq; dolores sedandi. Quare qui utuntur uulpibus, &
ipsi oleum digestorium efficiunt, atq; inde impletis eo
alucolis, totos arthriticos in eos demittunt, multo tem-
pore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, ut non tantū
qui circa articulos sunt tumores uacuentur, sed etiam
uniuersum corpus. Vnde certè magnum consequitur
cōmodum, quum nihil p̄terea amplius in affectas par-
tes sit defluxurum, nimirum euacuato iam corpore.

Oleū vulpīnū
summe auxili-
liari morbis ar-
ticularibus.

Adarcion.

Adarcion.

E ssentia quidem sua ueluti spuma est aque salse cō-
creta, id q; circa arūdines & sarragines. Est autem
acerrimum, simulq; calidissimum pharmacum: proin-
de & per se inutile. Verū cōmisceri solet h̄s quæ uim
eius retundunt; sicq; fit multo utilissimum in h̄s affecti-
bus, qui exalfieri postulant, foris impositum. Nam id
intra corpus sumi impossibile est.

Alcionionū fa-
cultates et dif-
ferentiæ.

Alcyonia.

A lcyonia omnia detergunt, ac digerunt, qualitatē
habentia acrem & calidā. Est autem eorum unū
densum & graue, odoris prauī. Olet enim pisces putri-
dos, spongiæ in specie simile. Alterum uerò figura lon-
giuscula, leue, & rarum, odorem habens similem phy-
c̄is. Aliud tertiū uermi simile specie existit: colore pur-
pureo, consistentia molli: uocāt id Milesium. Post quæ
quartum secundo quidem iam posito similiter & leue
& rarum, uerū lanis succidis simile. Deniq; et quin-

rum extrema superfice læui, cæterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre. Quod sanè omnium alcyoniorum est calidissimum, adeò ut pilos deurere possit. Itaque quum duo prima lichenas, alphas, psoras, leprasque adiuuent, præterea cutem splendidiorem efficiant, idem præstare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim proinde ut illa cutem duntaxat summam extergit, sed etiam ex coriat, ita ut ulcera inducat. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium tenuissimum est. Quare uestum alopecias curat illicitum cum uino, colore quidem fuluo, tenui tamè essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei, uires obtinet, uerum haud parum imbecilliores.

Sal.

S Al eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: uerum hoc differunt, quod salis est terra effossi substantia magis compacta sit, ac proinde in eo maior partium crassities, et astringendi potentia. Marinus itaque affusa aqua liquescit protinus, id quod non accidit fossilis. Eiusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam saluginosis nascitur: æstate uidelicet aquis ex his æstu absumptis: cuiusmodi est Tragalius, non procul à Sminthio. Igitur quum qualitas salsa digerat simul & contrahat contactam ab ipsa substantiam, aphronitrum in hoc differt, quod in ipso unum saporem exuperantem sit uidere, quem uocant amarum, uim habentem digerendi: haud item contrahendi, uti sal. Nam hic, quicquid in corporibus humidum est, id totum absumit: et quod reliquum est substantiæ solidæ, astrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua carnes seruat, à putredineque tuetur. Quippe quæ putrescunt, excrementum humorem continent, substantiamque tum dissolutam, tum minimè compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum uest supflua humiditas, ceu melli optimo, & substantia solida & compacta est, ut lapidi.

Salis differentiæ

Salsæ qualitatis facultas, Aphronitrum.

Salis facultas.

Putrescentium substantia.

Putrescere quæ nullo modo possunt.

bus, ea ut putrescant est impossibile. Quare in his salis non probatur usus: sed in illis tantum, in quibus suspecta est putredo. Sal ustus.

Sal ustus.

Digerit quidem potentius, quam ustionis expers, quanto scilicet subtilius ipsius corpus, accepta ab igne facultate, redditur.

Litrum, Nitrum.

Litrum.
Nitrum.

Ostensum est hoc medicamen in medio salis & aphronitri vires habere.

Halos anthos, Flos salis.

Halos anthos,
Salis flos.

Liquidum est medicamen, tenuiusque quam sal ustus: præterea qualitaris acris, facultatisque admodum digerentis.

Halos achne, Spuma salis

Halos achne.
Spuma salis.

Spumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris naturæ, quam ipse sal. Quare & extenuare, & digerere quam ille multo plus potest. Verum quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit.

Asphalton, Bitumen.

Asphalton.
Bitumen.

VNum & ipsum est ex his quæ in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam quæ non est marinæ dissimilis, ut in Apollonia Epiri, ubi reperitur hoc medicamen in aquis sponte nascētibz, ueluti spuma quædam innatans. Quo sanè tempore est molle: postea uerò resiccatur, pice sicca durius efficitur.

Bitumen proueniens in mari mortuo.

Bitumen quod
in mari mortuo
nascitur.

Optimum uerò bitumen in mari quod mortuum uocatur, prouenit. Cuius medicaminis uis est tum resiccatoria, tum excafactoria in secundo excessu. Merito itaque utuntur eo ad cruentorum uulnerum glutinationem, & ad alia omnia quæ exiccare debent, ceu modica excafectione.

Spongos, Spongia.

Spongia usta.

Spongia usta, acris est & digerentis potentiæ. Veteratur ea præceptorum meorum quidam, ad sanguinem

his eruptiones, quæ manuali opera indigent. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiãnum ardentem, ut & crusta parti induceret, & ipsum spongię corpus, ceu operculũ adhæreret. At uerò spōgia noua, nō sicut lana aut lanimentũ, materia dūtaxat est, q̃ humores irrigãdos excipiat, sed etiam manifestè desiccat. Quare uulnera glutinat, si aqua, aut oxycrato, aut uino admoveat imbuta, à qua sanè, quæ antiqua est, longo spatio relinquatur.

Garus.

F Acultatem habet admodum calidam atq; siccam. Proinde eo quidam ad ulcera usi sunt putrescētia: tum dysentericis ischiadicis q; inijciunt.

Halme, Salsugo.

S Imiliter garo ad putredines accōmodatur: & ad ischiadas & dysenterias inijciūt. Etenim acrimonia sua humores coxam infestātes attrahit: ob idq; per intestina euacuat: putrescentia uerò ulcera in dysenteria colluit, & siccat. Maximè tamen salsugine salforũ silutorum & mænidum ad talia Medici utuntur.

Spongia ardē,
tent auxiliari
eruptionibus
sanguinis.

Garus

*Idem asservit
3. in alimant.*

Halme.
Salsugo.

G A L E N I L I B E R

DE SVSTITVTIS.



SVBSTITVTĀ medicamentā dicuntur, quæ in alterius locum substitui possunt: quorum sanè cognitio, plurimum ad medendi usum confert. Plerumq; siquidem destituti Medici hīs quæ ad morbum exterminandum maximè expedire arbitrantur, neq; expēdentes ea quæ similem ferè uim obtinentia, uicē illorum assumi possunt: ægris opitulari nesciūt. Quod ne tibi aliquando contingat, en subdimus omnia pharmaca substituta, ordine literarum disposita.

Pro

Substitues

A Abr otono
 Absinthio
 Acacia
 Acoro
 Ærugine
 Amianto
 Agallocho
 Agarico

Alga
 Aloe Indica

Alumine
 Ammi
 Ammoniaco thym.
 Ammoniaco sale
 Amomo
 Amylo
 Amygd. amar.
 Anchusa
 Aniso
 Arace
 Aristoloch. rot.
 Argemone,
 Armenio lapide
 Asbesto
 Aspalatho
 Asphodelo
 Asaro
 Asio lapide

Auripingmento

Origanum.
 Abrotonum.
 Succum lentisci.
 Radicem asari.
 Atramentum sutorium.
 Aphronitrum.
 Calamum odoratum.
 Euphorbium, aut epithy-
 mum.
 Anchusam.
 Aloes uiridis folia, folium,
 uel glaucium, uel fimum
 ibis, uel Lycium, uel cē-
 taurium.
 Salem fossilem.
 Anisum.
 Propolim.
 Cappadocum salem.
 Acorum.
 Gyrin siccam.
 Absynthium.
 Hyacinthum.
 Daucum.
 Sefamum.
 Aristoloch. long.
 Sifymbrium.
 Atramentum Indicum.
 Adarcem.
 Ericis semen, aut uiticis.
 Succum betæ.
 Zingiber.
 Gagatem, aut salem Am-
 mon. tostum.
 Sandaracham.

Pro

Sustitues

Balaustio	B	Malicorium
Bdellio		Sphagnum odoratum.
Bitumine		Picem Brutiam hum.
Brutia pice		Picem in aceto feruefactā.
Buccina		Ostreum.
Bupresti		Laser, aut hirudinem.
Butyro		Lac bubulum coactum.

Cadmia	C	Leucographin Ægyptiā.
Calamo odorato		Sphagnum.
Canchri		Baccas lauri.
Cantharidibus		Phalangia.
Capparis radice		Ericæ radicē aut myricē.
Cardamomo		Fructum myrti.
Cassia		Cinnamomi dimidium.
Castorio		Silphium.
Cedria		Ladanum.
Ceraunio		Leucographin.
Ceruina adipe		Anseris adipem.
Cera		Fabam fresam cum propo li coctam & tritam.
Cerui cornu,		Caprinum.
Cerussa		Scoriam plumbi.
Chalbane		Sagapenum.
Chamædry		Lapathi radicem.
Cicuta		Semen coriandri.
Cinerula Cypria		Cienerem fol. oliuæ.
Cinnabari		Rosaceos pastillos.
Cinnammomo		Cassiae duplum.
Clinopodio		Heliotropium.
Cnico		Vitidis semen.
Colocynthide		Ricini semen.
Colophonia pice		Apochyma.
Corallio		Moly, aut symphytum.

Pro

Substitues

Costo
 Cotiledone
 Crinanthemo
 Croco
 Crocomagmate
 Crocodili adipe
 Cumino
 Cynosbato
 Cyperi
 Cyphi

Cedri fructum.
 Anagallin.
 Aphrodisiam.
 Crocomagma.
 Agallochum Indicam.
 Canis marini adipem.
 Brassicæ semen.
 Solani uesticariæ semen.
 Iuniperum magnam.
 Caricam ustam.

D Damasonio
 Dauci semine
 Dictamno
 Diphryge
 Dorycnio
 Dracontio

Eryngium.
 Sij semen
 Saluiam.
 Phrygium lapidem.
 Alterci semen.
 Aron.

E Ebena
 Ebisci radice,
 Elaterij succo
 Elleboro nigro
 Enneaphyllo
 Epithymo
 Ericis fructu
 Erini folijs
 Erucæ semine
 Erucis pini
 Erysimi
 Euphorbio
 Eupatorio

Loti arb. lignum.
 Folia mori.
 Eiusdem herb. succum.
 Papyri radicem.
 Potamogitonem
 Colocynthis semen.
 Gallam immaturam.
 Stercus ibis.
 Erysimi semen.
 Vespas cum cedria.
 Struchij succum.
 Stercus columbæ agrestis.
 Chamæpityn.

F Felle camelli
 Felle mustelæ

Fel Ascalaboti.
 Fel cameli.

Pro

Substitues

Felle hyanæ

Fel perdicis.

Felle uiperæ

Fel ichneumonis.

Flore æris

Squammam æris.

Galla

G

Palæstræ sordes.

Gentiana

Radicem apij odorati.

Glycyrrhizæ succo

Mori succum.

Hederæ succo

H

Perseæ succum.

Hedychroo

Amaricinum.

Hyacintho

Flos Isatidis.

Hyenæ adipe

Vulpis adipem.

Hyoscyamo

Solani uesticariæ semen.

Hippuri

Aiugam.

Hyperico

Anethi semen.

Hypocisthide

Acaciam.

Hyssopo

Thymum.

Iri illyrica

I

Helenium odoratum.

Iunco odorato

Cardamomum.

Iunco palustri

Polygoni radicem.

Lapathi radice

L

Pyrethri radicem.

Lapide Phrygio

Lapidem argyritem.

Lapide Asio

Gagatem lapidem.

Lapide pyrite

Lapidem pyrobolon.

Lauri baccis

Serpillum aridum.

Lathyri

Granum Cnidium.

Lentisco

Terebinthum.

Lepidio

Rubiam.

Lepidij radice

Folia capparis.

Lepore marino

Leporem fluuialem.

Lini semine

Fabulum.

Loti semine

Betæ semen.

Pro

Substitues

Lupi adipe

Vrsi adipem.

Ligustico

Pastinacæ semen.

Lysimachio

Spinæ Ægyptiæ semen.

M

Magnetē

Hematitem lapidem.

Malabathro

Nardum Indicam.

Malo cydonio

Melilotum.

Malua

Fœnumgræcum.

Mandragora

Dorycnium

Manna

Thuris corticem.

Mastiche

Lentisci caulem.

Medulla cerui

Vituli medullam.

Meliloto

Lotum herbam.

Melle

Sapam.

Melle Attico crudo

Mel despumatum.

Mæo

Myrobalanum.

Myrsinite

Succum mori.

Molybdæna

Lithargyron.

Mori succo

Rubi folia.

Myrobalano

Glaucium.

Myrrha Trogloditide

Calamum odoratum.

Myrti oleo

Mori succum.

Myfi Cyprio

Ochram Cypriam.

Myfi tosto

Diphrygem.

Nardo Syriaca

Iuncum odoratum.

N

Napi

Rapæ semen.

Nepita

Agrestem mentham.

Nucleis pineis

Cucumeris semen.

Nuce pinea

Gallam.

O

Ochra

Myfi Cyprium.

Ocymo

Sisymbrium.

Ocymoide

Mentam agrestem.

Oenanthes succo

Vitigineum succum.

Pro

Substitues

Oesypo
 Oleo Cicino
 Oleo ueteri
 Oliuæ lachryma
 Omphace,
 Opobalsamo
 Opopanace
 Oryza
 Orminio
 Ormithogali,

Vituli medullam.
 Laurinum aut uetus oleū.
 Feruēfactum duplum.
 Hypocisthidis succum.
 Gallam immaturam.
 Guttam myrrhæ.
 Lac fycamini.
 Farinam hordei.
 Lini semen.
 Anthyllin.

Papaueris succo
 Phu
 Pipere
 Pipere albo
 Polij semine
 Polypodio
 Polytricho
 Pompholyge
 Populi gemmis
 Propoli,
 Psyllio
 Punice
 Pyrethro

P Mandragoræ succum.
 Sphagnon.
 Zingiber.
 Nigri duplum.
 Erucae semen.
 Chamæleonis radicem.
 Absinthium.
 Cadmiam ustam.
 Sampsuchum.
 Ladanum.
 Lentem palustrem.
 Terram Creticam.
 Zingiber.

Quercus uisco

Q Chamæleonis uiscum.

Rapa
 Raphanino oleo
 Resina pini
 Roseis pastillis
 Rosis siccis
 Rhu Syriaco
 Rubigine

R Heliotropium.
 Ricini oleum.
 Terebinthinam.
 Sinopidem.
 Perseæ folia sicca.
 Oxycanthæ fructum.
 Squammam ferri.

Pro

Substitues

S Sagapeno	Resinam pini siccam.
Saluia	Calamintham.
Salamandra	Lacertam uiridem.
Sale ammoniaco	Salem Cappadocium
Sambuco	Spinæ uiridis folia.
Sampsucho	Rhus coquinarium.
Santonico	Abrotonum.
Satyrio	Erucæ semen.
Scammonio	Ricini semen.
Scylla	Bulbum esculentum.
Scoria plumbi	Plumbum productum.
Scoria Cypria.	Melanteriam egyptiam.
Semperuiuo,	Lactucam.
Sepiæ crusta	Punicem.
Sesamo	Lini semen.
Sesamoide	Amaranthi cremorem.
Sinapi	Nasturtium.
Sisone	Anisum.
Sisymbrio	Ocymum.
Solano uescicaria	Semen solani hortensis.
Sphagno	Juncum odoratum.
Spondylis	Folia oliuæ.
Stercore uulturis	Columbinum stercus.
Stercore turturis	Stercus columbi
Stercore felis.	Ichneumonis stercus.
Stibio	Æris squammam.
Struchij radice.	Ellebori nigri radicem.
Succo calpasi	Succum myrti.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succum.
Succo rhododaphnes	Viscum quernum.
Succo cyrenaico	Syriacum succum.
Succo papaueris	Mandragoræ succum.
Succo falicis	Hederæ nigræ succum.
Succo gallæ	Succum mori.

Succo

Pro		†Substitutes
Succo panacis		Lac fysamini.
Succo polygoni		Succum plantaginis.
Sulfure uiuo.		Sandaracham.
Symphyto		Centaurium.
Seri		Lithargyrum.
Terra Samia	T	Leucographem terram.
Terra crethria		Calcem Thebaicam.
Terra alana		Plumbaginem.
Terra asteri		Cimoliam.
Terebinthina		Mastichem.
Thapsiæ succo		Chamæleonis nigri succū.
Thymo		Satureiam.
Tithymallo		Chamæleon.
Thure		Ampelitin terram.
Veruenaca	V	Chamæleucem.
Viola		Florem radiculæ.
Vino rhodio		Austerum uinum.
Vino Falerno		Vinum Mendesium.
Visco quercino		Chameleonis albi uiscum.
Vulpis adipe		Vrsinum adipem.
Vulturis stercore.		Columbinum Stercus.
Vua domestica		Pulpam palmularum Syriacarum.
Xylobalsamo	X	Radicem uiolarū albarū.
Zingibere	Z	Pyrethrum.

F I N I S.

Tomus IIII.

Qqqq

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera Liber Primus.



*Pacis delubrū
cōflagrasse eli,
et cū eo biblio
thecas palatij,
& nōnullos cō
mentarios Ga
leni.
Sophistas ex
terminandos
esse.*

QVANDOQVIDEM ex com-
mentario quem iam pridem de com-
positione medicamentorum conscri-
psi, priores duo libri, qui exierant, in
lucem, unā cum alijs in apotheca, que
ad uiam sacrā est, perierunt: dum Pa-
cis delubrum totum, & ingentes Palatij bibliothecæ
maximo conflagrarunt incendio: equidem amicorum
precibus uictus, cogor nunc illos eosdē recudere: idq;
ab eodem initio auspicatus, à quo in illis exorsus fue-
ram. Siquidem statim in auspicijs primi cōmentarij
monebam, esse exterminandos sophistas, qui traditio-
nem medicaminum cōpositorum è medio tollunt: nō-
nullisq; simplicium peculiare quasdam facultates in-
esse inficiantur: eos etiā excipientes scōmate, qui de il-
lis aliquid prodiderunt. Qui quidem adeò uires medi-
camentorum ignorant, ut nesciant prorsus, à marino
lepore pulmonem solum exulcerari: uesticam solam, à
cantharidibus. At uerò Empirici cognoscunt quidem
ex ærugine cerato simplici admixta, confici optimum
sarcoticum medicamē: tametsi neutrum eorum per se,
carnem gignere possit: qua autem ratione id contin-
gat, ignorant.

*Sarcoticū opti-
mū confici ex
ærugine cera-
to simplici ad-
mixta.*

Sunt igitur uires medicamentorū simplicium, non
generatim tantū, sed particulatim etiam inuestigan-
dæ. Siquidem non sat est nosse hoc pharmacum calfa-
cere, nisi etiam quo gradu id efficiat noris. Calfaciunt
quippe resinæ omnes: attamen maioris minorisq; ra-
tione plurimum inter se earum calores differūt. Atqui

*Resinæ omnes
calfaciunt.*

in curatione particulæ impensè refrigeratæ, medicamē admouebimus admodum calfaciens: illi uerò quæ paululum ab habitu naturali recessit, calore modico præditum. Meritò itaq; nos quatuor excalfaciētium ordines statuimus, separantes à modicè calidis ea quæ euidenter eiusmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna: tum quæ uehementi adedò, ut urere iam uideantur: atq; in singulis hisce ordinibus latitudinem momentaneā constituētes: similiq; in excessibus reliquarum qualitatum, ratione. Porro medicamētorum materiæ, quædam sanè à plantis: quædā à metallis: nonnullæ ab animalibus proficiuntur. Iam uerò, præter simplicium omnium medicaminum facultates, omnium etiam præter naturam affectuum differentias ad unguem nouisse expedit. * Quippe primus curationis scopus à morbificis dispositionibus nascitur: cum quibus simul indicat curationem natura particulæ affectæ. Sed aeris etiam nos ambientis temperiem, constitutionemq;: præterea ætatem, tempus, regionem, uitæ studia, & mores, multi præstantissimi Medici unā cum illis inspicunt.

Ergo si simplicibus tantum medicamentis, uniuersos præter naturam affectus curare liceret nobis, nunquam egeremus compositis. Quum autem sæpe numero aliquatenus calfacere corpus uolētes, simplex nullum, quod præstare id possit habeamus, ex uarijs unum conficimus medicamen, quod eodem, quo affectus, gradu, à mediocritate recedēs, id quod ex usu est, moliatur. Taceo nonnulla simplicia, citra alterius medicamenti miscellam, nō posse adhiberi in emplastrū: alia, nisi retūdant, aut mitigent, administrari nō posse. In morbis etiā q cōtrarias simul facultates desiderāt, ut repellendi et digerēdi: detergendi ac læuigandi: uel attenuādi simul & incrassandi humores: maximus cōpositionis medicamentorū est usus: nec secus ubi uni.

Calfaciētū ordines quatuor, quos etiā reperire est in cæteris qualitatib;

Medicamentorū materiæ vnā deificatur.

Scopus curationis primus à morbificis dispositionibus nascitur,

Cōpositis medicamentis curamur.

cum medicamē habere cupimus, qđ multis uenenum
eiaculātibus feris, ac pharmacis exitialibus aduerset.

Phoenicini
pharmaci com-
positio et usus.

Quum autem oleum uetus & adeps, uim digeren-
di sortiantur: chalcitis autem & palmę succus, repel-
lendi, astringendiq;: ex his ipse pharmacum phœni-
cinum dictum composui, glutinandis ulceribus, cica-
trice obducendis, & phlegmonis curandis accommo-
dum; quo iam complures utuntur. Etenim ratio com-
positionem inuenit: experientia, de inuentorum uirtu-
te decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithar-
gyrus, donec consistentiam consequatur emplasticā.
Adeps porrò ipse sit tum insulsus, tum uetus: quemad-
modum etiam oleum: quę sanè quo uetustiora fuerint,
eo digerent promptius, phlegmonēq; diuturniori atq;
contumaciori erunt magis accommodata. Verūm ad in-
cipientes atq; augescentes phlegmonas, ut quas astringe
atq; refrigerare oportet, præstat emplastrū ipsum
ex uino, uel aceto, uel aqua, uel oleo imaturo, uel astringe
gente, liquare. Cōmunis autem compositionis modus
est talis. Vetus adipis, lib. ij. Olei ueteris, lib. iij. Li-
thargyri, tantūdem. Chalcitidos, ꝑnc. iij. Liquato adi-
pi reliqua eleganter atq; artificiosē misceantur, ferue-
scantq; simul, ac rudicula palmę uiridi & succulentā
moueantur, donec sibi emplastri consistentiā contra-
xerint. Quo quidē medicamine, ad ulcera quę non fa-
cilē cicatrice obducuntur, & ad cruenta est utendum.
Auxiliatur etiam inflammationibus, articulorum mor-
bis, bubonibus, phymatis, ambustis, pernionibus, fra-
cturis, contusionibus, rheumaticisq; uniuersis consti-
tutionibus, cuiusmodi plures solent Romę inualesce-
re. Cæterū in phlegmonarum principijs uim repul-
soriam esse ualidiorē oportet: in incrementis uerò, hæc
imminuenda: quę digerit uirtus, augenda est. Vigen-
te phlegmone, pares inuicem esse conuenit facultates,
nisi uehemens dolor, pharmacum leniens requirat. Ac

Romę inuale-
scere cōplurēs
dispositiones
rheumaticas.
Phlegmonarū
curatio.

inclinante phlegmone, uim digerēdi augebis. Qua ex
 methodo licebit tibi secundum uarias indicationes uti
 p̄dicto emplastro uarijs oleis, atq; succis liquato. Ego
 uerò ad phlegmonas erysipelatodes soluto ipso ex ro-
 faceo utor. Cui etiam, si æstas fuerit, uuæ acerbę simul
 & portulacę, uel semperuiui, succum immisceo. Quip-
 pè uuæ acerbę liquor per se, plus q̄ oportet, astringit:
 tanta autem astrictio lædit erysipelata: ut quæ calorē
 ipsorum, cutē densando, includat. Igitur in exactis ery-
 sipelatis, ea quæ aduentitia sua frigiditate auxiliantur,
 ubi cœperint incalescere, sunt mutāda. Postea uerò q̄
 incendium cōquieuerit, aut si nec perfectum planē ab
 initio erysipelas fuerit, * haud amplius ascititiam fri-
 giditatem desyderabimus: uerūm ijs succis diluemus
 phœnicinum emplastrum, qui moderatē refrigerent.
 Ab his iam & lini seminis, & chamemeli succum mi-
 scebimus: ipsoq; solo, sed fuso postea utemur empla-
 stro: nihil aliud illi miscentes. Quòd si quādo liuidum,
 ob refrigerantium usum, erysipelas ipsum euaserit: so-
 lum phœnicinum emplastrum, ueteri oleo liquatum, id
 discutere potest: quo tempore partes liuidę, aqua fouē-
 tur calida, atq; etiam scarificantur. Sunt qui calcis uiuę
 nonnihil ipsi pharmaco immisceant. Intrepidē itaq; in
 rheumaticis affectiōib⁹ hoc utitor medicamē: utpote
 quod tum astringat, tum digerat, tum robur particula-
 rum confirmet. Etenim non semper ob calorē immo-
 dicum fluxione affliguntur particulę. Sæpe siquidem
 ob propriam imbecillitatem, quæ ab intemperie frigi-
 gida ut plurimum proficiscitur, tali corripuntur affe-
 ctu. Quare si humectet eas quispiam, calfaciatq; medi-
 camenti laxatibus, dissolutę prorsus & imbecillę fiēt.
 Sin tumores uehementer astringat, initio quidem, iuua-
 re uidebitur: ceterū quod ex eis reliquum est, contu-
 max atq; scirrhosum reddiderit. Sed neq; id genus di-
 spositiones ferunt nimis astringentia medicamenta:

Omphacii fa-
cultas.

Erysipelatis
curatio.

Liuentis ery-
pelatis curatio

Emplastri phœ-
nicini facultas

Fluxionū cā.

**Dolor inflāma
ta exasperat,
fluxionibusq;
occasione præ-
bet.**

ut à quibus dolore & tensione affligātur. Atqui omnis dolor, inflammata exacuit, iritatq; & fluxionibus occasione præbet, uel si rheumatica intemperie æger non afficiatur.

**Lithargyri fa-
cultas.**

Sunt autem complura medicamenta, quæ phar-
ma-
co cui miscentur, uim nullam, aut per exiguam exhi-
bent: cōmoditatem uerò materiæ præstant, ut uel em-
plastri, uel cerati speciem referat. Atq; ex eorum san-
e
genere existit argenti spuma: nullā insignem possidēs
facultatem, præter siccandi modicam. Qua ratione at-
trita femora ex itinere adiuuat. Est autē ex ijs pharma-
cis quæ liquefieri possunt, etiam argenti spuma, quam
Græci lithargyron uocant: ut chalcitis quoq; & misy.
Cæterum chalcitis quidem omnium celerrimè fundi-
tur: tardissimè argenti spuma: at in horum medio æru-
go & misy consistūt. Porro candidū medicamē, quo

**Chalcitis om-
niū celerrime
funditur.**

**Candidū medi-
camē Galeni.**

ad parua ulcera utor, ex oleo, aqua, & argenti spuma,
conficitur: ita ut libris duabus aquæ, tres q̄ purissimi,
splendissimiq; olei, totidemq; spumę argenti inñcian-
tur. Debent autem simul coqui ad ignem minimè fu-
midum, idq; in loco sub dio atq; soli exposito. Siquidē
ut aer nubilus pharmacum ipsum denigrat, sic synce-
rus ad candorē eius plurimū confert. Hoc autē fiet glu-
tinātius id medicamen, quo plus liquoris indideris.

**Aerem nubilū
denigrat phar-
maca, syncerū
conferre ad eo-
rū candorem.**

**Aquæ propria
facultas.**

Aqua etenim substantia ppria semper humectat,
refrigeratq; . At oleum si recens sit, pharmaco mi-
nimè reluctatur. Permanet itaq; humidum, ac mo-
dicè frigidum: quali maximè tenera corpora & caco-
chyma indigent. Ergo huiuscemodi emplastrum, pru-
ritus, desquamata, & ut uno uerbo expediā, ulcera exi-
gua p̄sanat: utpote exulceratis partibus ne quid isfluat,
impediens: & quod iam influxit, denuo ad partes cir-
cumstantes retrudens. Aduerte autem, nullum hume-
ctans nec propria ratione, nec ex accidenti esse ulce-
ribus utile.

**Cādidū empla-
stri Galeni fa-
cultas.**

**Vicribus ni-
hil humectans
est uile.**

Conficitur etiam pharmacum id ex oxelæo & lithargyro. Cæterum medicamen mediocriter siccans fit, si utriusq; nempe olei & aceti, duplo maior portio quam argenti spumę misceatur. Copiosior uerò duplo utriusq; mensura, ualentius facit pharmacū. Ipse enim triplam utriusq; nonnunq̃ miscēs, tota die medicamē coquere soleo. Atq; hoc sanè modo confectum, colore atro splendet, maximaq; siccandi potētia pollet: ita ut curet ulcera contumacia, cruenta glutinet, fistulasq; in callum non induratas, adducat, ac breuiter, citra morsum exiccet.

Ex ænelæo etiam lithargyroq; similiter medicamē paratur. Equidem per æstatem sub sole ardenti, ex uino Falerno, aut alio tenuium partium, lithargyrum contere soleo, idq; continuis quindecim diebus. Quibus exactis, medicamen ipsum exiccans, repono: quo postea ex oleo soluto, in rheumaticis affectibus utor: necnon ad uulnera glutinanda.

Cruda itaq; ac per se, argēti spuma, attritiones corrigit. Ex aceto autem aut uino trita, siccataq; , ulcerum quæ ob humiditatem ægrè cicatricem recipiunt, remedium fit. Quòd si ipsam cupis rosionis expertem, elota utitor.

Ac minimum quidem rosionis exhibet, si uino uel aceto abluatur. Conuenit tamen curiosè toto die contritam, cum liquore per noctem relinquere: quem postero die mane effundemus, alium denuò instillantē, ac postea rursus tundētes: id quod singulis diebus facere sub feruenti sole (hoc enim sit commune præceptū in lapidosis omnibus) minimè desistemus, donec unā cum humore ceu quidam flosculus ipsius argenti spumæ cernatur.

Quæ ex lithargyro componuntur, fieri possunt etiā ex molibdana. Cæterum molibdana substantiæ crassioris, ac frigidioris quam lithargyrus est: ac medi

Lithargyri p̃parandi ratio.

Lithargyri facilius cultas.

Lithargyrus reddit expert rosionis, si ex uino uel aceto abluatur.

Lapidosa oīa quę abluimus, sub ardēti sole sunt ex humore aliquo læuīganda.

Molibdænē facilius cultas.

camenta quæ ex ipsa parantur, cineritia redduntur. Quum igitur discutere quid uolueris, lithargyro potius quàm molibdæna utitor.

Cerussæ usus.

At cerussam uel coloris causa ad emplastra candida conficienda Medici lithargyro immiscunt: uel ut quandam astringendi refrigerandiq; uim medicamento concilient. Sed resinam etiam inmiscere assolent,

Terebinthina.

quo sequax ac sibi continuum fiat pharmacum. Verum quum mitissimæ omnium resinæ sint tum terebinthina ipsa, tum illa quæ larix dicitur, has miscere præstiterit, dum conficere tale medicamen est animus. Multo etiam leniora tactu omnia fiunt, tum quæ resina consistat,

Larix.

Ceræ abluendæ ratio.

si ceræ quid adijciatur: tum quæ ex cera, si modicum resinæ recipiant. At candido emplastro alba cera desyderatur. Quam, si sponte sit nata, prius abluere oportet: nimirum liquâtes ipsam, ac mox in aqua fontis mergentes, commouentes, & repurgâtes: qua ratione etiam pix, resina, & physema, abluenda sunt.

Vlceribus incipientibus potiora esse astringentia.

Vbi igitur cerussæ, spumæq; argenti, adeo præcoctis, ut minimè inficiant manus, cera simul cum resina fuerit admixta, candidum emplastrum habebis: cui aquam aut oleum miscere poteris. Ex oleis autem, Omphacinum, Hispanicumq; pharmaco uim astringentioriam adijciunt. Histricum uerò cum exigua astringentione quoddam amaritudinē refert. Atqui principio ulceris, finiq; potiora sunt astringentia: dulcia autem in mediis.

Anodynū pharmacum.

Thus carnem gignit.

Laxantia plenius et cacochymis admota, fluxum ad affe-

Pondus ergo huiusce emplastri sit tale. Cerussæ, lithargyri, singulorum lib. j. Olei, lib. ij. Cere, lib. s. Terebinthinæ, vnc. ij. Quibus omnibus licebit tantum thuris, quantum & terebinthinæ, aut etiam dimidiam portionem addere. Qua industria medicamen maximè anodynum reddet: sed ad cicatricem inducendam ineptius: quandoquidem ex ipsius usu caro ulceri excrescet, quum thus sit facultate sarcoticum. Taceo laxantia medicamenta corporibus plenius & cacochymis admota, fluxum

zum ad affectas partes citare. Satius itaq; fuerit, tū ad cicatricem inducendam, tum ad digerēdum exactius, aluminis scissilis, candidiq;, vnciam unam: piperis semunciam miscere.

Candidi ex pipere medicamenti, quod ad senum ulcera, & eorum qui mollem sortiuntur cuticulam, persananda est efficax, quodq; refertur ad Attalum Regem nostrū, qui olim Pergamenlibus imperabat, cōpositio habet in hunc modū, Argenti spumæ, cerussæ, sing. lib. j. olei, lib. ij. ceræ, lib. s. terebinthinæ, vnc. ij. thuris uel tantūdem, uel media pars. aluminis, drach. vj. piperis, drac. ij. Verūm apud Romanos, librari quidem dicuntur solida: ut mensurari humida. Metallica in primis sub sole coquuntur, donec duriusculā consistentiam adipiscantur: quibus reliqua postea misceri debent artificiosè. Hoc pharmacum ulceribus humidioribus, atq; abrasis medetur.

Alba quæ oleo recēti & aqua citra piperis atq; thuris misturam confici docuimus, uehementer commorfas partes offendunt. At minus illis Attalicum lædere solet: eo q̃ terebinthina, oleum uetus, thus, & piper adiecta sunt. Ad commorsa nāq; minimè alumen conducit: quum opus hīc sit non astringentibus, sed abundè extrahentibus ea quæ in alto nervos punctos affligūt, & uenenatam animalium saluam. Distinguenda autē sunt cacoethe ulcera, ab ijs quæ non faciliè ad cicatricē perueniunt: quum non omnia cacoethe ulcera ægrè cicatricem admittant. Porro si blandius medicamentū, ad sedandūq; dolorem cōmodius, conficere uis, aliquid adipis anserini, uel gallinacei, uel porcini immiscbis. Sic nāq; magis anodynum effeceris: minus tamē idoneum cicatrici inducendē. In uniuersum autem, nemo probè uti possit medicamento composito, qui simplicium uires prius non accuratè didicerit.

Aliud albū Andromachi, Lithargyri, cerussæ, sing.

has partes cōciliant.

Attalus Rex Pergami, patriæ Galeni. Candidi ex pipere cōpositio

Librantur solida. Mensurantur humida.

Cōmorfas quæ conueniāt medicamenta.

Cacoethe ulcera nō oīa dysepulotica esse.

Compositis recte nemo uti poterit, q̃ simplicium uires prius non didicerit.

Candidum Andromachi.

Minam Atticam. j. ceræ partem quartam. resinæ terebinthinæ tantundem. olei heminas. iij. aquæ heminas duas. conficito. Nonnulli porrò vncias. xx. minam cōtinere tradunt. Nonnulli sedecim. Atqui miret quispiam quomodo Romæ degens, pro libris nominari heminas. Cui urbi sunt familiaria uocabula libra, sextarius, & vncia. Ex multis autem medicamentis iā prius dem conscriptis, prius q̃ potentia Romanorum usq̃ adeò creuisset, sum coniectura assequutus, quam illi uocarent heminam, fuisse æqualem nouē vncijs vnius libræ Romanæ. Aliud album Andromachi.

Heminā fuisse æqualem nouē vncijs libræ Romanæ.

Candidū aliud Andromachi.

Argenti spumæ drach. clx. cerussæ drach. cc. ceræ, drach. 50. terebinthine, drach. xxiiiij. olei hem. S. aquæ cyathos. vj. conficito.

Cādidū Heræ

Aliud candidum ab Hera descriptum. Ceræ albæ pont. lib. ij. lithargyri chrysitidis, lib. j. cerussæ tantū dē. myrrhæ, medullæ ceruinæ, sing. vnc. ij. thuris insecti, vnc. j. olei ueteris, sextarium unum. Lithargyrus oleo incoquitur: ubi uerò sordium crassitudinem acquisierit, cera, mox cerussa, aspergitur, moueturq̃. Vbi unita fuerint, nec iam polluāt, ab igne extractis medulla inijcitur. Postq̃ refrixerit medicamentū, myrrha & thus alijs miscentur. Dein emollitū, subactūq̃ manibus, ad usum seruatur. Etenim rabidorū morsibus auxiliatur, tum uulneri impositum, tum mole auellanæ nucis, catapotij instar exhibitū, quadraginta diebus. Ad hæc abrasa suggillata, & ulcera quæ difficulter admittunt cicatricem, p̃sanat: ad aliaq̃ pleraq̃ est utile. Ego tamen propinare pharmacum hoc contra canis rabidi morsus, nunq̃ fui ausus: quum haberem aliud, nempe ex cancris confectum, medicamentum, ad sanandos illos maximè efficax. Ijs enim remedijs ipse uti semper conatus sum, quæ licet nonnunq̃ præsidij quod allatura essent, dubiā spem promitterent, neutiq̃ tamen obesse possent. Porrò Heras cum heminā scribit, sextarij

Morsui rabidi canis auxiliari medicamē ex cancris confectum.

Romani dimidium indicare uidetur, continentis vñ-
cias uiginti, quas cornibus maiori ex parte metiuntur,
incisis extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus.

In uniuersum autē, nisi metallica medicamenta ple-
nius coquantur, emplastrum ex eis cōstans adeò fria-
bile edetur, ut adhærere cuti absq; deligatura nō pos-
sit. At coquantur largius, dum maiorem liquidorū mē-
suram in mistura cōtinent. Quòd uerò ad adipis diffe-
rentias pertinet, in omni animantium genere iuuenilia
perfectis humidiorē, minusq; calidū adipem possidēt.

Album quod ad Mnasæum refertur, ad diuturna et
difficilia conferens. Lithargyri, Cerussę, singulorum
drach. c. cere, drach. 50. terebinthing, thuris, sing. drac.
xxv. aluminis fissilis, drach. xij olei heminas. ij. Nec ue-
rò differre putetis si drachmas. c. alicubi scriptas loco
unius librę inueniatis. Libra siquidem drachmas sex
habet ad nonaginta. Selibra, octo & quadraginta. Sic
& huius rursus dimidium, uiginti quatuor.

Porrò quę ulcera ex humorum confluxu, uel mul-
torum, uel acrium oriuntur, ita tamē ut locus affectus
huiuscemodi in se dispositionē non habeat, qua influē-
tem humorem, quāuis bonum, corrumpat: ea dysepu-
lotica, hoc est, ægrē peruenientia ad cicatricem appel-
lo. At quę dictā dispositionē sortiunt, singulari uoca-
bulo cacoethe, hoc est malignātis nature, uocant. Qui-
bus sanē omnibus illa medicamenta conueniunt, quę
absq; rosione & morsu desiccent: quęq; præter q̃ q̃
non erodant, aut manifestò astringāt, detergere etiam
possint. Siquidem plurima eius generis ulcera, ceu ab
exesione malignorum humorum sint caua reddita, im-
pleri postulant. Atqui omnia quę carnem gignunt me-
dicamenta, detergendi facultatem sortiuntur. Multa
etiam alia siccā possidēt uim, ulceribus id genus cu-
randis commodam. Eorum tamen meminisse impre-
sentiarum oportet, * quę aut tueri confecti emplastri

Sextarium Ro-
manū cōtinere
vncias. xx.

Metallica ple-
nius coquenda
esse ut adhæa-
reant.

Candidum
Mnasæi.

Librā cōstare
drachmis. 96.

Dysepilotica
ulcera quę di-
cantur.

Cacoethe vl-
cera quę.

Ulcerebus dy-
sepuloticis at-
q; malignis, q̃
lia medicamē-
ta conueniant.

candorem possint: aut non usq; ad eò uitare. Talia autem sunt, cadmia, pompholyx, calx, ostrea combusta, purpura, buccina, & sapiæ pars ossæa. Parum officiet colori, & æris squama: & ex usta chalcitide id quod cinereum est, aut subalbidum. At uerò ditiorū quodq; si lauetur, totam rossonem amittet: quemadmodum tū cera, quæ medicamini conficiendo admiscebitur: tum resina. Caterū ut cera Tyrrhenica, uel pōtica est ad candidi emplastri præparationem præstantior: sic resina, tum quæ larix, tum quæ terebinthina appellatur, ad ulcera malignāua magis conducunt. Sed thuris aliqua portio etiam indenda est, ut ulcerum malignorū ipsa dispositio coquatur, & ad suppurationem perueniat. Iam uerò ad prætumida ulcera ex aceto & marina curiosè leuigari debent metallica. In quibus autem acre & mordax est quod in ulcera ferit, ex aqua potius maceranda singula sunt: quemadmodum magis ex uino, ubi copiosus humor ulceribus influens apparet. Vbi igitur lithargyri cerussæq; utriusq; libram unam cum tribus olei, & se libra aquæ simul & accuratè coxeris, resinæ terebinthinæ, aut eius quæ larix dicitur, ternas uncias inijcito: ceræ autem duplum sufficit: nā thuris sat erit si unciam & semissem post ceram & resinam indideris. Deinde metallicorum tres uncias addes, quas drachmæ quatuor & uiginti constituunt. Impones autem duorum, trium, plurium, atq; oium quæ numerauit: ita ut si omnia habeas, equam singulorum portionem inijcias: cadmiæ nempe, pompholygis, buccinorum cineris, uel ostreorum, & æris squamæ, singulorum denarios septē. qui tres uncias absolunt. Quod si calcem lotam immisceas, singulorū drachmæ quinque ponentur. Si ustam chalcitidem, singulorum drachmæ quaternæ: sic ut ex omnibus in unum coeuntibus, tres tantūm vnciæ conflentur.

Cera Tyrrhenica,

Metallica abluendi modi diuersi.

Vnciā cōstare octo drachmis

Candidum emplastrum Damocratis, ad abrasa,

ambusta, & ulcera summa in cute suborta.

Cadidum Da
mocratis.

Cerussę lib. j. lithargyri, trypherg, sing. vnc. xvj. ceræ ponticæ, vnc. v. terebinthinæ purissimę, vnc. j. thuris mannæ, uel thuris vnc. v. olei candidi, lib. j. aquæ sextarius. Conficiatur ut decet. Porro in ijs qui molli sunt carne, in senibusq; , aut ijs qui malo sunt præditi corporis habitu, aluminis licebit etiam quatuor vncias miscere.

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera. Liber secundus.



VT I G I T V R si quando perdiderimus librum, cui inscriptæ insint medicaminum cōsuetorum compositiones, similia reficere amissis ualeamus necessarium in primis est, nos uniuersalem quandam uiæ formulam didicisse, qua propositum inueniamus: dein uerò secundū hanc in multis particularibus exerceri: scientes absq; tali exercitio nullum posse rectè opus absolui. Proponatur itaq; nobis cauum ulcus curandum. Etenim docti ab ipsa ratione, cauorum ulcerum curationem subministrari succrescente alia carne loco deperditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta est: cogitamus fieri hoc non posse, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas subsit. Verū sordes medicamina detergentia auferunt: humorem, exiccantia discutiunt. Quocirca necessum est huiusmodi pharmacorum materias cognoscere, idq; non simpliciter secundum genus eorum facultates cōsiderantes, sed inuenientes etiam quo ordine, quo uegradu, aut excessu, singula suas uires fortiantur. Finga-

Cauī vlcēis
generalis cura
tio.

Cerā p se non
congruere vl-
ceribus sordi-
dis.

Ærugo per se
adhibita, rosio-
nem & phleg-
monē excitat.

Corpora vali-
da validiora
medicamenta
pferre posse.

Medicamenta
omnia ei esse
optima, qui af-
fectus quibus
exhibetur, co-
gnorit.

Viride medica-
men Galli.

Terebinthinæ
progiatua.

mus ergo nobis ad manum tantū adesse ceram, ærugi-
nemq; quibus cauum ulcus repleamus. Quum enim
compertum habeamus, ceram quidem solam, ulceris
sordes minimè prohibeturam esse, ut quæ nec deterge-
re, nec exiccare possit; æruginem autem per se adhibi-
tam, excitaturam tum rosionem, tum phlegmonē: utiq;
horum utrunq; uitabimus: medium autē ex ambobus
constituemus, ut imbecilius ærugine, sic cera ualētius.
Quia uerò paulo hac interuallo relinquitur, ab eo qđ
cōmodē administrari possit: ærugo autem magno id ip-
sum excedit: ob id sanē multæ cerę modicam æruginē
admiscebimus. At quantam quantę miscere oporteat,
certē ante experientiam exactē quidem nemo inueni-
re poterit: conijcere autem poterit, iudicareq; & ita cō-
ficere pharmacū, ut primò nullum infelicē successum
sit habiturum: quemadmodum aliquando ego in quo-
dam uico confeci, cū ceræ fusæ ex oleo rhodino, libra
unica, unciam unam æruginis temperans. Cæterū
ualida corpora ualidiora medicamenta sustinent: quæ
uerò imbecilliora existunt, hoc est humido & molli ha-
bitu prædita, haud item talia perferunt. Dura itaq; cor-
pora ex copiosiori ærugine cerato admista, recipiunt
carnem: mollia ex pauciori. Quare ipsa experientia do-
cebit, quatenus uel augere, uel remittere. uel tueri phar-
maci facultatem expediat. Sunt nanq; omnia medi-
camenta ei optima, qui affectus quibus singula offe-
runtur, cognoscit.

Viride medicamen Galli, ad glutināda maiora uul-
nera potentissimum, ab Andromacho scriptum.

Resinæ strobilinæ drach. ccc. cerę drach. c. æruginis
rase, drach. so. thuris, drach. xxv. Aceti quod sit satis.
Hæc Andromachus. Ceterū quum strobilina resi-
na aliarum omnium longē calidissima sit: ambabus au-
tem qualitatibus moderatissima, quæ terebinthina uo-
catur: certē multò satius uidet hanc oibus medicamen-

tis, quæ rectè curabūt ulcera, permiscere: quādoquidē primus, præcipuusq; in eis scopus est, ut id quod offer tur, non mordicet. Cōmendanda est autem ipsius thu- ris cōmistio, q̄ emplastri consistentiam adiuuet, dolo- rem simul leniens & concoquens. Quare si in ea com- positione æqua ipsius portio coniuncta grugini esset, tenacius & mitius ipsum redderetur medicamentum: æruginis tamen exiccantem facultatem exolueret, quæ ulceribus ægrè admittentibus curationem desyderat. Meminisse autem oportet, fortium medicamentorum ex aceto diebus pluribus contritorum, morsum & acri moniam obtundi: vires augeri. Eadem ratio est in me- tallicis medicamentis combustis. Hæc tamen ex ignis cōmercio nonnihil mordax, siue erodens perseruant: quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur.

Proposito itaq; emplastro, si ex rosaceo liquefacto utaris, pderit sordidis, humidisq; ulceribus. Pura ue- rò erodit: ac proinde miscendum ei est ceratum liqui- dum ex cera & resina confectum: uel ex rosaceo, uel oleo liquatum. Est autem oleinomen unum: quali- tas & facultas diuersa. Quippè omphacinum frigi- dius est: ex maturis oleis pressum, calidius. Temporis autem progressu, calfaciendi uim auget. Sic etiā quoc- salem habet, quantum ex illo sumpserit, tanto calidius est: magisq; siccatur, q̄ quod ipsius est expers. Iam, quod furculos oleæ continet, ualētius astringit. Indicabit au- tem quod utilius est, & ulceris forma, & corporis egri- natura. Vlcus siquidem, cōtrarijs remedijs curabitur: corpus ulceratum, similibus. Rosaceum uerò præstan- tissimum esse nosti, quod solis rosas pluribus oleo citra- salem præparato plenius maceratis confectū est. Quæ omnia si quis memoriter teneat, nec oblitus sit uirium medicamētorum simplicium, is, & uaria emplastra ui- ridia componet, & compositorum singulis q̄ rectis si- mē utetur. Porro durioribus corporum, magis exiccā-

Thuris facul-
tas.

Fortium medi-
camentorū ex
aceto tritorū,
morsum quidē
obtundi, vires
autem augeri.
Elota acrimo-
niā amittere.

Olei differētiæ

Vlcus esse cu-
randū contra-
rijs, vlceratum
corpus simili-
bus.

Rosacei opti-
mi pparatio.

Exiccātiū uim
intendi p mel-
lis miscellā, re-
mitti aut oleo,
aut cerato.

Viridis medi-
caminis opti-
ma tēperatura

Viride hecatō
drachmon di-
ctum.

Viride Epigo-
ni.

Viride Passio-
nis.

Viride Lite di-
ctum.

tia medicamenta exhibēda sunt: minus autem, mollioribus. Ad hæc intēdemus exiccantis medicamēti uim, ubi opus esse uideatur, admisto melle: remitemus autem & mitigabimus, ex oleo, & cerato, uel oleoso quopiam. Igitur cauū ulcus in sano corpore, uiridi emplastro, quod ex grugine, cera, & resina conficitur, liquato ex rosaceo curabitur. In cuius medicamenti compositione, equidē ceræ & resinæ soleo portiones pares misce: gruginis autem duodecimā uel decimā, uel octauam: nimium pro ulcerum corporumq; diuersitate. Atq; erit sanē duodecima, si ceræ pondo, & resinæ tantūdem, æruginis uncias duas temperemus: decimaq; & octaua ad portionem.

Viride Hecatondrachmon dictum, quod centum drachmas medicamentorum recipiat, ad magna uulnera glutinanda, & purganda sordida, maximē utile.

Ammoniacy drach. viij. squamæ, drach. xij. manne, drach. viij. resinæ siccæ, drach. xij. gruginis drach. viij. seui uitulini, drach. xiiij. resinæ terebinthinæ drach. viij. ceræ drach. xxx. olei quartam cyathi partem. aceti, quantum satis esse uideatur. Conficito.

Viride Epigoni, ad carnem gignendam efficax.

Æris squamæ, æruginis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, thuris, sing. unc. j. Aloes, myrrhæ, chalbani, sing. unc. S. Aluminis rotundi, drach. vj. resinæ colophonice, drach. cc. ceræ drach. c. olei hemine dimidiū. Misceto.

Viride Passionis ad extrahendū & digerendū, utile.

Resinæ colophonice, drach. ccc. ceræ, drach. cl. æruginis, drach. viij. aluminis rot. tantūdem, squamæ eris, drach. xij. thuris, drach. xvj. æris combusti, drach. viij. Salis Ammoniacy tantūdem. Olei dimidiū cyathi. aceti quod satis esse uideatur. Conficito.

Viride Lite appellatum.

Resinæ lib. xij. ceræ lib. viij. æruginis rasæ, * Lib. ij. Seu i uitulini, lib. ij. aceti lib. so. Ego autem māne librā injicio.

inijcio. Liqueat igitur acetum cum duabus æruginis libris, & una ipsius mannæ, læuigandum esse: ac dein liquida ipsis miscenda. Hoc medicamentum emollit, cōcoquitq; ad ipis atq; manne ratione.

Porrò ad efficienda uiridia medicamēta, æruginem non modicam immittere oportet, ut cetera in suum colorem permutet. Quare quæ pertinaciter proprium colorem tuentur, ea simplicia ab hac miscella abigenda sunt. Sed neq; inter coquendum est injicienda ipsa erugo; uerū ubi in mortario unitas facta est, tūc miscēda.

Consilia igitur curandorum ulcerum sunt, sordidis adhibere abstergētia medicamenta; pluentibus exiccantia; atq; id quod in fluxu est, repellētia. At si copiosum & contumax sit quod fluit, fluxoris causa prius est amputanda. Constat autem, inflammatorum ulcerum prius esse sanandam phlegmonem; carnem intemperatam, reducēdam esse ad temperiem; cui sanē quatuor modis simplicibus, totidemq; compositis, per contrarias qualitates succurritur.

Porrò ubi sinum implere proponimus, medicamētum Isis uocatum, aut Machæronis emplastrū liquatum ex copiosiori oleo, per foratum cornu infundendū est: ad quod etiam pyulcis utimur. Est autem ipso medicamento tunc meraciori utendum, quā sinus oppletus est sordibus: ut soluto ex oleo largiori, dum magis purus existit. Cæterū si parue adhuc phlegmones sinum infestantis suspicio adsit, medicamētum ex rosaceo liquabitur. Pari modo & medicamentum siccum, quod ex charta combusta constat, rosaceo copiosiori diluentes, ipsi sinui infundimus. Quemadmodum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent; ita quæ superficiem corporis caua ulcera infestant, crassius medicamentum postulant. Meritò igitur in id genus uitij, ceratum ualidè abstergētibus admiscemus: in sinibus oleum, uel rosacei plurimum. At uerò medicamē-

Viridia efficiendi ratio.

Ulcera curandorum uniuersa consulta.

Viceris inflammationi curatio.

Sinus implendi ratio.

Sinus liquidiora pharmacapostulant.

Salis facultas.

ta quæ ex salibus constant, ubi animus est carnem genere, offerenda non sunt. Sal quippè magis astringit quàm purget: siccat uerò nihilo minus quàm nitrum. ac aphronitrum. Melina emplastra.

**Melinorū atq;
uiridiū discuti-
uū.**

Quemadmodū uiridium emplastrorum plurima, propter æruginem præpollentem talia sunt, ita quoq; melinorum nonnulla. Sed uiridia æruginem incoctam, habent: melina uerò coctam, sed mediocriter. Andromachus igitur complura melina scripsit, ad glutinanda ulcera, carnem gignendam, inducendamq; cicatricem idonea: quale est quod subdam.

**Melinum An-
dromachi.**

Lithargyri drach. C. iij. olei, heminā quidem, æstas: hyeme autem tres cyathos. ceræ, drach. xlviij. colophonix, tantundem. ammoniaci thymiamatis, drach. xxiiij. æruginis rase, chalbanī, myrrhæ, sing. drach. viij. conficito. Aliud simplex. Lithargyri drach. C. axungie, drach. lxxv. olei ueteris tantundem. misce. Conuenit enim carne molli præditis: digeritq; Aliud Heraclidis, interiores abscessus sine dolore discutiens. Lithargyri, cerussæ, sing. drach. c. ceræ drach. lxxx. resinæ aridæ, drach. lx. ammoniaci thymiamatis, drach. 50. chalbanī, drach. xvj. olei ueteris, heminas. ij.

Melinum Menæti.

**Melinum Me-
næti.**

Lithargyri, lib. iij. olei lib. iij. tereb. lib. ij. ceræ, lib. j. æruginis, thuris, chalbanī, sing. vnc. iij. ammoniaci thymiamatis, vnc. vj. conficito.

**Melinum Se-
rapionis.**

Melinum Serapionis, ad uulnera, & ad resoluendū.

Lithargyri drach. c. ammoniaci thymiamatis, drach. xxviij. ceræ, drach. lvj. æruginis Cypriæ, drach. ix. myrrhæ, drach. j. colophonix, drach. lvj. chalbanī drach. viij. olei, heminam. S. Quod si æstas sit, quartam partem heming. Aduerte autem myrrham non sustinere coctionem: quam nec thus, nec aloë ferunt.

**Coctionē non
sustinet myr-
ra, nec thus,
nec aloë.**

Hygieni emplastrum ad multa: quo ad ulcera uix cicatricem ducentia nullum melius extat.

Lithargyri chrysitidis, minam; cere tantūdem: chamæleontis nigri, radicis, drach. xxxvj. æruginis rasæ, drach. xviij. chrysocolle. drach. xl. olei ueteris heminas iij. Conficito. Preparatur optimè argenti spuma, si intrita uino Phalerno sub gustu caniculæ, dein afflicetur.

Emplastrum ex chamæleonte, quod cicatricem ulceribus difficillimis, callosis, & inueteratis inducit.

Lithargyri Minam. j. ceræ, minas. vj. æruginis minas iij. chamæleontis minas. viij. olei minam unam. Conficito ut decet.

De ruffis emplastris.

Quemadmodum propter crudam quidem æruginē sunt uiridia emplastra: propter mediocriter autem coctam, melina: sic ruffa euadunt, ubi liberalius ea coquitur. Manifestum igitur est, melina, ruffaq; oleum copiosius, q̃ uiridia, recipere. Ruffum porrò, quo semper mea industria parato utor, in hunc modum coquit. Argenti spumę cum oleo prius coctę, metallica ex aceto læuigata immitto, & sic coquo, donec amplius manus non polluat. Impono itaq; olei uetustioris libras quatuor: argentę spumę lib. iij. aceti q̃ acerrimi, lib. ij. Horum trium metallicorum, squamę gris nigri, æruginis, chalcitidis, sing. vnc. ij. Ceterū hyeme plus olei q̃ per estatē miscendum est. Ac sanè hoc medicamentum cruēta uulnera glutinat, magis q; in duris corporibus. curatuq; difficillima ulcera p̃coquit. In sūma uerò, solū hoc sinus glutinat, astringit fistulas, exiccat, et prorsus claudit. Ipsum tñ iuuat spongia recens ueteri uino respersa. Deligatura in sinibus ab imo fiat, uersus ulceris osculum.

De ijs quæ cicatricem obducunt.

Quanto autem glutinantia sarcoticis magis dicuntur siccare, tanto glutinantibus epulotica, siue cicatricem facientia. Ea tamen ex aliquo astringenti oleo (cuiusmodi rosaceum, aut myrteum est) solent administra

Hygiēi emplastrū multi vsus

Lithargyri p̃parandi ratio. Emplastrū ex chamæleonte.

Ruffa emplastra fieri per lōgam coctionē æruginis.

Ruffum emplastrum Galeni

Deligatura q̃lis adhibenda sit sinibus.

Cicatricem obducuntia.

ri. Porro inter ea quæ apud omneis magnificè cōmendantur, inducendę cicatrici præstantissimum est quod ex cadmia, quodq; ex ladano constat.

Emplastrum ex cadmia.

Epuloticū ex
cadmia.

Cadmiz ustæ, & ex uino præparatę, chalcitidis tostę, sing. drach. lxxx. picis colophonizę, vnc. viij. uini Phalerni, quod satis est. Conficito ut decet.

Aliud etiam ex cadmia.

Cadmiz tostæ, chalcitidis tostę, diphrygis, sing. drach. xvj. cere, resine frictę, olei myrti, sing. selibrā. uini Italici, quod sit satis.

Aliud ex cadmia.

Argenti spumę, cerussę, cadmiz, diphrygis, resine, sing. drach. viij. chalcitidis, drach. ij. cerę, drach. viij. myrtei olei, & uini amingi, quod satis esse uideatur.

Emplastrum ex ladano.

Emplastrū ex
Ladano.

Chalcitidis, argenti spumę, ladani, singulorū drach. xxiiij. bituminis drach. viij. cerę, vnc. ix myrti hemie nam, uini tantūdem.

Emplastrum Pyricauton dictum.

Emplastrū py
ricauton.

Olei heminam, aluminis fissi, manne, thuris, argenti spumę, chalbani, singulorum drach. so. cerę, drach. xxiiij. anchusę, drach. viij. medulle ceruicę, adipis suille, æruginis, cerussę, sing. drach. ij. ouorum trium lutea. Conficiatur ut decet.

Medicamē ma
gne dictum.

Medicamen Magne dictum, ac uerè magnum contra ulcera quæ difficulter cicatricem admittunt; quod ex rosaceo dilutum, etiam sedis affectus sanat.

Argenti spumę, drach. c. cere, drach. so. Cerussę drach. c. terebinthing, drach. xxv. thuris tantūdem. aluminis fissi, drach. xij. olei heminas duas. Conficito.

Emplastrum
Thelamonis.

Aliud Thelamonis accommodatum carbunculis, sinusq; exiccans. Pityinę, cerę, calcis uiuę, lithargyri, sing. drach. so. cerussę, drach. xxv. olei tris cyathos.

Aliud Moschionis unicè conferens ad amouendum

ulceris callum, sanandosq; sedis affectus. Argenti spumę, cerussę, calcis uiuę, sing. drach. viij. medullę ceruicę, cerę, utriusq; drach. xvj. olei myrtei quātū sit satis.

Emplastrum
Moschionis.

Epuloticum medicamen Andromachi.

Cadmę, lib. j. chalcitidis uste, cerę, sing. tantūdem. resinę aridę, lib. iij. Myrtei tantundem. Vinum sic-
cis immiscetur.

Emplastrum
Andromachi.

Aliud eiusdem candidum epuloticum.

Argenti spumę, minam. j. cerussę tantūdem. cerę, re-
sinę, sing. minas. iij. olei heminas. iij. aque heminam.

Candidum Thelephanis.

Argenti spumę, drach. lxxx. cerussę, drach. cxx. myr-
rhę, drach. iij. obo. ij. Sagapeni, drach. v. thuris. drach.
vj. obo. iij. olei heminas. ij. S. Omnia simul coquito.

Candidū The-
lephanis.

Aliud ad herpetas, carbunculos, condylomata, &
rhagadas maximē ualēs: quod etiā phlegmonas arcet.
Adipis suilli, drach. lxxxviij. cerę cādide, drach. xlviij.
cerussę, drach. xij. argenti spumę, tantūdem. conficito.

At uerō nōnulla emplastra cephalica, & catagma-
tica nominant, potissimū à caluarię fracturis, quibus
solent opitulari. Sunt autem talia, abstergendi, digerē-
di, & siccandi potestate prædita. Pleriq; tamen paulu-
lum ex astringentibus pharmacis eis admiscent: ut id
quod affectis partibus influit, repellatur: & abster-
gentium facultas in altum usq; descendat. Cæterū
nisi astringentiā conterantur in tenuissimum pol-
linem, magis obsunt, q̃ profint, hīs quę trahendi uim
obtinēt.

Cephalicę
pharmaca vñ
de dicta, et quę
facultate præ-
dita.

Catagmaticum optimum ab Æsclepiade traditū,
ad confirmanda fracta ossa Argenti spumę, bituminis
sing. drach. cc. picis aridę, cerę, sing. drach. c. terebin-
thinę, drach. 50. aluminis cissilis, propoleos, singu. dra-
ch. xxx. ammoniaci thymimatis, drach. xxiiij. ærugi-
nis, drach. x. olei sextarios quatuor.

Catagmaticū
Æsclepiadis.

Moschionis catagmaticum ad fracturas, contu-

Catagmaticū
Moschionis.

siones, atq; recentia uulnera, aliosq; affectus complures celebre.

Argenti spumę, minam. ꝑ. picis, tantundem. seui uitulini, tantundem. Terebinthinaę, drach. octoginta. manę thuris, tantundem. cereę, drach. xl. eruginis, opopanacis, chalbanı, sing. drach. viij. olei cicini, aceti, liquoris sycamini, sing. heminam. picis liquidę heminę dimidium. Conficiatur ut decet.

Mina cōtinet
vncias. xx.

Vncia cōtat
viii. denariis.

Cephalicis ad
quę Medici r-
tantur.

Pro mina in presentiarū intelligo vncias uiginti: quarum singulę pendent octo denarios. Sic itaq; continebit mina centum sexaginta denarios.

Proprię autem dicuntur emplastra cephalica, ea q; bus Medici in ijs capitis fracturis, quę ad diploen penetrarunt, utuntur, ad extrahenda ex alto, superficiem uersus, non ossa modò, sed his multo magis humores crassos & uiscidos, intus delitescentes. Quare acrimoniam quandā sortiantur oportet. Itaq; catagmaticis cephalica generosiora existunt: quę quidem mista cera to, carnem possunt producere. Quocirca, sarcoticis quodammodo sunt similia.

Cephalicum optimum ad capitis fracturas ab Hera descriptum.

Cephalicum
Hera,

Squame æris, drach. xxv. aluminis, aristolochię longę, sing. drach. xx. ammoniaci thymiamatis, thuris, sing. drach. xxv. myrrhę, drach. xij. seui taurini, terebinthine, pitying, singu. lib. iij. olei heminam. aceti quantum sit satis. Conficito.

Aliud eiusdem, arcens phlegmonē, maximeq; ad fracturas, & puncturas neruorum conducens.

Argenti spumę, drach. xxv. bituminis aridi, drach. c. picis aridę, drach. 50. cereę drach. 50. resinę pitying, drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, æruginis, aluminis fissi, propoleos, sing. drach. xv. olei ueteris, lib. iij. conficito.

Andromachi catagmaticum.

Catagmaticū
Andromachi.

Argenti spumę, picis, cerę, seui taurini, thuris, sing. minam. picis liquidę, heminaę dimidiū. liquoris syc-

mini, heminā. terebinthinā, minā. opopanacis, chalbanī, æruginis, sing. drach. viij. ricini heminā. Ammoniaci thymiamatis, drach. xxv. Ex uino austero diluitur.

De emplastris glutinantibus.

Quidam hæc ἐναιμα & τραυματικά nominant: estq; opus eorum coniungere, & diuisas partes conglutinare, reducereq; ad pristinam integritatem. Sunt autem sarcoticis ipsa glutinatoria sicciora. Ad hæc, sarcotica quidem, detergendi uim, sed absq; rosione possident. Glutinantia autem, tantū desiccantia esse debent. Cæterum cicatricem inducentia medicamenta, præter q̃p astringunt, sicciora etiam sunt glutinātibus. Etenim glutinantium est finis, nullā inter coitura subnasci humiditatem permittere: cicatricem uerò inducentium, non modò hanc prohibere, sed consistentem etiam in ijs, quæ cicatricem sunt receptura, cōsumere: præterea callo obducere, & astringendo obdurare. At sarcotica sanguinem ad refectionem idoneum tam quantitate, q̃p qualitate tuentur. Iam quod nullius sit mordicationis particeps medicamen, purū ulcus cōseruat, si quidem tale illud acceperit. Porro molliora humidioraq; corpora, imbecillioribus medicamentis indigent: ut uehementioribus, quæ prorsus contraria existunt.

Glutinatorium ab Andromacho scriptum, nomine Barbarum.

Picis, resinæ, bituminis, sing. drach. cc. thuris, drach. xxiiij. olei heminam. Conficito.

Aliud eiusdem.

Picis lib. ij. bituminis, ceræ, sing. lib. j. Ammoniaci thymiamatis, mānæ, sing. vnc. vj. cerussæ vnc. iiij. olei heminæ dimidium, aceti heminas. iiij.

Aliud enæmon Iuliani.

Argenti spumæ, bituminis, cere, picis, brutiæ, sing. drach. so. resinæ frictæ, drach. xv. æris squamæ, drach. xij. thuris, drach. xiiij. chalbanī drach. viij. chalcitidis

Rrrr iiij

Glutinantium medicaminum usus. Sarcoticorum cultas.

Epuloticorum opus.

Molliora corpora imbecillioribus medicamentis indigent.

Glutinatoriū Andromachi, Barbarum nomine.

Enemō Iuliani

drach. iij. aloes drach. vj. gallæ, drach. iij. myrrhæ tā-
tū. m. aristolochiæ longæ, drach. vj. aristolochiæ ro.
drach. iij. olei ueteris, heminas. iij.

Enamō nigrū
ab Hera.

Nigrum Enamō ab Hera conscriptum.

Cerg, picis, bituminis, pityinæ, singu. lib. j. mannæ
vnc. vj. ceruſſæ vnc. iij. chalcanti tan. ūdem, opopa-
naxis, vnc. ij. olei semiminam. aceti heminas duas. Cō-
ficio ut decet. Valet ad diuisiones notatu dignas, ma-
ximè capitis: ad fistulas, sinus, fracturasq;. Cohibet mi-
rificè sanguinē erumpētē. Canum hominumq; mor-
sibus auxiliatur: ac prorsus phlegmonem arcet.

G A L E N I P E R G A M E N I D E C O M P O S I T I O N E M E D I C A M E N T O R V M S E C V N- dum genera. Liber tertius.

Putrescentium
curatio p quæ
fieri debeat
medicamentā.



VANDOQVIDEM quæ pu-
trescunt omnia, ex humiditate & calo-
re id patiūtur, certè in uulneribus ob-
noxijis putredini, curationem per sic-
cantia & refrigerantia molindā esse,
semper mecum existimaui. Rursum

apud me contemplatus, frigidum neruis ab Hippocra-
te inimicum dici, optimum fore medicamen neruorū
uulneribus intellexi, quod & siccaret, & medium esset
inter ea quæ calfaciunt, & refrigerāt: uel quod parum
ad calfacientium latus ab ipso medio recederet. Posse
etiam calidum abundè esse pharmacū, modo siccandi
facultate polleret. Quopè calor citra humiditatem hu-
mectare non potest. Cæterū ubi nudaris neruis me-
demur, tu & prædictam auxiliorum integram indica-
tionem assumi ratio est. Vbi uerò pūctis, ita ut partes
interiacentes sint sang, tenuius pharmacum inuenien-
dum est, cuius uirtus interiacentes particulas pmean-

Nudati nerui
quā medēdi ra-
tionē posulēt.
Pūcti nerui q-
lia medicamē-
ta posulēt.

do non dissoluatur, sed in altum penetret. Hoc autem facere poterit pharmacū uehementer exiccans. Quod quidem, etiam si non sit in calore & frigore symmetrū, offendere neruum læsum non poterit: quā facultas cal faciendi aut refrigerandi (quæ illi inest) admodum imbecillior reddat, dum particulas neruoso corpori prepositas permeat. Porro inter omnia quæ refrigerandi uim habent, tenuiorum partiū acetum est q̄ acerrimū: quod etiam caloris modici est particeps. Inter calfacientes autē liquores, qui partiū tenuitate sint p̄diti, primæ tribuuntur partes Cyrenæo succo. Cæterum si eius facultas non detur, utemur Medico, uel sagapeno uocato, uel euphorbio. Panacis etiam, & tithymallorum liquores, & opobalsamum tenuandi facultatem sortiuntur. Ex terrestribus etiam nitri spuma, aphronitrū, beroniceum nitrum, petra asia, eiusq; flos, partium tenuitate insigniuntur. Ex metallicis auripigmentum, & sulfur, tum subtilia, tum calida sunt. Quibus succedit misy, æris squama, & chalcitis, parum simul astringētia. Citra calorem uerò manifestum tenuis essentia metallica sunt, spodiū, pompholyx, & psoricū. Subtilis abudē est, & chrysocola. Ex succis, laurinus ualenter calfacit, ac præterea tenuandi uim possidet. Nihil autem minus eo cedrinus calfacit: calore tamen qui sensibus subijcitur, propter substantiæ tenuitatē, illi cedit. Eiusdem generis cum cedrino est lixiuia, quam stactem uocant. * Quæ quidem si ex tenuiorum patium materia uita fiat, cedrinum oleū uirtute superat. Iam ex cerealibus, subtilissimus est eruus, sine insigni calfaciendi uis: lolium uerò, cum insigni. Hordeum nequaquæ calfacit. Mediam inter ea materiā obtinent, qualitatibus amara: ut quæ multū tenuibus substantia cedant, & crassi nihil possideant. Igitur medicamentorum materie non semel aut bis, sed frequenter sunt explorandæ: quando quidem sensibilibus rerū cognitio, inspectione sedula

Aceti facultas.

Succorum calfacientia differentia.

Terrestria, partium tenuitate prædita.

Sensibilitū rei
cognitio, in spe
ctatione sedula
consumatur.

confirmatur. Cuius rei indicium euidentissimum est, quod gemelli per omnia similes esse nobis uisi, differētes appareant ijs, qui non per transennam, atque obiter, sed accuratè inspicere eos consueuerunt. Itaque herbarum, fruticum, arborumque materiam, prius quam est terra examinatur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uide licet futuri sunt, dum eduntur, dum augescunt, dum uigent. Ex hac namque speculatione assequeris, quando excerpenti sint, in siccisque domunculis reponendi. Etenim commodè reponuntur in locis nec subterraneis, nec sub tegulis, constitutis: sed medijs, atque ostia ad meridiem conuersa habentibus: propè quæ tamen reponi medicamenta non debēt. Amicos autem omneis adhortor, si artis opera pulchrè obire uoluerint, ut me imitētur, qui ex omni natione quotannis præstantissima medicamenta ut mihi adferantur curo, eo quod perditum illi omnigenarum rerum coemptores, illa indies adulterio cõtaminant. Conuenit præterea medicum, non modò affectionis, quam singula medicamenta inducunt, qualitatem, sed etiam ipsius (ut ita dixerim) quantitatem coniecturare. Quippè quod humore copioso est auctum, non simpliciter humectari postulat, sed opus est, ut sic citatis quantitas, copię humiditatis respondeat. Porro neruosarum partium doloribus à frigore obortis, unicè optulatur emplastrum ex euphorbio, oleo, & liquata cera, confectum: ad computrescentes autem circa articulos partes, confert cataplasma ex hordei farina & stillatio lixiui paratum. Perfundendæ autē liberaliter partes circumiacentes sunt oleo calente: postea uerò, ubi lana sicca, totus mador fuerit exhaustus, humido cerato, & cui euphorbium admistum sit, illinendæ. Porro secundæ die, pro hordeacea farina, miscere eruinam consueui: atque ubi iam totum quod computruit exemptum sit, paulatim primò quidem ad carnem gignentia: dein ad obducentia cicatrice, transire. Quando autem mihi

Medicamenta
reponendi rō.
Galenus ex oī
regione cura-
bat sibi ad fer-
ri omnigena
medicamenta.

Neruosarū par-
tiū doloribus
quid medeat.

Putrescentium
circa articulos
partiū curatio.

Nervi vulnera
ti curatio.

neruus aliquis uulneratus occurrit, interim per liqui-
da pharmaca curationem molior: interim per empla-
stra: lanam extrinsecus q̄ mollissimā, imbutamq; oleo
calente, applicans. Quòd si medicamentum ex aceto
et uisum, aceti modicū oleo admiscens, bis ter uel quod
ridie soluo, & oleo calēte foueo. Si noctes lōge fecerint,
etiam in his soluere consueui, idq; magis, dum uulcus à
medicamētis eroditur. Oleum autem quod adhibebimus,
satis calens esto: uerū ita, ne uulnera partem offen-
dat. Nam ut frigidū huiuscemodi affectibus aduersissimū
est, sic tepens non omnino uale. Nam quemad-
modum aqua ipsa, quatenus ualeat, aut friget, maximè
cōtraria facere nata est, ita quoq; oleū. Frigidū si qui-
dem, corpori admotum perspiratum ipsius obstruit,
& prohibet: calidum uerò, digerit, extenuatq;. Porro
ab aquæ usu in tota curatione ita tempero, ut ne attingat
quidem uulcus. Proinde, quū sanguis initio statim
à uulnerata parte abstergendus est, ex oleo id facere
expedit. Iam uerò acetum, si quando ipso ad affectos
neruos utamur, in se nihil uinosum contineat. Oleum
autē omni astrictione uacet, sitq; omni ex parte tenuis-
simum: quale Sabinum existit. Memini autē me, quū
alia remedia deessent, neruorū uulnera propoli recētī
curasse: interdum etiam antiquiori fermento. Quæ
ambo aliquando commiscui.

Vetus etiam euphorbiū oleo læuigans, instarq; ca-
taplasmatidis adhibens, aliàs tendinem punctum sana-
ui: id quod, euphorbio recenti adhibito, neutiq; succes-
sisset: quum calorem magnum, mordicationemq;, atq;
dolorem excitet. Eorum tamen euphorbium est, quæ
calorem caducum, atq; statim euanescentem sortitur.
* Cæterū alijs multis pharmacis accidit, ut pau-
culis annis eorum uis resoluatur: id quod, post thapsiā,
nullò minus euphorbio contingit. Quippe thapsia bi-
mula, expirat penitus: quum euphorbiū uires, ad sextū

Tepidum oleū
celsis neruis nō
congruit.

Aquæ usum uul-
neratis eē ner-
uis inimicissī-
mum.

Euphorbiā ad
punctos tendi-
nes facere.

Euphorbiū uis
cito euaneſcit

Thapsiā bimū-
lam expirare
prorsus.

usq; annum seruari possint. Porro ubi pharmaci cōsistentia simile acopis dictis unctionibus habere uoueris, oleum sit quadruplū ceræ. Vbi uerò emplastrū hicem referet, parem ceræ portionem oleo expedit rem. ^{tem} rare: maximè si sicca & uetusta fuerit: ac tum sanè iph ceræ sic temperatæ, poteris sextam partem euphorbiæ adijcere: ita ut illius sex drachmæ: ceræ sex: atq; olei sex misceantur. Licebit etiam ressing, aut picis, aut quid emplastro ipsi adijcere, ut glutinosius euadat: tum tamen minus infundendū est olei. Ac resinarum quidem omnium siccissima est, quā alij phryctem, alij colophoniam appellant. Huic succedit quæ ex figulinis impura sumit: quā si purges, in phryctem mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur pitynon physema. Ego tamen ad rem propositā phrycte utor, & liquidis. Harum rursus nonnullæ diutius liquidæ permanent, quemadmodum terebinthina: aliæ cito inarescunt, ut strobilina: media utriusq; est abietina. Quin etiā facultate calidior est quidem strobilina: mox uerò abietina: deinde terebinthina. Foteris autē medicamen quod euphorbium receperit, experiri in tuo crure, uel brachio: atq; ita ex affectu quem inferet aut remittere ipsum, aut eius uireis intendere: remittere quidem, mistura cerati: intendere uerò, appposito euphorbio. Quod si propolis pinguem habueris, eam omnibus resinis aptiorem fore tibi intelligito: ut quæ uaporosam spiritus crassitiem, humoresq; superfluos eliciendi, atq; ex alto foras extrahendi, à natura uim habeat: quæ facultas ueteri etiam fermēto inest. Iam uerò ad uulneratos neruos nonnunq; sum usus sulfure uiuo, sicuti & arsenico, & sandaracha, & calce tū uiua, tum extincta, loraq; & illota: singulis nimirum horum per se cum tetrapharmaco temperatis. Porro Empirici ex casu unum aliquod simplex medicamentum utile ad proposita inueniunt. At rationalis methodus, plurima

Resinatū disse
rentiæ.

Propolis uires.

Fermenti facul
tas.

simul inuenit, & uarias ipsorum cōpositiones. Etenim quæ ex alto humores educunt, digerereq; possunt, neruorum uulneribus sunt ex usu. Quandoquidem uerò nonnulla horum qualitates habent immoderatas, aliæ immiscenda sunt, quæ ipsorum excessus, illæsa facultate, retūdant. At rectè hoc fieri nequit, nisi cuiusq; medicamēti, nō modò qualitatis genus, sed ipsius etiā qualitatis gradum, quantitatem uel cognoscas. Quocirca Empirici, quod ignorent naturam simplicium, homogenia tantum, atq; similia cōmiserunt; quemadmodum alij pleriq; q̄ excessus quantitatem non assequantur. In uniuersum autem, pharmaca liquidiora, minus molesta sunt, quum alijs, tum uel maximè neruorū uulneribus. Cauendum tamē perpetuò est, ne aquis læsa particula respergatur. Verū qui pulchrè neruorum uulneribus prospecturus est, etiam particularum naturæ sit peritus oportet. Est autem curatio cōmunis, sicuti & periculum par, tum in contusis ac uulneratis neruis: tum in sic affectis tendonibus. Porro in uulneribus iuxta femoris longitudinē factis, deligatura uulnerati musculi partibus inuicem contrahēdis sufficit. Per transuersum uulneri accepto, nihil deligatura contulerit: sed sola sutura totum opus absoluitur. Has igitur nisi quis altas faciat, musculi partes permanebunt in glutinate. Consuēde etiam sunt membranæ ipsæ cum musculis quibus cohærent. At tendines, membranarū instar extensos, & dilatatos, non mediocri cum periculo consues. Ligamenta autem, quomodocunq; afficiantur, ab omni sunt remota periculo: utpote insensilia existentia, & ex ossibus, non ex musculis, ut tendines, orta: neq; ex cerebro aut spinali medulla, ut nerui. Igitur medicinæ partes, mutuam opem requirunt: tum quæ manu, tum quæ medicamentis, tum quæ uictu medetur: maximeq; illa quæ manu curat, reliqs duabus indiget. Porro pūctiones neruorum angustā cutis diui-

Neruis uulneris conferre, quæ humores ex alto educere, ac digerere possunt.

Empirici cur similia tantū medicamenta cōmiserunt.

Aquam neruis legis esse inimicam.

Tēdinum atq; neruorum affectus æque periculosos esse, eandemq; medēdē rationē desyderare.

Femoris uulnera glutinandi ratio.

Tendines non absq; periculo consui.

Ligamentorū affectus cur periculo vacat. Medicinæ partes mutuā opē desyderant.

Punctiones ner-
uorum angustæ
nō iisdem me-
dicamentis cu-
rātur, quibus ner-
ui nudari.

functionem habentes, non eodem curantur medicamento, quod nudato nervo auxiliatur: sicuti neq; id quod puncturis medetur, nervo nudo est ex usu. Quippe multo calidius est, magisq; mordet, q̃ ut nudus nervus ip̃m perferre possit. Præcipuè autē danda opera est, ut oræ angustiorum punctuum apertæ sint, quo calidum medicamē admodum extrinsecus, per eas uapores eliciat: attrahēs humiditatem circa affectum locum intus delitescentem. Quamobrem orificium duabus in cute sectionibus ad rectos angulos diuidere oportet.

Punctionū an-
gustæ or̃e quo
mō dilandæ.

Cōsectiones medicamētōrū ad neruorū uulnera.

Nervis vulne-
ratis q̃lia me-
dicamenta cō-
gruant.

Ex metallicis astgringentia uitanda sunt, præsertim ubi nerui sunt puncti. Detergentia autem conferunt: quæ tamen sub æstiuo sole, ex acerrimo, uetustissimo, substantiaq; tenuissimo aceto liguigare oportet, quo felicius crassitudo partium, qua omnia metallica prædita sunt, auferatur. Quanto autem longiori tempore attrita fuerint, hoc tenuiorem consequentur substantiam: eruntq; aptiora angustis uulneribus: quemadmodum in nervis carne nudatis, admodum tenuia, exedētiaq; cauenda sunt: quibus sanè pastilli Andronis, Polyidæ, & Pasionis congruunt, ex sapa, quam Sargon uocant, appliciti. Ad punctos autem nervos, equidem compositis medicamentis omnibus, illud præstantius semper esse usu ip̃so cōperi, cui copiosa gr̃is squama iesser: de in chalcitis combusta: postea misy. Porro ubi nervus qui nudus erat, ab imposito medicamento iam tectus fuerit, linamētis extrinsecus, unum aliquod ex ijs, quæ ad angusta conueniunt uulnera, superponendum est: aliudq; eiusdem materiæ toti affectę particulæ circumdandum, ita ut sanas quoq; partes, præsertim superpositas, plurimum comprehendat. Quum autem per magna differentia humanorum corporum sit, ob idq; unicum medicamentum omnibus conuenire non possit, duo semper in promptu habeto, alterum nempe ua-

Medicamenta
duo, eiusdē qui
dē generis, sed
facultatib; dif-
ferentia, ad vul-

lentius, sed ex similibus genere confectum: alterum mitius & blandius: quæ inuicem temperans, dum postulat usus, pro uarietate misturæ, permulta alia media inter ipsa constitues. Esto igitur ualentissimum metallicum tale. Chalcitidis crudæ, partē. j. misyos crudi, partes. ij. gris squame, partes tres. Mitissimum hæc recipiat, misyos, chalcitidos, utriusque combusti, partem. j. squamæ, partes quatuor. Medium sit tale. Misyos, chalcitidos, æruginis, cuiusque usti, partem unam. æris squame partes tres. Præterea ceræ in ualentissimo duplum: * in mitissimo duplum, atque ipsius dupli dimidium miscetur: at in medio, duplum, ac ipsius dupli quartam partem miscere oportet. Quum igitur ualidissimum ex sex partibus constet, duodecim illi ceræ partes miscebis. Imbecillimum autem, quandoquidem ex senis etiam constabat, octodecim (quod duplum, ac dupli dimidium est) recipiet. Mediocri uerò dimidium harum partium omnium inde est. Atqui octodecim & duodecim triginta partes constituunt, cuius numeri dimidium continet quindecim partes. Tot igitur mediocri medicamento adiciuntur ceræ portiones (id quod erat duplum, & dupli pars quarta) siue ex drachmæ sint, siue uncia, siue etiam libræ. Porro mensura qua Romani metiuntur oleum, est cornea, discretaque circularibus lineis, totam ipsam diuidentibus in duodecim partes. Atque integra quidem mensura ab eis appellatur libra: ut eius duodecima portio, uncia. Iam uerò predictis pharmacis omnibus, iuxta ceræ portionem, addatur oleum essentia tenuioris, minimeque astringens: quod quidem ceram ipsam dimidio superet: ita ut octo illius uncijs, duodecim olei misceantur. Quin etiam ubi metallica pluribus diebus in mortario trita ex aceto fuerint, commodè illis thus candidissimum atque pingue miscetur. Cuius quantitas mediæ omnium portioni sit par: quam licebit tibi augere aut minuere, pro ut uolueris efficere medicamen-

neratos neru-
cur in .pruptu
habere semper
oporteat.

Mensura olei
erat olim apud
Romanos cor-
nea.

Resinā disse-
cutiē.

Emollientibus
omnibus inest
seputricum
quid.

Chalbanū pun-
ctus neruis con-
ducit.

Metallica om-
nia dolorem
excitant.

Adeps tenuiū
parium, lenit
dolorem.

tum mitius, aut acrius. Cerae etiam oleo liquatae, pote-
ris aliquam resinam ex predictis iniungere: sciens acrius
futurum pharmacū, strobilina iniecta: mitius, terebin-
thina: mediū utriusq; abietina. Ex harū genere quoq;
est larix, cæterum predictis humidior: liquidæ piceæ
substantia similis. Miscebis igitur ceræ, sextā unius di-
ctarum resinarum partem, si uis ut medicamentum em-
plastri formam retineat. Chalbanī uerò æquale thuri
pōdus indes, ubi mitissimum reddere sit uis: dum ua-
lentius, dimidium; quando ipsorum medium, id quod
inter æquale & dimidium est. Inest porro chalbano, ut
emollientibus omnibus, etiam putrificum quid: quare
nudatis neruis non usq; ad eò cōuenit. At si nudus ner-
uus non sit, haud mediocriter permixtio ipsius ad dolo-
rem leniendum confert. Omnia quippe metallica exas-
perant, doloremq; excitant: ut ex humidis etiam, ace-
tum. Quare dolori ab his excitato, plurimum auxilia ē
fotus ex oleo & chalbano mistis, administratus. Nihil
autem minus chalbano dolorem lenit adeps tenuitate
substantiæ p̄ditus: qualis à feris, et agrestibus anima-
libus sumitur. Nam animalium quæ conclusa in urbi-
bus degunt, adeps est & humidior, & crassior. Ex his
igitur quæ leniant dolorem, habere aliquod medica-
men expedit, quod ex metallicis composito possis in-
terdum miscere.

De medicamentis ex euphorbio confectis.

Euphorbiū re-
tus recentiori
esse inferius.

Verus euphorbium recentiori longè est inferius. Si
igitur anniculum sit, etiam Cyrenæo succo, quē nunc
habemus, & cuius irrigatione stirpes augēt, & succu-
lentas reddūt, magis excalfacit. Porro colore quidem
uetus recenti flauidius pallidiusq; apparet: substantia
durius, & siccus. Conficitur autem ex recenti euphor-
bio calfaciens medicamentum in hunc modum. Eu-
phorbi, vnc. j. ceræ, vncias. iij. olei, vnc. xij. quo smeg-
mate intrepidè uti ad puncturas poteris, dum uereris

Medicamē ex
euphorbio ad
neruorum pun-
ctiōnes cōmo-
dum.

ne oscula

ne oscula ipsa * cōiueant. Quòd si imbecillius fuerit euphorbium ipsum augenda eius mensura est, pro imbecillitatis ratione. Cæterum confectura ceræ euphorbi triplicatam continens, aliarum est ualētissima, quū illud recens miscetur: quincuplam autem recipiēs, in ualidisima. At quadruplā capiēs, medio inter utraq; gradu consistit. Quòd si unguenta proponas facere, qualia ἀκροα nuncupantur, oleū ceræ quadruplum immiscabis; si uerò, ut in fracturis, liquidum ceratum parare, duplum. At emplaston medicamen cupiens conficere, oleum pari mensura ceræ immisceatur, si quidē ambiens fuerit calore temperatus. Si nautem ille frigidus sit, cera autē uetus & arida, paulo ampliori misceri debet. Vt autem tenacius hæreat, terebinthinam, aut colophoniam, soleo emplastro adijcere. Pix etiam, cerati consistentiam tuetur. Multò autem præstiterit medicamentum, si resina, picisq; loco, propolim ceræ parem adiunxeris. Quæ si pinguitudine careat, cupimusq; ut adhæreat pharmacū, terebinthinam, uel laticem, uel syncomistēm pineam, uel resinas sua sponte fluentes, miscebimus.

Medicamēta
varias consistē
tias parandī
ratio.

Medicamen confectum ex liquabilibus.

Ex aceto citra ignē liquefcit ammoniacum thymia ma, sagapenum, et opopanax. Igni uerò soluūtur propolis, cera, resina, & consimilia: quæ in duplici uasē liquare est melius: nempe quum in cacabo aquam calidam continente, incumbenteq; prunis, alterū uas consistit, præter liquabilia etiam chalbanum continens. Valentissimum igitur ad uulneratos neruos medicamentum sit huiusmodi. Opopanaxem ex aceto dissolutum diutius conterito. Postea liquefacta illi super igne propolim, chalbanum, & resinam terebinthinam misceto. Singulorum itaq; aliorum pars una esto. Propoleos recētis, pinguisq; sex. Qua si careas, eius loco picem pinguem indes: qualis est brutia. Quòd si hæc nō

Liquādi medī
camenta in du
plici uasē, rō.

Medicamē ex
pice, vtile ad
canis rabidi
morsus.

adlit, uteris terebinthina. Ego nonnuncq̃ uel solum me-
dicamentum ex pingui pice confectum imposui, quo
etiam ad canum morsus utimur. Id autem recipit, pi-
cis, lib. j. opopanacis, vnc. iij. aceti, in quo illa coquun-
tur, sextarium Romanum. Etenim puncturæ oras cō-
niungere nō sinit. Sic tñ cōposito, in duris tantū utemur
corporibus. Nā in mollioribus, ex aliquo molliori, sed
digerente, unguēto, uel oleo, liquādum est. Quòd si lo-
co opopanacis, sagapeno prius in pila trito ex aceto, li-
quefactā resinam, propolim, & adipem quandā acro-
rem adijcias, eiusdē generis medicamē habebis. Mol-
lius tamē est, quod ex resinis, propoli, seuis, ac cera col-
liquatis, absq̃ aceto, conficitur. Cæterū quod inde ē
seuū, sit acre: quale est quod ab agrestibus animalibus
sumitur, quodq̃; uetustum existit. Porro ex medullis,
ceruina, uitulinaq̃; antecellunt.

Medicamē ex
colūbino ster-
core.

De pharmaco ex columbarum stercore cōfecto:
Columbarum turricularum sterCUS acre est: quo inte-
rim ruri sum usus in adoloscēte, nerui uulnere affecto.
Cuius sanē tum cōpositio, tū usus, idē est, qui medica-
mini ex euphorbio inest: alijs quidem eodem modo se
habentibus: sed euphorbij loco, stercore indito.

De medicamento ex herbis confecto.

Medicamē ex
herbis confe-
ctum.

Ex herbis etiam tenuium partium, amaritudinem
absq̃ astrictione, aut acorem modicum, referētibz gu-
stu, haud inidoneum ad uulneratos neruos confici me-
dicamen potest. Tales enim sunt dictamnium, amara-
cum, aristolochia, polium, argemone, chamæpitys, cen-
taurium, atq̃; id genus aliæ: quemadmodum etiam ra-
dices omnium aristolochiarum, dracunculi, cucume-
ris agrestis, bryonig, altheæ, iridis, acori, mei, asari, phu-
gentianæ, & panacis: quæ omnes, perinde ut collyria
arida læuigari in tenuissimum pollinem debent. Nam
quod crassa est substantia, neruis uulneratis conducit
nihil. Læuigatum autem medicamen, alio quod cerati

modum habeat, est excipiendum, idq; ea temperatura, quæ in euphorbio prius indicata est.

De sumptuosis pharmacorum cōpositionibus, vulneratis nervis congruentibus.

Medicamina
sumptuosa vul-
neratis nervis
congruentia.

Ijs autem qui odoratis & pretiosis oblectantur medicamentis, in hunc modum illa soleo conficere. Cinamomi, dictamni, mari, singulorum drach. xl. amara-
ci pauxillum. Hæc redacta in tenuissimum pollinem, cum cerato ex opobalsamo optimo, & cera Tyrrhenica facto confundo. Debent autem ceræ partes octo: opobalsami decem, in id ceratum coire. Adhuc etiam partem unā terebinthinæ odoratæ, ut medicamen non sit friabile, sed sibi mutuo cohæreat. Sed ex eodem cerato, & liquore cyrenaico similiter aliud medicamen compono: mistura pro portione euphorbio facta: tertiumq; aliud ex utrisq; temperatis cōflatum: quartum deinde, quod in se myrrhā stactem recipit. In quibus autem nervus est nudus, ibi ceratum ex cera quæ vocatur myreplice, & unguentis apud Romanos foliatis, & spicatis dictis, cōpono, duodecimā partem pōpholygis ei admiscens. Licet autem ex Tyrrhenica cera id conficere: quam solā nihil etiam prohibet ex nardo optima liquefacere, idq; in duplici vase, quod in omnibus unguentis sit cōmune præceptum. At raso cerato, spice nardi, amomi, folij malabathri, & elotæ pōpholygis, pares singulorū portiones miscebis. Etenim in pūcturis, acriora pharmaca ex usu sunt, quæ vulnus apertum conseruent. Denudatis autem, mediocri astrictione, cū digerendi uirtute, absq; morfu, p̄dita offerre cōuenit. At amomū, astrictiōnis cuiusdā est particeps. Magis autem ipso nardi spica, & malabathri folium.

Unguenta omnia liquāda esse in duplici vase.
Puncti nervi, qui nudi, acriora pharmaca possulant.

Quæ alij scripserint ad sananda nervorū vulnera.

Quidam nostræ ætatis Medicus utebatur medicamento, similiter meis confecto ex metallicis. Recipiebat enim ceræ, vnc. vj. olei, vnc. ix. misyos, drach. vj.

chalcitidis, drach. j. squame æris, vnc. ij. S. thuris, vnc. j. S. chalbanī vnc. j. cera & chalbanum liquata, metallicis aceto intritis superfunduntur. Porro si neruorum uulnera non comitetur phlegmone, molliora humidioraq; statim à principio sunt potiora medicamētis durioribus, ac siccioribus: præstatq; liquata ipsa in digerente quopiā, uel mitigatorio medicamine administrare.

Digerentia q.
Mitigatoria q.

Voco digerētia quidem uetus oleum, & ricininum, & sycionium: mitigatoria autem, rosaceum, chamæmelinum, & quod ex althea conficitur. His fortiora, eoq; durioribus corporibus magis idonea sunt, quod ex cucumeris agrestis radice oleo decocta exprimit: & quod ex iride, bryonia, & aro paratur. His ualentius est, ex dracūculo, aristolochia, et panace factū Nos frequēter usi oleo sumus ex abietis semine, populiq; flore pfecto.

Claudij Philoxeni Ægyptia, neruorum uitijis, alijsq; congruens affectibus.

Ægyptia Claudij
Philoxeni

Argenti spumę, cerę, sing. drach. lx. ammoniaci thymiamatis drach. lxxx. propoleos. drach. xl. resine sicce, terebinthing, squamæ æris, thuris, sing. drach. xviij. lanæ succidæ exustæ, squamæ stomomatis, sing. drach. viij. opopanax, drach. iij. ricini heminas tres. Conficito artificiosè.

Fuscum Andromachi, contra puncturas.

Ammoniaci, cere, terebinthinæ, æris cōbusti, sing. drach. viij. picis aridæ, drach. xl. lithargyri drach. iij. aloes indicæ, aristolochiæ, chalbanī, sing. drach. ij. eruginis drach. j. thuris, drach. ij. olei hyeme quartam heminae partem: æstate octauam: aceti tres cyathos, quibus ammoniacū dissoluatur. Conficito.

GALENI PERGA

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-
dum genera, Liber Quartus.



VANDOQVIDEM ex dyse- *Dysepuloticis*
puloticis quædam, saniei humorumq; *rum differētiis.*
ulceratis partibus influentium uitio,
agrè cicatricem admittunt; quædam
ipsa affecta sede influentem succum
quamlibet probum corrumpentes; iē-

cunda ratione ulcera dysepulotica & cacoethe ppriè
nominant; in quibus interim totam partem affectam
excindere, uel adurere nonnulli coguntur, aut medica-
mentis crustam inducētibus, aut igne utentes. Quum
autem ampla utrinq; latitudo sit, in eo q̄ alterum alte-
ro magis dysepuloticum malignumq; est, tot sanè de-
syderantur auxiliātia pharmaca, quot fuerint ipsorum
ulcerum differentia. Quare duo, ut minimum, quæ idē
polliceantur, eandemq; facultatem ostendant, differāt
tamē maximi minimiq; ratione, in promptu adesse illi
cōuenit, q̄ oia id genus ulcera cōstituerit curare. Cæte-
rū ubi nullus uitiosus succus ulceratas ptes infestat, ta-
le requiritur pharmacum, quod influentem quidē hu-
morem, repellat; infixum autem parti, discutiat. Atq̄
hæc sanè uires contrariæ præstant. Siquidem influxū
reprimunt astringentia: impacta digerunt, quæ trahen-
di potestate sunt prædita. Porrò quæ astringunt, maio-
ri ex parte exasperāt, atq̄ hac occasione molesta sunt.
Trahentia uerò ac digerentia ex alto humores, non ci-
tra acrimoniam id faciunt. Ac acrimoniam dolor ali-
quis necessariò sequitur, mordens ulceratam particu-
lam: unde influentes humores irritari contingit, ac p-
inde in ulcere phlegmonem excitari. Ex quibus liquet
medicamenta dysepuloticis, malignisq; ulceribus cō-

*Vicerib⁹ tot de-
syderari phar-
maca, quot ip-
sorū sunt diffe-
rentiæ.*

*Vlceratarum
partium, quas
non infestat vi-
tiosus succus,
curatio.*

Dyspeptoticis
congruentia me-
dicamenta, cur-
ant difficillima
inuentu.

grua, esse quod difficillima inuentu. Inuenienda tamen alia
qua eorum materia est, qua ulcus citra dolorem sicce-
scat; quod accurate fieri nulla ratione licet, ignorante me-
dico, quem effectum ad motum medicamen ostenderit.

Quippe ex erodente simul & astringente, ualidum
conficitur pharmacum. Caterum sordes humorque; ulce-
ri incumbens, pharmaci rosionem exoluunt. Itaque per-
pendendum est, quantum primus usus humiditatis ac-
sordium in ulcere desiccauerit: atque ita secundum, ter-
tiumque; uti illo debemus, donec siccum & purum ulcus
ipsum appareat. Vbi uero id tale conspexeris, ad aliud
medicamentum te conferes, eiusdem quidem speciei,
sed priore imbecillius. Scire autem oportet, medicame-
ta ipsa non alia ratione mederi ulceribus, quam quod in exul-
cerata particula eam siccitatem inducant, quam for-
tiebatur, quum se haberet secundum naturam: id quod
factum intelligimus, ubi neque tenuis amplius sanies in-
fluit, nec pus producit. Reuocanda igitur ad memo-
riam sunt ea que citra morsum exiccant: cuiusmodi com-
busta, & lota, acrimoniam, quam prius habebant, amitte-
re: ac proinde ipsis utendum esse, in hijs qui molli car-
ne sunt praediti, admodumque; ad sentiendum prompti,
necnon cacochymi. Nam in alijs corporibus illita etiam
usurpare licebit. Siccant igitur modice, Lemnia sphra-
gis, cadmiaque; praesertim que sponte nascitur: quam sub
gestiuo sole pluribus diebus ex aceto, aut uino giluo pel-
lucidoque; interens, exiccationem reddo. Chalcitis com-
busta, quam cadmia, ualentius siccant. Per se autem nec com-
busta, si administret, crustas excitat. Lotam igitur ip-
sam, deinde siccatum habere est satius. Minus enim lo-
ta quam combusta desiccant, tum longè mitior est, minusque;
mordax. Persimile huic medicamentum est etiam gru-
go combusta. Nam quae ignem non est experta, fortis-
simum medicamentum est, sicut chalcitis. Verum haec

Viceribus qua-
lione: medica-
menta medeant

Vita & lota,
medicamenta,
acrimonia, qua
prius habebant
amittere, ob id
quod ipsis utendum
esse in mollio-
ribus & caco-
chymis corpo-
ribus.

**Chalcitis cru-
stas excitat.**

nonnihil etiam astringit, et ea multo magis chalcāthū, *Chalcanthum*
quod inter metallica maximè siccāt. Misy autē & fori,
chalcitidi sunt cognata: tenuius tamē misy apparet, mi-
nusq; mordax & urens: crassius fori: & utrisq; siccāt
imbecillius: quemadmodum & stimmi maiore astringen-
di, siccandiq; uim, ac fori, possidet. Porro diphry- *Diphryges*
ges ulceribus ægrè humoris uitio ad cicatricem ueniē-
tibus, aptissimum medicamē existit: ualidè nāq; siccāt,
& si sit mordax modicè. Ad hæc præter acritum qua-
litate, tum potētiam, uim astrictoriam possidet. Iam
omnes differentiæ aluminis, ulcera satis exiccant, gene-
rosè astringentes: quare nemo solis ijs ad ulcera utat.
Igitur quæ plethora, uitiosaq; succo laborant corpora,
quæq; tenera carne prædita, & ad sentiēdum maximè
prompta sunt, facilè ex morfu, rosioneq; phlegmonē
contrahunt: quare mitiora medicamenta desyderant.
Cuiusmodi sunt sarcocolla, ichthyocolla, chrysocolla, *Siccantia citius*
plumbum ustum, fori, stimmiq; similiter etiam cōbu- *rosionem quæ*
sta. Insuper plūbi scoria, probè siccāt: quemadmodū *sint.*
ferri squama: quæ etiam abstergit, purgatq; unde pura
ulcera reddit: quod reliquæ squamæ nō possunt. Qua-
re si hæc omnia medicamēta arida ulceribus malignis,
contumacibusq; insperferis, mirificè uidebis citra ro-
sionem ea desiccari: sicuti ubi buccinorum testas con-
crematas, purpurarum, ostreorū, aliorumq; id genus
similiter adhibueris. Lapis etiam diaphanes, siue spe-
cularius dictus, leniter ac sine morfu exccat. Eiusdem
facultatis est uitrum ustum. Quinetiam Ægyptiæ spi- *Siccantia simul*
næ fructus, galla immatura, rhæon, malicorium, siccā *& astringētia.*
di & astringendi facultatem sortiuntur. Aristolochia
etiam, iris, acorum, artemisia, panacis radix, argemo-
ne, chamæleontis nigri radix, cyperus, dracunculus,
& gladiolus, affatim siccant. His euidentius adhuc cen-
taurium & polium: quibus paulo imbecillior est terra
cretrias dicta: uti ualētior, uocata ampelitis. Porro gru-

*Vlceribus con-
tumacibus ad-
uersari tū oleo-
sa, tum acria.*

go ignē non experta, calx uiua & illota, & molle aphro-
nitrum (quod re uera aphronitrum est) sola per se non
admouent ulceribus. Nihil autem nobis in prædictis
ulceribus tam euitandum est, q̃ tum oleosa & mollia
medicamenta, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ
scirrhos emolliunt; tum acria, ut piper, zingiber, sina-
pi, & alia id genus.

Medicamentis prædictis quomodo sit ur̃dum.

*Vlcera quom̃
sint tractanda.*

Vbi igitur siccum aliquod pharmacū ulceri impo-
nere est animus, sordes prius sunt exprimendę, molli,
puro, atq; sicco linteolo. Medicamento iam indito, pla-
tysma ex emplastro labris attenuādis cōmodo, extrin-
secus superdandum est. Huic rursus linamentum un-
diq; æquale foris injiciendum; cui spongiā ex aqua aut
uino tinctā applicabimus: quæ ut frigida maneat per-

*Deligatura vl-
ceribus qualis
sit adhibenda,
& quando sol-
uenda.*

petuò, per assiduum frigida fotum curabimus. Porro
deligatura ipsa in ulcere inchoanda est, atq; illinc du-
cenda uersus partes supernas: quam tertio quoq; die,
non singulis, soluere expedit. Tunc autem si ambiētes
uulcus partes aliquid phlegmones referāt, meo Phœ-
nicino emplastro liquato ex oleo, cui plurimum uini
astringētis permistum sit, externas platysmatis partes
q̃ latè imbuere expedit. * Verū non ex obuio quouis
oleo phoenicinum liquare oportet. Sed si rubor quidē,
atq; omnino caliditas dominetur in adiacentibus ul-
ceri partibus, ex aliquo astringentium atq; refrigeran-
tium id solues; cuiusmodi sunt myrteum, melinum, &
omphacinum. Sin durities aliqua conspiciatur, oleo ue-
teri, uel ricinino liquandū est. Tutius autem fuerit, uel
si nihil in ambiente uicis loco uitiosi appareat, super-
positæ regioni ipsum medicamē apponere, ut repellat
si quid prius uel prauū, uel plus q̃ par est, influat: ma-
ximè quum in crure ulcus oborium, superpositam ha-
bet uaricem. Quę dum sanguine melācholico turgēt,
excidenda uenit: quāuis iuxta excisionem ipsius, ulcus

*Repellentia eē
applicanda re-
gioni suprapo-
sitæ ulceri.
Varices quan-
do excidendæ
sint.*

malignum & contumax interdum oriri solet. Igitur in id genus uitij præstat, uiribus egri consultis, à sectione uenæ auspicari: dein pharmaco purgare melancholicum succum, simulq; etiam pituitosum uacuare: quoniam is quoq; interdum unà cum melancholico influit, dum uarices gignuntur. Postea uenam ulceri suprapositam in longum scarificare cōmodum est. Vbi abunde uacuaris, ei ipsi uenæ sectæ, prius medendū. Postq; exacte iam cicatricem uidetur recipere, tunc aggredere maligni ulceris curationem. Jam uerò lien nonnūq; malè affectus, uitiosi talis humoris est author: sicuti & iecur: quibus ubi in primis consultum fuerit, sic tandē accedere ad curandū ulcus, oportet. Pari modo si uniuersum corpus plethoricum, cacochymum uel existat, id prius uacuare, expurgareq; expedit, q̃ ulceri medicamentum admoueas. Cui quidem dum mederis, à ualērioribus absterforijs pharmacis ad mitiora, lenioraq; digredere, si ulcus adamussim esse purū uideatur: quē admodum in sordidis ad magis abstergentia transire conuenit, nisi ex rosione medicamenti sint facta sordida. Sæpe siquidem ab acri medicamēto colliquata & soluta caro, in uitiosam saniem degenerat. Cæterū cuitas ulceris maior, oraq; rubentiores, & calidiores effectæ cernuntur, quum ob medicamenti acrimoniā ipsæ sordes acrescunt.

Compositio emplastrorum.

Quandoquidem malignorum & difficulter admittentium curationem, ulcerum, summus scopus est, ut medicamentum citra morsum exiccet, aqua uerò & oleum maximè omnium humectant, ab eis abstinere oportet. At cera deligenda est recens & pinguis: qua in sole emollita, aut apud ignem subacta, et in calidam aquam immersa, arida medicamenta prædicta excipimus. Mediocre autem medicamentum fiet, si quarta pars metallicorum ipsi ceræ adiiciatur: ualētius autem

Vlceris cui uarix incumbit, curatio.

Sordes ab acri medicamento excitatæ, quomodo discernendæ ab iis quas vlcus, propria ratione, produxit. Vlceribus contumacibus, cur oleum & aqua aduersentur.

Viceribus con-
tumacibꝫ phar-
macum tempe-
rati describit.

si tertia. Etenim quum haud exiguo discrimine inuicē corpora differat, unum omnibus medicamentum rectē pręparari non potest. Erit ergo temperati phar-
maci compositio huiusmodi. Vtriuſq; æruginis, æris
æbusti, ſing. drach. j. aluminis ſciſſi, drach. ſ. cere, dra-
ch. x. conficito. Minus autem mordebit ſi loco alumi-
nis, integrā diphrygis drachmā adijcias. Quod ſi expur-
gare ſordes conſilium ſit, ſic conficiemus. Aeris, æru-
ginis uſtæ, diphrygis, ſing. drach. j. æris ſquamæ, dra-
ch. ſ. ceræ pinguis, drach. x. miſceto. Cæterum ſi cera
ipſa ſit ſiccior, emollienda eſt aliquo aſtringente oleo,
uel larice, uel terebinthina.

Ad chironia & difficilia ulcera medicamen-
ab Aſclepiade proditum.

Viceribus dif-
ficilibus, phar-
macum Aſcle-
piadis.

Æris ſquamæ, vnc. j. æruginis raſæ tantūdem. ce-
ræ ſelibrā. reſinæ laricis, vnc. ſ. Quæ liquari poſſunt,
aridis affunduntur: quibus exceptis, ac curioſè emolli-
tis utitor. Cæterum platysma exiguum ſoli affectę par-
ti, ut ulcus tantum comprehendat, imponito. Ambien-
tes autem particulas pharmaco quod phlegmonem ar-
ceat, circundare oportet. Inter curandum tertio quoq;
die ſoluere: dein fomētis mitigare: ipſumq; emplaſtrū
quod platysma uocatur à latitudine, abluendo emol-
lire, ac rursus imponere, donec cicatricē inducere inci-
piat. Ego certē Attico nonnunq; æſypo ceram tempe-
raui. Meminiſſe autem oportet, qualitates omnium ul-
cinatorum corporum, mutuo in ſe agere: etiamſi alterū
ipſorum multo ualidius ſit. Vnde proceſſu temporis
quodammodo euadunt ſimiles. At ubi qualitas medica-
menti curando corpori ſpecie ſimilis fuerit, maior uti-
litas ſequitur. Porro diphryges, ſi uel ſolum inſperga-
tur ulceribus quę difficulter cicatricem admittunt, p-
bè illis medetur: item & æs combuſtum. Aerugo autē
exedit atq; mordet inſigniter. Itidem calx ignem non
experta, quū inſigniter mordicet, exigua portione alijs

Vicinarū cor-
porum qualita-
tes in ſe agere
mutuo.

Æruginis fa-
cultas.
Calcis vires.

medicamentis à nonnullis miscetur. Extincta medio-
cre est pharmacum. Elota prorsus lene & mordacita-
tis expers.

Pharmacum ad mitiora ulcera cicatrice inducēda,
ab Andromacho scriptum. Cadmieg tosta, lib. j. chal-
citidis usta, tātūdem. ceræ lib. iij. resinæ aride, lib. iij.
myrtei, lib. iij. Vinum miscetur aridis. Quum autem
ad maligniora ulcera ualentioribus utēdum remedijs
sit, ut imbecillioribus ad mediocria: aliud medicamē-
tum subdā, quo utor ad dysepulotica. Aeruginis, &
squame, sing. vnc. j. ceræ vnc. viij. misceantur. Si igi-
cauum sit ulcus, indito medicamento repleatur. Post
hoc rursus aliud platisma super accōmodabitur, quod
& labra comprehendat. Huic deinde linteus frigida
madens tātus undiq; obijcitur, ut medicamentum oc-
cultet. Postremo spongia mollis, fascia ex linteo exce-
pta, uel semel, uel bis, affectā partem orbiculatim am-
biente, tantæ magnitudinis, quo totum ulcus cum la-
bris, ac superpositorum ipsis aliquid, subiectorumq;
complectatur. Deligatio autem ipsa à duobus initijs
fiat. Vocāt sic quoties tota pars media uinculi affecto
loco incumbit: utrūq; autem crus in oppositam regio-
nem deducitur. Vbi hæc primo die peregeris, altero
aquam frigidam per spongiā irrigato. Si ambiens aer
calidus & siccus fuerit, his hoc ter'ue in dies singulos
est faciendum, ac deligatura tertio quoq; die soluen-
da: per hyemem, quarto. Affectus autem ipse indica-
bit, num fortius, uel mollius, uel simile sit imponendū
pharmacum. Emollies ipsum paululo myrtini, aut ro-
facei, aut melini, aut lētiscini, aut mastichini, aut cypri-
ni instillato: Validius reddes, aliquid squame, aut eru-
ginis addens. Aliud ad obducenda dysepulo-
tica aptissimum. Chrysocollæ, squamæ, sing. drach.
ij. ceræ drach. vj. diphyrgis, drach. ij. lithargyri, drac.
viij. Confundito. Aduertendum autē est, mitia phar

Vlcera mali-
gniora, valen-
tioribus egent
remedijs, imbe-
cillioribus au-
tem, mitiora.

Deligatio ex-
ulceratis parti-
culis q̄lis mo-
lienda sit.

Mitissima medica
menta quae sint.

maca mihi dici sarcocollam, chalcitidē uſtam, æs, eruginemque; combuſtam, atque chalcanthon: quæ ignem nō experta, acris omnia ſunt: combuſta, moderata: lota poſt combuſtionem, lenia, roſionisque; expertia.

Aliud mitiſſimum. Eloti plumbi, drach. ij. ſpodij, cadmiæ, diphrygis, ſing. drach. iij. terebinthinæ, quæ excipiuntur, drach. vj. Zeno addit chalbanī drach. ſ. Etenim ſatius eſt modica portione miſceri pharmaca id genus, quum nimirum conſeſtim ſibi ſaxeam duriciem contrahant. Porro in hiſce omnibus, illa quæ liquari poſſunt, liquefacta et refrigerata, abraſaque; ſiccis diligenter redactis in pollinem, admisceo. Nam ſi liquida ipſis affundas, in grumos concreſcent: maximè ubi inualuerit frigus. In ſole autem ſeruenti ſi miſtura fiat, licet ea ſuperfundere, mouēdo rudicula primū: dein, cochleario: præſtat tamen ad omnia hæc, ramuſculus palmæ.

Aliud ad deſperata ulcera, ex collectaneis Primionis. Soreos drach. xxij. aluminis (ciſſilis, malicorij, calcis uiuæ, ſing. drach. xvj. thuris, drach. xxxij. gallæ omphacitidis, tantūdem. ceræ, drach. cxx. ſeui uitulini (aut eius loco, adipis porcini & uetuſti) drach. lx. olei ueteris heminam. Conſcito. Porro ſori, alumen, malicorium, galla, non digerendi facultate, ſed aſtringendi eximia, ſunt prædita. Etenim ſub-aſtringentium genere continētur auſtera & acerba: ſed illa quidem aſtringunt mediocriter: hæc autem, hoc eſt acerba, uehementer. Omnia igitur aſtringentia contrahunt, ac denſant meatus, uinciuntque; & continent partiū ſibi cohærentium ſubſtantiā: quo fit ut altius ipſorum uirtus penetrare non poſſit, niſi ab alijs acris, atque ſubtilium partium ducantur: id quod ipſis calx in præſcripto medicamento præſtat. At uerò induratis ulcerum labris multò utiliſſime medulla ceruina adhibetur: quæ ſi non adſit, uitulina. Porro inueteratum oleum ab adipe ſuillo (quem oleo communi liquatum inſtitores pro

Aſtringēs eſſe
genus cōmune
auſteri & acer
bi.

Aſtringētū fa
cultas.

oleo uendūt) ex odore & consiltētia discernes. Vtrūq;
tamen inueteratum, rosionem quandam acquirit: quo
nomine ad ulcera præter modū maligna conueniunt.
Talia enim appello, in quibus aut pars affecta tam ui-
tioso habitu est prædita, ut uel optimum sanguinē, qui
nutritionis gratia confluit, corrumpat: aut id quod in-
fluit, adeo puersum existit, ut etiam si pars rectē se ha-
beat, ab ipso tamē solo erodatur. Igitur ut citra ratio-
nalem methodum medicamenta componere, ita uim
illorum certō & accuratē cognoscere sine experientia
nemo potest.

Vicera mali-
gnantis nature
quæ sint.

Epuloticum *δρε λαδάνου* à Critone conscriptum:
quod prætumidis, durisq; & cauis ulceribus cōuenit.
Picis aridæ, drach. C. eruginis rasæ, drach. xxiiij. æris
combusti, drach. xv. squamæ rubræ, drach. xxiiij. lada-
ni, vnc. ix. argenti spumæ, lib. iij. olei sextarium. j. S.
Etenim arida pix euidenter siccatur. Calfacit autem mo-
dicè: ob idq; pus mouentibus medicamentis miscet.
At quum aliquid calidum, frigidū, humidum, aut siccū
dicimus, cum optimo corporis temperamento id con-
ferimus. Igitur cauum & purum ulcus, à mediocriter
siccantibus medicamentis curatur: sordidum uerò &
malignum, & oris duris & prætumidis quidē, sed car-
ne iuxta cutem fluida, ualidissimè siccantia requirit.
Verū quæ metallica, ut siccant sine ullo morfu, præ-
paras, coquere diutius oportet. Sic siquidē magis sic-
cant, ac minus erodunt. Porro ladanum ipsum solum
ex uino tritum, ulceribus ægrè ad cicatricem uenien-
tibus auxiliatur.

Epuloticum.
Critonis ex
Ladano & fa-
Picis aridæ &
calceates.

Vicus caui &
puri, a quibus
sanetur medi-
camentis.
Metallica diu-
tius cocta, ma-
gis siccant, &
minus erodunt.

Medicamen ex chamæleonte à Critone descriptū,
inducens cicatricē periculosis & callosis ulceribus.
Lithargyri drach. C. ceræ, drach. L. æruginis drach.
xxiiij. chamæleontis, drach. xi. olei minam. conficito.
Ego tamen huiusmodi emplastris adijcere lentisci-
num consueui: quod emolliat non nihil, digerat, &

Medicamē Cri-
tonis ex cha-
mæleonte.

Lentiscini olei
facultas.

astringat, quæ omnia, difficilia ulcera cum labris induratis, desyderant.

Aliud Heraclidis Tarētini aduersus ulcera uetera. Squamæ drach. j. æruginis rasæ, drach. iij. excipiantur drachmis octo myrtei cerati. Misce. Etenim metallicorum facultas à quouis cerato resoluitur.

Aliud. Squamæ tritæ acetū affundito, eamq; sub caniculæ exortu, læuigato usq; ad crassitudinem mellis: uel etiam incoquito. Postea exiccata, redactæq; in puluerē, cerati partes octo misceto. Valet aduersus recētia uulnera, & ulcera inueterata. Licebit etiam ad ignem exiccare ipsam squamam, si alio tempore medicamen id conficiamus. Porro subtiliora fiunt quæ ex aceto læuigantur: atq; ob id melius purgant, attenuant, & siccant. Verūm ad cicatricem inducendam sunt ex uino trita meliora:

Subtiliora fieri
quæ læuigant
aceto: quæ ex
uino, magis ci-
catricē obdu-
cere.

Aliud Andromachi cicatricem ducens.

Ossium ustorum, drach. ij. mannæ, drach. j. cadmię, obolos. iij. tritis utitor.

Aliud eiusdem quo malignis cicatrix inducitur. Piceæ corticis drach. vj. cornu ceruini uisti drach. iij. cadmię drach. xviij. manne, drach. iij. æruginis rasæ drach. ij. siccis utitor.

Aliud ad excreſcentia ulcera, cicatricem absq; morſu ducens. Sandarachæ, chrysocollæ, arsenici, singulorū partibus æquis cōfufis, aridisq; utitor. Ad vlceribus callus obduci non potest. Ex Archigene.

Archigenis ad
ulcera cōrūma-
cia, remedia.

Cōmuni quodam oleo expurgatis, uetustissimū cum linamentis imponitur. Ærugo rasa cerato rosaceo, qd paulū resine habeat, excepta, imponitur. Item squame æris rubri q̄ plurimū cerato myrteo exceptum usurpatur. Eiusdem ad putrida & nomas.

Sori crassiusculè tritum, inspersumq; cōducit. Vel aristolochiam rotundam, & gallam, æquali pōdere ex oleo inungito. Vel cucumeris agrestis radicē cum folijs illigatam calido cinere recondito: quum autē emol-

lierit, contritam imponito.

Eiusdem ad cancroſa.

Cācri fluuiatilis uſti, & cadmie, pares portiones tri-
tas inſpergito. Vel cinerem cancrorū cum cerato im-
ponito.

Eiusdem ad calloſa.

Nitrum torrefactum & calcem uiuā cum lotio pue-
ri impubis læuigata circūlinito. Conferunt etiam cau-
ſtica medicamenta

Andree empla-
ſtrum faciens
ad excreſcētia
vicera.

Andree emplaſtrum ab Aſ-
clepiade ſcriptum, oēm excreſcentiam reprimēs, atq;
arcens inſlāmationem. Argenti ſpumæ lib. iij. ſqua-
mæ gris, chalcitidis, eruginis raſe, ſing. vnc. vj. aceti he-
minam: olei ueteris. lib. viij. miſce.

Aſteris medi-
camen ad idem. Lithargyri, lib. j. olei ueteris lib. ij. S.
æruginis, chalcitidis, ſquamæ rubræ, ſing. vnc. j. aceti
heminam. Conſcito.

Aſteris medi-
camen.

Iſis emplaſtrum ruſum.
ad fluida, diuturna, & maligna ulcera. Argenti ſpu-
mæ drach. C. miniſ ſinopici drach. viij. diphrygis, ce-
ræ, chalcitidis cōbuſtæ, ſing. vnc. j. chalcitidos crudæ,
drach. ij. olei heminas. ij. conſcito ut decet.

Iſis emplaſtrū.

Aliud ſcribonij Largi, ad eadem accommodatum.
Cere drach. C. lithargyri drach. L. olei myrtei hemi-
nam. j. miſyos cōbuſti, chalcitidis uſtæ, aluminis ſciſſi
uſti, ceruſſæ, reſinæ terebinthing, ſing. drach. xij. ꝑſcito.
Aliud ex chamæleonte, ab Aſclepiade ſcriptum ad flu-
entia & ægrè curabilia ulcera. Lithargyri lib. j. olei
ueteris lib. ij. chamæleontis radicis, trientem, ariſtolo-
chiæ tantundem. chalbani, vnc. ij. gallæ vnc. ij. thuris
tantundem. Conſcito.

Aliud ab Aſclepiade
ſcriptum ad ulcera quæ uix curationem recipiunt.
Squamæ æris, æruginis raſæ, ſing. vnc. j. ceræ ſelibrā.
reſinæ laricis vnc. S. conſcito.

Decleontis
cephalicon ab Aſclepiade ſcriptum, à quo educuntur
oſſa corrupta. Æris ſquamæ, mannæ, thuris, reſinæ
ſicce, ſing. drach. C. aceti heminas. xij. Terito ſquamā
ex aceto, & quum læuis facta fuerit, thus in pollinem

Cephalicū oſ-
ſa corrupta
educens.

redactū adiūcito resinamq; atq; pastillos fingito: quorum assiccatorem in umbra miscēs partem unā cum cerati ex rosaceo confecti pari portione, ipsa utior.

Aliud Hygieni scriptum ab Hera, utile ulceribus ægrè ad cicatricem uenientibus, necnon paronychijs. Lithargyri Chrysitidis, ceræ, sing. minam j. chamæleontis nigri radice, drach. xvj. eruginis rasiæ, drach. xviij. chrysocollæ, drach. xl olei heminas. iij. conficito ut decet.

Aliud egregium. Ceræ, picis, bituminis, sing. lib. j. manne, eruginis, gallæ, spine Aegyptiæ, iridis Illyricæ, aristolochiæ rotundæ, chalcanti, singulorum. vnc. iij. aristolochiæ lōgæ, æris combusti, utriusq; vnc. ij. conficito. Aliud. Bituminis, aluminis liquidi, sin. lib. j. picis, resine pityinæ, ceræ, sin. lib. ij. mali terre rotundi, gallæ, spine Aegyptiæ, sing. vnc. viij. malicorij, æris usti, mannæ, mali terre longi, sing. vnc. iij. olei ricinini, aut ueteris, lib. ij. conficito pro dignitate.

Aliud quo utor in molli carne peditis. Ceræ lib. j. rosacei tantūdem. cerussæ vnc. viij. salis ammoniaci, vnc. iij. squamæ Cypriæ vnc. ij. thuris, calcis uiuæ, aluminis, eruginis, malicorij, sin. vnc. j. conficito diligēter.

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera. Liber quintus.

Pharmaca ad multos vsus utilia, ex contrarijs constare.



Qualitates primæ & secundæ quæ dicantur.

POLYCHRESTA medicamēta, siue ad multos usus utilia (de quibus agere in presenti cōmentario est animus) ex cōtrarijs pharmacis constāt, etiam iuxta qualitates secundas: non tantū primas. Etenim primas appello, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatē: tum ex harum coniugatione compositas: secundas autem,

tem, quæ has ipsas primas sequuntur.

Ex ijs est emplastrum descriptum ab Hera, boni coloris, epuloticum, glutinans, implens, ualensq; ad chironia ulcera: cuius temperies est talis. Cerg lib. ij. phrycteg, lib. iij. eruginis rasæ vnc. vj. mannæ, vnc. iij. olei heminas. v. aceti sextarium. conficito.

Panacia Herg, ad omnem malignitatem ulcerum mirè cōducēs. Rumpit atq; dissoluit quicquid corruptū est: omnem sanguinis eruptionem supprimit: hæmorrhoidas ipsas consumit & tabefacit: omniq; ulceri imposita, quāuis agresti, mitius ipsum statim reddit. Chamepityos, chamæleōtis, symphyti, marrubij, sing. drach. iij. polij. centaurij tenuis, sing. drach. vj. Helenij, aristolochiæ, sing. drach. iij. thuris, drach. xij. S. myrrhæ, drach. iij. aloes, drach. vj. chalbani drach. vj. obolum unū. olei drach. clxxx. mellis drach. xxx. propolis drach. xij. S. aluminis scissi, terebinthinæ, chalcitidis sing. drach. vj. obo, S. bituminis, terræ ampelitis, lithargyri, sing. drach. L. gallæ & pulueris iridis, sing. drach. iij.

Conficito diligenter. Porro marrubio uel solo uti etiā queas in ijs qui carnem abundè humidam & sordidā circa ulcus habent. Helenion uerò haud item conuenit solum inspersum: sicuti nec aliud quoduis acre.

Nosti siquidem acria irritare, mordere, calfacere, & fluorem concitare ad affectas particulas: amara uerò exiccare citra morsum atq; calorem: eoq; exulceratis conducere. Iam uerò thus concoquit & pus mouet in tēperatis naturis: nam in corporibus humidioribus, carnē producit. Nullum autē eorum quæ concoquūt, ac pus mouēt, ualēter digerēs est, sicuti neq; acre. Sigdē eiusmodi mediocriter excalfaciunt: emolliuntq; magis, q̄ exiccent. Oleū lenit, ac ualida pharmaca obtundit. Terra ampelitis tum siccatur, tum digerit. Chalbani emollit, concoquit, lenit, atq; dolorem sedat: quas uires thus, licet imbecilliores, sortitur. Terebin-

Panacia Herg.

Acriū facultas
Amara cur ex
ulceratis con-
ducant.
Thuris facul-
tas.

Pus mouentiū
facultas.
Olei facultas.
Chalbani vi-
res.
Terebinthina.

Bitumen.

Propolis.

Mel non putre-
scit, putrescenti-
busq; maxime
congruit.

Putredini quæ
sunt aptissima.

thina detergit, discutit, & quodammodo concoquit. Bitumen cum calore non admodum uehementi, etiã siccatur. Propolis attrahit. Mel siccatur, & digerit, putrescentibusq; est maximè congruens, ex ijs existens, quæ minimè computrescunt; quare composita huiusmodi à putredine seruat, præter q̃ extremè ad putrescendum prompta, quæ humida sunt & calida. Myrrha & aloë citra rorsionem siccant. Cæterùm aloë astringit; myrrha tenuiorum est partium, magisq; siccatur.

Isis Epigoni,
ad multa uilè
medicamen.

Isis Epigoni ab Hera traditum. Valens cōtra omnia uulnera, puncturas neruorum, hominumq; atq; canū morsus. Venenū à bestijs illapsū extrahit; curat fracturas artuū cum uulnere, fistulasq; & omnes abscessus sanat; atq; omnem fluxionem sistit. Cera drach. C. terebinthinæ drach. cc. squamæ rubri eris, æruginis rase, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ, sing. drach. viij. aluminis usti, drach. vj. eris usti, drach. viij. myrrhæ, drach. xij. chalbanī tantūdem olei ueteris heminam. aceti acris heminas. ij. conficito. Etenim hoc medicamine Epigonus conclusus in carcere, curauit quendam ex ualde potentibus, unde cōfestim dimissus est. Ego uerò prædictis etiam radicem dracunculi adiicio; quæ uel per se, in orbiculos secta, assiccataq; & redacta in pollinē, si inspergatur, malignis ulceribus auxiliatur.

Emplastrū ex
dictamno ad
multa uilè.

Emplastrum ex Dictamno ad eadē faciens. Olei ueteris heminas. ij. lithargyri drach. C. æruginis rase drach. viij. squamæ drach. vj. colophonix liquidæ drach. L. mānæ drach. xij. ammoniaci thymiamatis drach. xxvj. æris combusti drach. viij. diphrygis drach. vj. gentianæ tantūdem. aloes drach. viij. chalbanī drach. xij. propolis drach. viij. ceræ drach. xxv. aristolochiæ drach. x. dictamni Cretici tantūdem. Conficito accuratissimè.

Emplastrum ex utraq; aristolochia, cephalicū enæ-
mum, callosis ulceribus congruens, atq; articulos solu-

tos confirmans. Picis, cere, bituminis, terebinthinæ, sing. lib. j. manna, æruginis rase, ceruffæ, sing. scilibrā. chalcāthi, aristolochiæ longæ, iridis Illyricæ, sing. vnc. iij. malicorij, gallæ imaturæ, æris combusti, sing. vnc. ij. spinæ vnc. iij. aristolochiæ rot. drach. iij. aceti hemi nam. Ricinini, uel olei cōmunis tantundem. conficito.

Porro manna, exiguam astringendi uim possidet. Vocant enim sic quod à thure excutitur, non nihil etiam illius corticis obtinens.

Emplastrum Azanite, malignis ulceribus, necnon ambustis conueniens. Picis aride, vnciā; cere, adipis suilli, seu taurini, cæsypii, sing. vnc. iij. resinæ piceæ, vnc. v. conficito.

Emplastrum Haliei ex sinopide nihil minus quàm priora utile. Cere, lithargyri, utriusque minam manna, terebinthinæ, chalbanī, sinopidis, sing. drach. viij. olei ueteris heminas duas. Conficito.

Emplastrum Machæronis à Critone descriptum, phlegmonem arcens, mireque conducens ulceribus. Aristolochiæ rot. chalbanī, opopanacis, æruginis, iridis Illiricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sing. vnc. j. terebinthinæ, vnc. viij. S. cere, vnc. lx. S. olei omphacini vnc. viij. S. conficito.

Emplastrum ex salicibus à Critone in multos usus descriptum. Misyos, chalcitidos, æruginis, ceruffæ, galle, aluminis scissi, & rotundi, crete sutoriæ, sing. vnc. vj. cere, resinæ pityng, picis, bituminis, salicis foliorum, singu. vnc. ij. olei heminas. ij. vnc. iij. chalcāthi vnc. vj. malicorij tantūdem. aceti sextarios sex. conficito.

Emplastrum uenatorum, ad quadrupedum ictus, morsusque, & ad reliqua uenenata, Argenti spume, minam olei ueteris, squamæ æris rubre, cere, resinæ phrycæ, sing. lib. ammoniaci thymiamatis, trientem. chalbanī, minij sinopici, sing. vnc. ij. conficito.

Viride Alcimionis, conueniens fistulis, educens ossa, & strumas discutiens. Chalbanī drach. xvj. æris usti, drach. viij. squamæ, drach. xxij. cere

Māna quid sit

Emplastrum
Azanitæ.

Emplastrū Ma
chæronis.

Viride Alci
mionis.

drach. l. seui caprilli, uel uitulini, drach. xxx. thuris, resinae siccae, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, nitri, aristolochiæ, sing. drach. xxv. bryoniæ, drach. xij. orcheos drach. xij. iridis aridæ, drach. iij. aloes Indicæ, drach. xij. scissilis, drach. viij. fellis taurini, tantūdem. aceti, olei, utriusq; heminam. conficito.

Viride ad herpetas, & ad chironia ulcera ab Andromacho scriptum. Hordei combusti drach. x. æruginis drach. xx. cere, drach. lxxx. cyprini heminam. Ceterū hoc medicamen eruginem multam continet. Porro cōbustum hordeum, uel si per se inspergatur, chironia ulcera iuuat.

Pastilli Aristarchi.
obi.

Pastilli Aristarchi πολύχρηστοι, hoc est ad multos usus. Nam præter alia, utiles sunt in principio phthificis, lienosis, cœliacis, & dysentericis, tribus obolis in potu datis. Myrrhæ, drach. vj. croci, crocomagmatis, sing. drach. iij. citinorum, chalcanti, aluminis scissilis, aloes, singu. drach. vj. excipiantur uino Falerno, singanturq; orbiculi, & assiccati in umbra seruentur.

Polyidæ Sphragis. Malicorij, drach. vj. myrrhæ, drach. viij. aluminis scissilis drach. v. thuris, drach. iij. chalcanti, drach. iij. fellis taurini drach. vj. Vino dulci excipiuntur.

Pastillus Threpti ad aures pure fluentes, carnis excrescentias, & narium ulcera. Malicorij drach. x. gallæ omphacitidis drach. viij. aristolochiæ tantūdem, aloes drach. iij. myrrhæ, drach. viij. fissi drach. ij. thuris drach. iij. passo excipiuntur.

Pastillus diarrhœon.

Pastillus δια τῶν χυλῶν ad nomas & scabiosos affectus. Licij indici, aloes Indicæ, myrrhæ, eris, aluminis scissi, citinorum, thuris, sing. drach. iij. succi myrti, hemine dimidium. conficito.

Pastillus niger: quo utor. Malicorij drach. x. aristolochiæ, gallæ, sing. drach. viij. aluminis fissi, aloes, sing. drach. iij. myrrhæ, chalcanti, sing. drach. ij. thuris drach. iij. Vino excipiuntur: & quum res exigit, uino dulci diluuntur.

Ad erysipelata. Acaciæ drach. viij. misyos drach. iij.

opij drach. ij. thuris drach. iiij. cum aceto excipiuntur. Faciunt etiam ad herpetas. Ad herpetas, Tiberij Cæsaris. Diphrygis, meconij, aluminis fissi, acacie, sing. vnc. iij. aceto uel aqua diluens, utitor.

Aridum putrefaciens absq; morlu, ex descriptione An dromachi. Sandarachæ, arsenici, singu. drac. ij. calcis uiuæ, drach. iiij. tritis utitor. Pastillus sanguinem

Putrefaciens
absq; morlu.

comprimens. Chalcitidis, misyos, manne, sing. dra- ch. iiij. tritis utitor. Ad ani uitia, alumine liquido

nucis magnitudine cum mellis cyathis duobus cocto utitor. Aridum cephalicum ab Asclepiade scri-

ptū, quod tollit squamas, ossa corrupta educit, & caua implet. Iridis Illyricæ, panacis, sing. drach. iiij. aristo lochiæ, drach. ij. manne tantūdem. contusis cribratisq; utitor.

Aridum Asclepiadis, cicatricem indu- cens. Calcis uiuæ, drach. vj. mannæ, thuris, squamæ, sing. drach. iiij. redactis in pollinem utitor.

Crustas inducens. Asclepiadis. Chalcitidis crudæ, cadmiæ, sing. drach. iiij. ieiunus ex salua excipito.

Medicamen Dia tessaron. Chalcitidis tostæ, misyos tosti, diphrygis, chalcæthi, sing. drach. iiij. Ad nomas Asclepiadis pharmacum. Sulfuris uiui, auripigmenti, squamæ, sing. drach. j. æris cōbusti, quātū color exigit.

Medicamē dia
tessaron.

Arido et ex melle utitor. Etenim putrida ulcera, quum ambientes partes depascunt, nomas propriè appellāt. Qui affectus uehementis simis medicamētis indigent: ut sæpe in eis etiam cauterijs utamur.

Nomæ qualia
ulcera sunt, &
qualia medica
mēta postulat.

Apellis medicamentum διαχρηστικόν, quod nomas non solum sistit, sed incipientes prohibet. Chartæ combu stæ, plumbi usti, æris usti & loti, arsenici, squamæ sto- momatis, singulorum equas portiones. sulfuris uiui, di- midium: tritis utitor, uel cum melle, uel ex rhodino.

Medicamē ex
charta combu
sta, nomas cō-
pescens.

Ad carbunculos. Nitri rubei, arsenici, sandarachæ, chalcitidis, atramenti sutorij, diphrygis, singulorū pa- rem mensuram aceto læuigans, exiccansq; postea eis

Carbunculus
quid, & quali-
bus egeat me-
dicamentis.

tritris utitor. Etenim carbunculus ulcus est crustam cō-
to cum ualida phlegmone circumstantium particularū
excitans: ad eò ut febres uehementes, & extrema peri-
cula inferat. Quare ipsi crustę ualidum medicamentū
imponere expedit, & ex ijs quę ad nomas conducunt.

G A L E N I P E R G A M E N I D E C O M P O S I T I O N E M E D I C A M E N T O R U M S E C U N -

dum genera, Liber Sextus.



P N PRAESENTI cōmentariō
ad eā πολύχρηστα, hoc est multi usus
medicamenta me conuertere est ani-
mus, quæ tum ad alia multa singula-
tim faciunt, tum ad putrescentes par-
ticulas, aliter quidem affectas q̃ illa ul-
cera, quę difficulter curabilia appellantur. In putrescē-
tibus siquidem, ipsa putredo uagat̃: ob idq; tales dis-
positiones cōplures Medicorum νομάς, hoc est, depa-
sitiones appellant. In illis autē, affectus secundum unū
locū est circumscriptus: absq; ulla putredine: ita ut pha-
gedonē uocet̃, exedant quidem partes uicinas, non ta-
men putrefaciant ipsas, nec febres inferant, quę conse-
qui ad depascentes affectus cum putrilagine, cōsueue-
runt. Hęc igitur quę nunc scribentur omnia, mordacia
sunt, si quis ipsis solis nō cerato temperatis utatur. At
quæ cerato miscentur, purgare quidem ulcus sordidū,
& carne replere possunt, atq; etiam duritiem quādam
& tensionē discutere: non tamē difficilia curare. Quo-
circa tum plurimū cerati miscemus medicamētis acri-
bus, quum ulcus purum & siccum est: corpus autē
curandum, & molle, & ad sentiēdum promptum: pau-
cissimum uerò, si ulcus quidem ipsum sordibus, humi-
ditateq; redundet plurima: egri autem corpus sit durū,

Nomæ.

Phagedonē.

Cerati plurimū
quādo acribus
medicamentis
miscet̃, & quā-
do contra, pau-
cissimum.

& parum sensile.

Anicetos Critonis, quasi di-
cas insuperabile pharmacū. Extrahit, rumpit, purgat,
glutinat, pus educit, duritias discutit, lassitudines lenit,
fracturis cum uulneribus auxiliatur, curat hominum
atq; ferarum morsus, ad innumeraq; alia conducit.

Anicetos Cri-
tonis.

Squame æris drach. lviij. pyrethri, staphisagrie, cocci
cnidij, sinapi seminis, cachryos, columbini stercoris,
aristolochiæ tenuis, gruginis, cyperi, eruce seminis, cu-
mini, singulorū drach. xvj. nitri, salis ammoniaci, sing.

drach. xxxij. baccarū lauri, mannæ, iridis, sing. drach.

cxx. aceti acris sextarios sedecim. decocti caricarum

cyathos. iij. & S. Tusa cribrataq; omnia simul cum

aceto sub æstu caniculæ laeuigantur. Vbi siccum & ui-

ride euaserit, sicuum decoctio adijciitur, & simul emol-

lita tolluntur, & in olla æris rubri asseruantur. Vteris

autem una ipsius medicamenti parte aceto diluta, usq;

ad consistentiam sordium, permista sex resine portio-

nibus, cui nonnihil cere sit temperatum. Scribitur etiā

impetigini agresti congruere. Sic enim uocant, quæ à

medicamentis imbecilliter siccantibus nihil iuuatur:

Irritatur autem à ualidis. Porrò caricarum decoctum

lenissimum est, & maximè concoquit, simulq; digerit.

Acetum uerò, efficaciam aliorū medicaminum iuuat.

In quo quidem quæ macerantur sub sole gſtiuo, tenuē

substantiam acquirunt, eoq; altius uirtus ipsorum pe-

netrat. Emplastrum Serapionis, contra omnia

uulnera, punctus, et parotidas maximè ualens. Educit

etiam pus, glutinat, seniliaq; & chironia persanat.

Olei ueteris heminas. iij. argenti spumę drach. cc. am-

moniacy thymiamatis, drach. clxviij. resinę, colopho-

nię, pityinę, singu. drach. lxviij. cerę drach. clxviij.

chalbani drach. xx. gruginis tantūdem. myrrhę drach.

viiij. Conficito. Humidum Andromachi ad

nomas. Cere, resinę, terebinthine, utriusq; drach. viij.

adipis taurini curati, drach. iij. chalcitidis, drach. ij.

Impetigo agre-
stis.

Caricarum de-
coctum.

Aceti facultas

Serapionis em-
plastrum.

Humidum me-
dicamen And-
romachi,

squamæ æris, drach. iij. mannæ thuris, drach. ij. gallæ immaturæ, drach. iij. olei myrtei, heminas. v. Arida aceto & melle excipiuntur: dein liquida superfunduntur. Porro q̄ auxiliiorum quædam à ratione sola inueniantur: quædam ab experientia, * quæ ad id ratione non indiget: nonnulla utriusq; opem desyderet: per se iam uobis est demonstratum: sicuti & q̄ ratione & experientia comperta, coniecturali uia ad eorum quæ inquiruntur inuentionem perueniunt: quæ uerò per rationem sperata sunt, confirmantur experientia. Quum

Artium opera
frequenti exer
citiu absoluū.

Ægyptia An
dromachi.

igitur omnia artium opera frequenti exercitio absoluatur, non satis profectò est, generalia duntaxat ipsorum addiscere, sed etiam in particularibus subinde exerceri oportet. Nam actionum usus, exercitatioq; ad perfectorum possessionem est uia.

Ægyptia Andromachi. Argēti spumæ, drach. xliij. ricini heminas. vj. ceræ, drach. cxliij. ammoniaci thymiamatis, drach. lxxij. terebinthinæ drach. xxxvj. langustæ, drach. xviij. squamæ stomomatis, squamæ æris, aristolochiæ, thuris sing. drach. viij. myrrhæ drach. iij. opopanax drach. ij. marinæ aquæ, ad conspergendam ceram, drach. L.

Conficito. Etenim argenti spuma, quum mediū temperamenti sit, quod pertinet ad calorem & frigus: paululum ad siccitatem inclinat. At cera, materie locū obtinet, non uirtutis efficaciam adiuuat: tametsi uis quædam ei perexigua emolliēdi insit. Iam terebinthina, q̄

cera, magis mollit, calfacit, & digerit. Porro ammoniacum inter emollientia principatum obtinet: in digerētibus medium est. Quare compositum ex oleo ricini.

no & gutta ammoniaca medicamentū, abunde potest digerere, emollire, & nimirum etiam siccare. Iam lana combusta, aristolochiaq; plurimū digerunt, exiccātq; thus autem digerit concoquitq; Myrrha etiā non ignauiter calfacit, & exiccāt: sed utrunq; opopanax præstat multo absolutius. Cæterū squama æris, stomoma-

Ammoniacū
inter emollien
tia principatū
obtinet.

tisq; præter q̃ q̃ ualidè siccant, uim etiam astringen-
di sortiuntur. Consentaneum autem est, Andromachū
pro hemina uncias nouem mensurales accipere: ita ut
sex heminae uncias quinquaginta quatuor mensurales
absoluāt: quod idem est, ac si dicas mensuræ Romanæ
libras. iij. S. Ego uerò olei Romanam libram, quam
per dissecta cornua metiuntur, ponderaui quandoq;
discere cupiens quantum grauitatis pondus cōtineret,
inueni q; duodecim mensurales, decem vncijs ponde-
ris æquales existere. Præscriptum igitur medicamen-
tū cruentis uulneribus, ulceribus q; alijs non paucis bonū
medicamentum redditur: sicuti & ad abscessus, & om-
nia quæ discuti postulant. Nec ignoratis medicamen-
ta quæ simul cum digerentibus etiam astringentia re-
cipiunt, longè tutiora esse: quæ uerò absq; abstrin-
gentibus digerunt, efficaciora quidem, non tamen perinde
tuta. Sæpe siquidem fluxiones attrahunt, dum corpus
quod curatur, plethoricum est, aut prauis succis redun-
dat. Ad eò itaq; digerit generosè prædictum pharma-
cum, ut etiam pus, si non admodum copiosum sit col-
lectum, discutiatur, absq; incisione cutis: emollire q; cal-
losa, & quomocūq; indurata possit. Congruit etiam
nudatis neruis, & si in parte quapiam abscessi fuerint.
Etenim præcisi nerui, tametsi periculo quod consortij
lege oboriri solet, careant, tamen eas partes, in quas in-
ferunt, sensu destituunt: talēq; medicamen desyderant:
nam quæ humectant, facilè eos putrefaciunt.

Medicamen fuscum Andromachi, Athene dictum, ad
difficilia ulcera congruens. Argenti spumę, drach. C.
terebinthinæ drach. xxxvj. ceræ, drach. xxv. minij sino-
pici drac. xxiiij. ammoniaci thymiamatis drac. xxxvj.
chalbani, drach. xij. aloes, drach. viij. diphrygis tantū-
dem. æris combusti, mastiches, ūng. drach. vj. aristolo-
chiæ drach. v. propolis tantundem. mannæ drach. vj.
squamæ gris tantūde. Lapidis asij, drach. iij. trifolij se-

Hemina.

Libram mēsu-
ralem olei, con-
tinere vnc. x.
pōderales, Ga.
expertus est.

Digerentia q̃
bus astringen-
tia sunt mīta,
esse lōge tutio-
ra, sed min⁹ ef-
ficacia illis q̃
tantū digerūt.

Humectantia, p̃-
cisos neruos fa-
cile putrefaci-
unt.

Athene Andro-
machi.

Helleſpontia
Andromachi.

minis, drach. ij. ſymphyti radicis drac. j. & obolos. iij. olei heminas. iij. Conſcico: Helleſpontia Andromachi, propulſans phlegmonē: ſtrumas, panos, & parotidas curans: nec non pus maturans, abſceſſusq; rūpens, & glutinans. Argenti ſpumę drach. C. picis drach. L. ladani drach. xv. æruginis raſę drach. viij. æris combuſti, tantūdem. ſquamę drach. ij. olei ueteris, drach. cc. Conſcico.

Tyria Damocratis.

Tyria Damocratis, ulceribus, ac morſibus quadrupedum congruēs. Lithargyri lib. v. cerę lib. ij. Pityinę pinguis, lib. iij. æruginis, chalbanī, æris combuſti, ſquamę, ſingu. vnc. iij. Pinguis olei, lib. xvj. curioſē. conſcico.

Attrahentium,
digerentiumq;
diſcimen.

De emplaſtris digerentibus, & attrahentibus. Attrahentia medicamenta, non nihil etiam diſcutiunt: & quę diſcutiunt, pariter etiam attrahunt. Verū in digerentibus medicamenti, diſcuſſoria uirtus: in trahentibus, attractrix præpollet.

Salſum Andromachi.

Salſum Andromachi, digerens, extrahēs, ad multaq; utile. Salis communis, lib. iij. ſquamę vnc. iij. Magmatis, lib. S. manna lib. j. cere, lib. xiiij. olei cyprini, lib. xvj. quibus acetū affundit.

Medicamē ex
baccis lauri.

Aliud Cteſiphontis, partim diſcutiens, partim euocans, atq; detergens. Aphonitri, libram, manna thuris, tantūdem, lixinę ſtactę, libram. Sunt qui addant etiam libram aceti.

Aliud ex Baccis lauri. Reſina, nitri ruſſi, cerę recentis, baccarum lauri, colophonis, ſeu uitulini, ammoniaci thymiamatis, ſing. drach. lxx. cyprī decimāſextam heming partem. conſcico.

Aliud attrahens & digerens, ad multa utile. Argenti ſpumę, ceruſſę, chalbanī, ſingulorum libram. ſalis ſoſilis, æruginis raſę, ſingu. ſe libram. olei ſextarios tres. atramenti ſutori, vnc. ij. conſcico.

Digerens Alexandri.

Aliud digerens meliceridas, Alexandri. Salis Hiſpani, argenti ſpumę, ceruſſę, ſing. libram. Cere, terebinthine, utriuſq; vnc. j. chalbanī, uel opopanacis, vnc. ij. ſinapeos, vnc. vj. olei ueteris, libras tres. aceti ſextariū

confundito. Aliud Epispasticum, discutiens strumas, parotidas, atq; omneis abscessus: conferensq; ad articulorum uitia. Salis fossilis libram: strigmenti puris simi, lib. iij. Chalbani drach. L. conficito.

Aliud quo usus est ad eadē Andromachus. Cerussæ, salis fossilis sing. drach. lxxx. chalcanti drach. xij. olei

ueteris heminas. iij. aceti heminas. iij. Aliud Asclepiadis ad eadem. Quod ualenter etiam mammarum abscessus digerit. Cera, terebinthina, nitri, olei ueteris, sing. libram. aquæ heminam. Nitrum in aqua solu-

Digerens Asclepiadis.

tum igni admoueto, uaseq; cooperto, coquito, mouens ex interuallis. Quum autem strepere adeo desierit, liquida infundito, mouens assidue, donec non co-

inquinent. Postea in mortarium transfusa, rursus tundito; inde excipiens, utitor.

Aliud ad eadem.

Cera, terebinthina, sing. drach. C. nitri spumæ, olei ueteris, mannæ, thuris, sing. libram. lapidis asij floris, seli

bræ. chalbani, ppoli, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. aquæ lixigæ quod sit satis, conficito.

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera. Liber Septimus.



ALAGMATA siue emollientia uocant Medici, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, calido omnia tēperamento prædita: non tamen exiccantia, quemadmodū nec manifestò humectantia. Nam quum

Malagmata q̄ dicantur.

exactè emollientia medium quendam ordinem inter humectantia siccantiaq; sortiatur, indurescentiū substantiæ, ueluti fusionem quandam molliuntur. Vbi uero fusa durities fuerit, digerentium medicamentorum

Digerentibus quādo utendū.

usus succedit. Porro leoninus adeps ualentissimè tum calfacit, tum digerit. Proximū locū habet pardi adeps, ut qui modicè emolliat. Vim minorem in calfaciēdo ac digerendo habet anserinus; habet tamē aliquatenus maiorem in molliendo: pari spatio ab hoc recedit gal- linaceus. Suillus adeps, mollissimus, humidissimus, atq; aliorum imbecillimus est: quare teneris corpori- bus conuenit. Caprarum & boum adeps, quanto suil- lo est ualidior, tātō magis corporibus & natura durio- ribus, & inter duriora scirrhosioribus congruit. Tau- rinus hircinusq; adeps ualidioribus tum corporibus, tum affectibus auxiliatur. Est autem cōmune tū phleg- mone, tum scirrho particulis laborantibus, reniti pre- mentibus digitis: distinguuntur tamen affectus nō sensu doloris & indolentia. Igitur magna phlegmone cata- plasmatis & humidis quibusdam medicamentis sana- tur: parua, cui scirrhusa durities permixta fuerit, tum ca- raplasmatis, tum medicamentis cerati modo cōfectis: liquidisq; emplastris atq; emollientibus.

Phlegmone q̄
bus medicamē-
tis indigeat.

Parygrō Herē

Medicamen Parygron Herē. Quod medet̄ particulis exigua phlegmone afflictis, non multo post cōfectio- nem tempore. Si uerò duritiem absq; dolore pars affe- cta contraxerit, aut si phlegmonode affectu sit libera, paulo etiam recentī uetustius utile fuerit. Eius itaq; cō- positio est talis. Adipis suilli recētis, curati, vnc. xliiij. ceræ vnc. xxiiij. cerussę vnc. vj. argenti spumæ tantū- dem. conficito. Ad duritiem in scirrhū abeuntem, ualentiora præsidia p̄sanant: cuiusmodi sunt, tum me- dullarum genus, tum bdellium utrūq; Arabicum nē- pe, & Scythicum; necnon styraces: ex quibus eligēdus est pallidus. Nam niger deterior est. Iam ammoniacū thymiama, inter ea quæ emolliunt durities annūmera- tur: præcipuè quod pingue est, & recens. Medullarum optima est uitulina. Ex resinis aptissima est, Chia uo- cata, & larix. Post has pinea. nde ab Iietina. Strobilina

Styracis diffe-
rentiæ.

Medullarū op-
tima ē uitulina
Resinarū diffe-
rentiæ.

uerò uehementer est acris. Pityína, quam propriè physema uocât, pinguitudinis expers, exiccat admodum. Has igit fugere, Chia uerò & abietina uti oportet, non ipsi per se, sed cum cera, & aliquo aliorum, quæ conducere affectui uideantur. Brutia pix & ipsa eandem obtinet uim, nonnihil pinguis & tenax. Pix alia non est miscêda, sicuti nec bitumen: utpote iusto sicciora. Exiccantia quippe, mollientibus sunt contraria. Quoniam uerò & piceam, & phrycten resinam, & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum est, & aliâ colophoniam quandam haberi, chiæ mastiche similem, quæ nõ nihil molliens sortitur, quemadmodum ipsa mastiche & thus. Ad hæc Aegyptia mastiche nonnihil emollit. Thus etiam, quandam molliendi uim obtinet: uerùm hoc quidem, coctum ex usu est, ueluti & fœnigræci semen. Hoc etenim probè coctum emollit, ac magis adhuc, si adipi temperetur. Quæ citra coctionem liquari, diluîq; ob consistentie siccitatem, non possunt, oleoso aliquo indigent, cuiusmodi sunt, tum oleum ipsum, cui nihil astringēs inest: tum balneorum strigmenta, & qđ uocatur sulinũ, & hoc multo magis comaginũ. Huius generis est butyrum, althegq; & fœnigræci decoctum. Porro inter ea quæ sic emolliunt, & ea quæ ualidis simè (cuiusmodi existunt styrax, & bdellium) ammoniacum thymiana idem potest quod propolis. Cæterum Scythicum bdellium Arabico est multo ad emolliendum præstantius. Chalbanum & opopanax, præterq; qđ digerunt, etiam aliquid molliens sortiuntur. Opopanax tamen digerendo: chalbanum molliendo, coquendoq; præcellit. Ex his igitur quæ produximus, ualida ualidis, imbecilla imbecillis sunt adhibêda affectibus. At ubi post primam pharmaci impositionem, denuò ipsum applicas, oleo pingui partē affectam fouere conuenit. Ex ijs autem quæ ἐχένολλα (quòd tenacius hereant) uocantur, nullum auferendũ est, prius q̃ sua spon-

Colophonia
duplex.

Mastiche.
Thus.
Fœnigræci se-
men.

Bdellium.
Ammoniacum
thymiana.

Chalbanum.
Opopanax.

Tenacia medi
camēta non eē
amouēda, pri
q̃ sua sponte
excident.

te abscedant; * sed ut adhæreant semper sinenda sunt, etiam si ægrotās lauetur. Vitanda autem omnino sunt medicamentosarum aquarum lauacra: præsertim quæ chalcanthum, alumen, & sulfur referunt. Quum igitur malacticorum sint uarij gradus, & differētiæ, certē malacticis primi ordinis ad exiguas durities, atq; in mollioribus utemur corporibus: ut secundi, ad fortiores tum affectus, tum corporū habitus: ac similiter tum tertij, tum quarti, nimirum pro illorum ratione.

Malactica primi ordinis.

Malactica primi ordinis. Butyrū, uel resina colophonia, & cera candida nō uetusta, singula pondere equalia, inuicem liquata, primi ordinis malactica sunt. Liquidum similiter medicamen, quod Parygron uocāt, primi ordinis est. Emollientium imbecillimū est cera cum butyro soluta, aut ex fusino, aut comageno. At his imbecillius cererelæon dictum. Iam ex ouis cerata facta, exiguam quandam relaxandi uim possident. Valentiora his, uerū imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex cæsypo, resina, & cera pari pondere liquefactis.

Malactica secundi ordinis.

Malactica secundi ordinis. Emplastrū quod ad Mnasæum refertur, rectissimè secundo malacticorum ordini ascripseris, nimirum constans ex oleo ueteri, argenti spuma, & suillo adipe. Ceterū si omnia illa fuerint recentia, imbecillimum pharmacum fiet. Validius autem, oleo quidem existente ueteri: adipe autem recēte. At ualidius adhuc, ex uetustis ambobus constiterit. Quocirca secūdum uetustatem quidem olei & adipis, pondus autem singulorum quæ induntur: uarias differentias ipsum medicamentum suscipiet. Copiosa siquidem argēti spuma iniecta, medicamen potestate mollius euadet: paucior, ualidius: ac magis emolliet, si plus adipis immittamus: digeret fortius, si augeamus oleū.

Amythaonis
malagma.

Amythaonis malagma ab Asclepiade scriptum. Ammoniaci thymiamatis, vnc. xxxvj. cere tantūdem. cerebinthine vnc. viij. bdellij, tantūdem, chalbanij, thu

ris, myrrhæ, sing. vnc. iij. cyprini heminas. iij. Conficito. Discutit omnem durittem. Valer contra præcordiorum tensiones, impeditosq; articulorum motus.

Malagma Dioscoridis, ad eadem. Cerae minam unā, resine phrycæ, chalbanī, iridis Illyricæ, sin. ming dimidium irini fecule quod satis est. Vini quantū uolueris. Conficito.

Malagma Dioscoridis.

Malagma Lucij omnem duritiem digerens, articulosq; impeditos relaxans. Bdelli, seui utulini, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sin. drach. xvj. opopanax, chalbanī, cachryos, styracis, thuris, sing. drach. viij. piperis grana clx, irinæ fecule, qd sit satis, ceræ, resine terebinthinæ, sing. selibram. Vini quod satis esse uideatur. Conficito. Est enim extremi emollientium ordinis: ut quo nullum durescentia magis emollire comperias.

Malagma Lucij.

Malagma Neapolitæ ab Asclepiade scriptum, contra omnes durities: quod etiā pleuriticis auxiliatur. Vini pisite, sextarios sex. ceræ lib. sex. ammoniaci thymiamatis, phrycæ, utriusq; vnc. iij. terebinthine thuris, myrrhæ, aloes, aphronitri, lapidis Asij floris, gentiane radicis succi, sing. vnc. vj. sagapeni, sulfuris uiui, propolis, sing. vnc. iij. panacis rad, psamyschi, piperis albi, sing. vnc. iij. Conficito, & utitor.

Malagma Neapolitæ.

Malagma Andromachi. Picis lib. iij. cere lib. ij. resine, libram. chalbanī vnc. ij. ammoniaci thym. tantūdem, manne vnc. iij. aceti sextarios. iij. Malagma Andromachi ex meliloto. Nardi Gallicæ drac. x. cyperi, cardamomi, ireos Illyricæ, myrrhæ, sin. drach. viij. croci, drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, drach. viij. terebinthinæ drach. L. cere recentis, drach. C. cyprini, hemine dimidium. acetiquod sit satis. Conficito.

Malagma Andromachi.

Emplastrū ex meliloto.

Malagma ex baccis lauri Andromachi. Cerae, picis brutie, baccarum lauri, nitri, resine phrycæ, sing. drach. lxxv. chalbanī, ammoniaci thymiamatis, cachryos, ameos, singu. drach. xij. piperis albi, drach. xvj. cyprini hemi. vj. cōficito.

Malagma ex baccis lauri.

Ischiadicis ca-
taplasma.

Ad Ischiadicos generosum. Rutę agrestis seminis, silphij, baccarum lauri, aphronitri, abrotoni, colocyn-
thidis, cardamomi. ameos, sing. drach. iij. Rutę uiridis,
picis, terebinthinę, ammoniaci thym. cerę, seui, sing.
minę partem octauam. chalbani, drach. vj. opopana-
cis drach. iij. sulfuris uiui tantūdem. Conficito.

Lienosis opti-
mum cataplas-
ma.

Ad Lienosos. Cerę minam. ammoniaci thymiamatis, minę dimidium. aluminis liquidi, drach. L. strig-
menti, heminam. Capparis rad. calaminthe rad. myro-
balani fecis, quod magma uocant, sing. drach. L. aceto
aridis, oleo adiecto liquidis, utitor.

Hepaticis con-
ueniens malag-
ma.

Malagma ad Hepaticos. Ammoniaci thymia. bdellij, singu. drach. cxliij. croci, myrrhę, sing. drach. xij. cerę drach. cxliij. acetij, quartam partem heminę, cyprini, heminam. conficito.

Rheumatismis
vētriculi & in-
testinorum, ma-
lagma.

Malagma ad rheumatismum stomachi & intestinorum. Oenanthę, vnciam. omphacij, vnc. iij. phœnicobalani carnis, vnc. ij. acacie, rosarū, aloes, sing. vnciam. gallę, aluminis, picis, sing. vnc. iij. cerę vnc. iij. Vinum aridis affunditur.

Hydropicis cō-
ueniens malag-
ma.

Ad Hydropicos, & flatuosos. Picis liquidę, cere, utriusq; libram, nitri, sulfuris uiui, aluminis fissi, sin. vnc. vj. p. misceto.

Colicis malag-
ma Antipatri.

Malagma Antipatri ad colicos. Silphij, drach. ij. helisphaci, casię, melanthij, staphidis agrię, chalbani, struthij, sulfuris uiui, sing. drach. iij. panacis, propolis, pyrethri, ammoniaci thymiamatis, nitri, singu. drach. vj. Asij floris, drach. xxv. cerę drach. cl. resinę, tantūdem. olei hemiram. Conficito.

Anodynōn ad
podagram.

Anodynōn Nicotratij ad podagram. Cerę libram. Ammoniaci thymiamatis, vnc. ij. opopanacis, vnc. iij. S. mecōij, vnc. iij. cyprinum ad contusionum eorum adhibetur.

Arthriticis aureū malagma.
Pleuritidi con-
ueniens malag-
ma.

Aureum malagma ad Arthricos. Resing strobiling, lib. ij. chalbani, drach. xij. axungię porcine tantūdem. cere drach. xxiiij. baccarum lauri, drach. xij. incoquito ut decet.

Aliud ad Laterum dolores. Cyperi, cardamomi, manna, ammoniaci thymiamatis, tere-
binthinę

binthinæ, ceræ, irini, singul. libram. Misceto. Porro phlegmones, scirrhiq; eadem quodammodo generatio & curatio est. Nascitur enim ex confluxu humorū uterq; affectus; curatur iisdem uacuatis; quāq; euacuationis modus utrobique idem non est. Quippe inflammationis quidem particulis tum repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tū discussoria semper ex usu est. Scirrhis autem, sola discussoria sine repellente. Itaq; summè indurata scirrhus, prorsus, insanabilia sunt. Dignosces autem ipsa hinc, qd nullus sensus partibus affectis supersit. At in quibus sensus quidē est, sed ob scirus, hæc curantur pharmacis digerentibus in crassa tum humorē: non tamen ualidē, ac uniuersim hoc agentibus; quod epispastica solent. Quocirca minimè sanè oportet mirari, si partes inflammate scirrhum interdū contrahant; dum uidelicet humor quidem influens est simul crassus & uiscidus; curatio autem medicamentis ualde exiccantibus administratur. Nam quemadmodum in externis rebus, permulta corpora quæ ignem contingunt, ab ipso torrētur; atq; rursus ab aqua emolliuntur; ita in particulis inflammatis, ex humore ipso, à calfacientibus & exiccantibus acerrimè desiccato, relinquitur quippiam crassum & uiscidum, nimirum omni tenui discussio. Atq; hac sanè ratione in morbis articularibus pori gignūtur: nec secus per nephritidas calculi. At si fluxio, quæ phlegmonem gignit, tenui substantia sit, curatioq; eius per siccantia & calfacientia pharmaca administretur, nihil scirrhum relinquit; imò refrigerantia uehementer, astringentiaq; scirrhus procreare tunc solent. Vnde multis per erysipelata uehementer refrigeratis, occalescere solent humores. Igitur primus usus in dolentibus inflammationibus est, qui medicamentis abundē humidis simul & modicē calidis administratur. Alter paulo crassioribus, & sic, cantioribus constat. Tertius relaxantibus nominatis,

Inflammationis curatio.

Scirrhi curatio

Scirrhi incurabiles, ab iis qui possunt curationem suscipere, quomodo discernantur.

Phlegmonæ quando in scirrhum degenerent.

Pori quomodo generent. Calculi ut gignantur in renibus

Refrigerantia quando scirrhus producant.

Inflammationibus quæ medicamēta conuenire videant.

quæ nonnulli inter malagmata collocant. Sunt autem inter ea, maximè emollientia quidem, quæ consistentiam cerati referūt, quum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxante conflantur. Temperatur ipsis œsypi, resinæ, & picis, modicum; sicuti & thus, & chalbanum, & nonnihil ireos Illyricæ.

Acopa medica
mina qualianā
esse debeant.

Resinarum dif
ferentiæ.

Adipis diffe
rentiæ.

Dura corpora
valentiora me
dicamenta po
stulāt, q̄ q̄ mol
li carne sunt
prædita.

Acopon The
misonis.

De Acopis, siue labores lenientibus. Acopa medicamenta omnia, liquidæ cōsistentiæ necessariò esse debent. Inter quæ sanè oleū per se, eos laboribus qui summam cutem infestant, persanat; altius autem ingruentes, uehementioresq; , alicui relaxanti, & mediocriter calfacienti cōmixtum; ut chalbano, resinæ terebinting, colophonixq; phryctæ appellatæ. Quibus caldiores sunt abietina, & strobilina. Terebinthinam uerò larix nonnihil calore superat. Cæterum id genus omnia relaxantibus oleis miscentur, quale est Sabinum; iniecta interdum & cera. Iam uerò ἀκονιον unguen est, ubi dolor altius infestat, medicamē ex semine abietis, chamæmeli, anethi, & floris populi; præterea fusinum, gleucinum, & comagenum; & quæ tum ex medulla, tum adipe componuntur; suillo quidem, moderatissimè relaxante; gallinaceo autem, his uehemētius, & hoc adhuc magis anserino. At adeps leoninus, & pardi, ualidior est, ut iam uehementer calfaciat, eoq; discutiat insigniter. In medio horum, bubuliq; & caprilli, consistit uulpium atq; hyænæ adeps. Meminisse autem oportet, dura corpora requirere ualentiora pharmaca; mollia uerò & humida, minimè talia medicamenta perferre posse. Nec ignoratur, quæ dicuntur myracopa medicamenta, ex acoponū cum unguentis temperatura fieri, nihilo cæteris præstantiora, nisi odoris fragrantia. Acopon Themisonis ab Asclepiade scriptum. Sampsuchi, roris marini foliorum, scenigræci, sing. sextariū unum. cardamomi, brathyos, sing. sextarij dimidium. vini dulcis sextarios tres, olei yenafrani, trepōdo, cere

libras.ij. conficito ut decet.

Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacei, cyprini, gleucini, ceræ, terebinthinæ, sing. vnc. iij. conficito.

Acopon ex melle.

Acopon Aphrodæ, *δυσωδης*, hoc est foetidū appellatū. Cæræ, terebinthinæ, sing. drach. viij. chalbani, drach. vj. olei ueteris, heminas duas, medullæ ceruinæ drach. viij. conficito.

Acopō Aphro-
dæ, foetidum.

Aliud ad omnem neruorum dolorem. Resinæ terebinthinæ, drach. lvj. ceræ drach. xxviij. ammoniaci thymiamatis, drach. xxxij. chalbani tantūdem. medullæ ceruinæ, drach. xxiiij. olei ueteris heminas duas. conficito.

Acopō ad om-
nem neruorum
dolorem.

Aliud *δια τὸν καστωρίον* hoc est ex castorio: quod solutis, & omni diuturno malo auxiliatur. Oesyti, vnc. iij. medullæ ceruinæ, vnc. iij. terebinthinæ, vnc. iij. ammoniaci thymiamatis, chalbani, castorij, piperis albi, euphorbij, adarces, nitri spumæ, opopanacis, sing. vnc. ij. olei styracis, vnc. iij. unā. olei irini, vnc. ij. olei ueteris, heminam unam. cere selibram. conficito.

Acopon ex cā-
storio.

Vnguentum dolores articu-
lorum discutiens. Thuris, piperis albi, sing. drach. x. aphronitri, drach. viij. myrrhæ, drach. iij. ammoniaci thymiamatis drach. vj. aceti, quod sit satis. olei cyprini heminam unam.

Acopon ad ar-
ticulares dolo-
res.

Medicamen ex populo.

Populi nigræ surculorum minam. cucumeris agrestis rad. lib. iij. cassiæ fistule, lib. ij. vnguenti crocini, lib. ij. croci, vnc. iij. uini odorati sextarios. xij. olei sabini sextarios. x. sampsuchi, ceræ, sing. lib. iij. Surculos populi diligenter contusos in uase duplici unguentario contineto: quibus sampsuchum, cucumerisq; radices concisas adiungito. His uinum superfundito. Omnia diebus nouem macerari finito. Sequenti die oleum adiiciatur, & rursus accuratè tussa, igne non acri incoquito. Postea liquori expresso ceram subactam, & medullam leuem factam indito. Igni imposita coquito. Vbi liquata fuerint, ab igne tollens, crocinum adiungito, moue-
toq; continuè. Crocinum uerò laue factum, terrestribus

Medicamē ex
populo ad arti-
culares dolo-
res.

testudinis sanguine excipito, ut olei ueteris crassitudinem habeat. Liquata croco iniecta, rursus tūdito, atq; exceptis utitor. Arthritide, & ischiade liberat.

**Podagricū me
dicamē flauū.**

Aliud flauū Clemtiens. Cuius usu nouimus homines toto distortos corpore, conualuisse à podagra, chira-gra q; Olei Sabini, lib. xij. cucumeris agrestis rad. lib. xij. ceræ, terebinthing, medulle ceruine, chalbani, sing. lib. j. Oleum diuidimus, & seorsum in eo ranas, seorsum item radices incoquimus. Dein liquore percolato, ad pharmaci confectionem utimur.

Acopō Haliei.

Acopon viride Haliei. Ceræ, terebinthinæ, olei ueteris, sing. selibram. aphronitri, vnc. iij. chalbani, æruginis rasæ, sing. vnc. iij. opopanacis, vnc. vj. ammoniaci thymiamatis, manne, sing. vnc. iij. aceti, melini, cypri ni, irini, sing. vnc. ij. seui caprilli, vnciam. conficito.

Acopon Casti.

Casti Acopon, ad diuturnos affectus & conuulsiones. Pysselæi, Syriaci vnguenti, utriusq; sextarium. ireos Illyricæ, parem modum, terebinthinæ, libram. axungie tantūdem. Rasuræ naualis, vnciam. Incoquito, ruta uiridi mouens.

**Gleucini con-
fectio.**

Gleucini confectione Andromachi. Myrrhæ, nardi Indicæ, cuiusq; lib. ij. costi, lib. iij. styracis, libram. bdellij, sampsuchi, xylobal sami, iunci odorati, cardamomi, spathæ, ireos Illyricæ, misyos, asari, sing. lib. ij. meliloti, nardi Gallicæ, sing. libram. aspalathi, calami, sing. selibram. aristolochiæ longæ, tantūdem. roris marini seminis, sextarios duos. thuris, cassiæ, singu. lib. iij. foenigræci sextarios duos. sphagni, amomi, sing. lib. ij. corticis thuris, libram. rosarū siccarum, lib. ij. carpobalsami tantūdem. croci vnc. iij. baccarum lauri, libram. piperis albi, tantūdem. opobalsami, uascula tria. malabathri foliorum, lib. ij. nucleos pineos uirides duos. rute uiridis vnc. ij. salis ammoniaci, nitri, cuiusq; vnc. iij. uini ueteris, sextarios. ij. musti boni, uascula duo. S. olei ueteris. lib. v. præparato diebus quinquaginta. Ad dolorem lassitudinemq; tol-

lendam, medicamen est longè accōmodatis simū.

Acopon Heræ, ad diurnos dolores coxendicos, articulos impeditos, & paralyfin, admodum efficax. Acopon Heræ.

Olei ueteris, irini, laurini, pyracini, ceræ, sing. lib. vj. terebinthing, piperis, euphorbij, singu. vnc. ij. ammoniaci thymiamatis, vnc. ij. castorij, opopanacis, chalbani, medullæ ceruinæ, sing. vnc. ij. Liquabilia liquata siccis affundito, & unitis uitor.

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca Liber Primus.



QUOD non modò affectus ipsi, sed etiam ægri tēperies, naturaq; partis affectū, ipsam curationem commonstrent, alibi à nobis est demonstratū. In hisce autem cōmentarijs, de compositione pharmacorum ad singulas

Curationē quę indicent.

corporis partes congruente, differere est animus: ad quod iam negotium accingimur, à uitij capillorum exorsi. Porro generatio pilorum, eadem est quæ plantarum. Nam quemadmodum ex istis quædam arte & arbitrio agricolæ: quædam, iuxta naturales causas proueniunt: eodem modo & in animalium corporibus, aruo qdem alicui, triticum, aut hordeū, aut aliud quoddam cerealium seminū in se insita habenti, caput assimilatur: alijs uerò herbis quę in * aridioribus crescūt regionibus, reliqui totius corporis pili similem generationem sortiuntur. Siquidem non secundum primam rationem, sed per accidens quoddam natura ipsos consuevit gignere. Igitur affectus pilorū sunt, tum deperditio omnimoda: tum coloris mutatio: qualis in uitilagine alba, quam leucen uocāt, fieri consueuit. In id ge-

Pilorum generatio, eadē est quæ plantarū.

Pilorum affectus.

Medicamenta
sint semper ta-
lia, vt si non
profint, non læ-
dant.

nus autem affectibus, sicuti in alijs omnibus, summe
curandum est, ut quæ præsidia adhibebimus, aut iuuet,
aut certè nō noceāt. Atqui usus pharmacorū ametho-
dos, non modò non potest, sed et obest frequenter.

De Alopecia, Caluitie, & Ophiasis.

Capilli a qui-
bus causis cor-
rumpi soleant.

Caluities.
Alopecia.
Ophiasis.

Color cutis q̃
litate humor-
um subtus pu-
trescentium in-
dicat.

Pilorum corru-
ptiōis curatio.

Hiera ex colo-
cynthide.

Quemadmodum ex plantis ipsis, nonnullæ qui-
dem, ob humorum inopiam resiccatae, extabe-
scunt: nonnullæ autem, q̃ humoribus à sua natura alie-
nis imbuantur: eodem etiam modo capilli, aut propter
penuriam humorum, à quibus consueuerunt nutriti,
aut propter prauitatem, corrumpi assolent. Ac ppter
inopiam quidem, caluities accidit: propter vitium autē
succorum, Alopecia, & Ophiasis. Etenim læsa capitis
pars, serpenti similis in ophiasis apparet. Alopecia
autem, ob id ita appellari ferunt, q̃ uulpibus frequen-
ter accidant. Iam uerò, quales tandem sint ipsi corru-
pti humores, ex colore cutis in capite facile licebit ti-
bi discernere. Alijs nāq; albidior apparet: alijs nigri-
or: atq; pallidior alijs. Quare in istis primū totius cor-
poris purgationem molieris, aut pharmaco pituitam
ducente exhibito: aut quod bilem pallidam, aut nigrā
eliciat: coniectura redundantis humoris, ex colore cu-
tis inita. Ego uerò hiera exhibita semper ipsos purga-
ui: aliquando nigro ueratro adiecto, ubi melancholicū
succum uacuare erat animus: aliquando scammonio,
si amara bilis purganda esset. Vbi uerò pituitosiores
exuperare humorem conieci, nihil admiscui. Tales si-
quidē, præsertim ex capite, hiera ex colocynthide pur-
gare humores consuevit: simulq; cum ijs, alios quosdā
etiam si scammonium, aut ueratrum nigrum, aut epi-
rhyum, non addatur. Catapotia etiam ex aloe, quæ
tum scammonium, tum colocynthidem admixtam ha-
bent, commodius ita affectos purgare solent. Post to-
tius autem corporis purgationem, apophlegmatismis
pituitam è capite detrahere præstat: ac dein, localibus

*Delula
aloe cu.
scammonio
et ueratro
thrida.*

ut auxilijs. Cæterum incipientes ophiases & alopecias, per astringentia & refrigerantia præsidia cohibere conuenit: adultæ autem, digerentibus discutiendæ sunt. Ego uerò quendam adolescentem in principio affectionis curauì sola purgatione ex hiera dia colocynthidos. Prius tamẽ catapotia ex aloe undecim ei exhibueram, cicerum magnitudine. Habent autem catapotia hæc colocynthidis, partem unam: aloes et scammonij, utriusq; partes duas: quibus partem unã succi absynthij addo. Antea uerò etiam mastichẽ chiam, & bdellium imiscebam. Porro pharmacum extrinsecus adhibendum, si præter hoc quòd uitiatos humores discutiat, etiam idoneum sit ad probum sanguinem attrahendum, ueluti est thapsia, censendum sanè est optimum medicamen. At uerò quum thapsia longè calidior sit, q̃ affectus postulet, meritò eius per se usum uitamus. Exulcerationes quippe excitare consuevit, ac omnino quosdam inflammatos tumores. Quamobrem quædã quæ illius uehementiam mitigent, necessariò admiscemus: id quod ceratum ex oleo aliquo tenuium partiũ (cuiusmodi Sabinum est) prestare commodè poterit. Vt sum quandoq; sola thapsia, sed uehementi illius facultate, larga aquæ affusione exoluta. Porro ex pharmacis prædicto affectui congruentibus, uehementer quidẽ calfacit euphorbiũ: sufficienter autẽ laurinum, siue oleum, siue unguen. Licet igitur ipsis per se uti, euphorbio quidẽ, oleo intrito, ac læuigato: laurino uerò, solo, citra alterius admistionem, illito. Si tamen nimis fluidum appareat, parum ceræ ipsi addat. Quum uerò multo calidius sit recens euphorbium, si quidem bimo, aut trimo ipso utaris, ad libram unam Romanam olei, euphorbii unciã unam iniicies: recenti autem euphorbio, sicuti & thapsia, & omnibus fortibus pharmacis, parcius utendum est. Peccatũ siquidem infra modum, nullum detrimentum adfert: sur-

Catapotiũ
ex aloe com-
positio.

Thapsiæ facul-
tas.

Euphorbium.
Laurinum.

Peccata infra
modũ non ad-
ferũt detrimen-
tum.

Vetusta phar-
maca suas fa-
cultates amit-
tere.

Vigor medica-
mentorū ex
q̄bus notis ex-
pendi queat.

Limnitis.

Adarcium.

Alopeciis con-
gruentia medi-
camēta simpli-
cia.

pra uerò, aliquando exasperat, exulceratq; cutem;
atq; inflammationem excitat. Similiter etiā fugien-
da sunt, omnia ualde uetusta pharmaca: quandoqui-
dem uel metallica ipsa, ubi nimis antiqua sunt, suas
facultates amittunt. Vniuscuiusq; aut medicamenti
uigorem, iis qui sæpe ea conspexerunt, licet cogno-
scere, tum ex odore, tū ex gustu, atq; adeò interdum
ex colore, consistentiaq;. Est itaq; inter ea quæ alo-
peciis conferunt, calidissimum medicamen euphor-
bium: eo autem minus calidum, est thapsia: post hæc,
sinapi, nasturtiumq;. Iuxta alium autem modū lim-
nitis (quæ adarcium & adarce uocatur) nulli horum
secundum est. Post hæc succedūt sulfur, & nitri spu-
ma, ipsumq; nitrum molle, ustum, & quod Breni-
carium uocatur: quemadmodum & aphrolitron al-
bum, læue, atq; laxum. Deinde ueratrum utrunq;, &
erucæ semen, & laurinum unguentum, aut oleum:
ad hæc alcyonium utrunq; ustum, & non ustum: ca-
lamiq; tum radices, tum cortex, ambo usta. Quin &
pix liquida, & cedrinum, quod cedriam uocant, &
murium stercus, ursæq; adeps. Hyænæ etiā, leonis,
pardalis, anserisq; adipēs cōgruunt: & quicunq; te-
nuium partium substantiam sortiuntur. Amygdalæ
etiā amaræ totæ ustæ, cōmodæ sunt: & thus aceto
acerrimo maceratum. His itaq; omnibus pharma-
cis licet utaris, fortibus quidem, ceratum liquidum
temperans: debilibus uerò, laurinum oleum immi-
scens. Rursus, inueteratas quidem, ac difficulter cu-
rabiles, cum fortibus persanare conaberis: incipien-
tes autem & paruas, cum imbecillis. Ad alope-
cias composita. Euphorbii, thapsiæ, laurini, sing.
drach. ij. sulfuris uiui, ueratri, utriusq; drachmā unā.
ceræ drach. vj. misceto, utitorq; hoc, ceu fortissimo
pharmaco ad inueteratas, ægræq; curabiles alope-
cias. Si thapsia nō adsit, pro ipsa licet tantūdem adii-

Alopeciis inue-
ter. tis optimū
medicamen.

cēre seminis nasturtij, aut erucæ, aut ipsiusmet na-
 sturtij. At loco laurini, picem liquidam pones. Ad-
 miscui etiam aliquādo mel, nec deterius euasit phar-
 macum. Porro quæ ex adipibus, ac modica item tha-
 psia constant, similiter profunt, præsertim si euphor-
 bium & adarcium addatur. Sit autem adipis leoni-
 ni, pardalij, & hyænæ, cuiusq; pars una: quibus mi-
 scere anserinum atq; ursinum poteris: ita ut ad duo-
 decim adipum uncias, thapsiæ aut euphorbij un-
 ciam unam iniicias: quanq; ambo etiam potes adii-
 cere, si efficere fortius pharmacum uelis. Auspicari
 autem semper à leuioribus conuenit, & respectu ef-
 fectus, quem pharmacum primò admotum produ-
 xerit, sic facultatem eius aut lenire, aut augere. In
 alopecia igitur, primùm quidem capillos nouacu-
 la tollere expedit: dein affectam cutem per linteo-
 lum nec asperum, nec molle nimis, confricare: ac
 uidere ad quantum ruborem per huiusmodi motio-
 nem peruenit. Magnam nanq; spem successuræ cu-
 rationis tibi iniiciet, si per modicas defrictiones ru-
 bescat: quæ moderatæ affectionis significatio existit.
 Si uerò per multas frictiones, tandem succedat ru-
 bor, grauiorem tum affectionem, tum curationem in-
 dicat: præsertim si quædam cuticulæ, etiam si mul-
 tum confrices, non rubescant. Præ omnibus autem
 cauendum est, ne in fortium pharmacorum admo-
 tione, cutis ultra q̃ par sit, cōcalescat: id quod tum ex
 colore ipsius, tum tactu deprehendes. Colore nanq;
 flauior apparebit, & digitorum contactu satis cali-
 dam agnoces. Quare tunc ad molliora trāscundum:
 aut eodem utendum quidem, sed cerati, aut adipis,
 aut liquoris cuiuspiā oleosi, ui ipsius exoluta. Vten-
 dum est & olei calidi dulcis irrigatione, & cataplas-
 mate ex pane, fomētisq; & scarificationibus: necnon
 cucurbitis, & cerati inunctionibus. Cæterum perse-

Leuiorib' me-
 dicamentis ef-
 se i primis utē-
 dū, quando alo-
 peciis mede-
 mur.

Alopeciæ faci-
 le curabitur ar-
 gumentum.

Alopeciae re-
bellis curatio.

uerante affectione, ut edum est assidua rasura, & rubificatione ex sinapi, praescriptisq; frictionibus: sequentibus autem diebus, illita pice, aut oleo cedrino, & post frictionem, scarificatu. Quidam uero acicularum acervo affectam cutim compungunt. Post haec omnia, pharmacis quae ex alto euocare, & meatus transmutare possint, utendum. Curandum autem perpetuo est, ut in aere calido, insolatoq; (si id fieri possit) omne pharmacum applicetur. Hyemis uero tempore, praestiterim in balneo his pharmacis uti. Porro

Alcyonium.

Lucernarum
oleum est te-
nuius comuni.

alcyonium ustum, illitumq; ex lucernaru oleo, mediocres discutit alopecias, pharmacum mediocre quum fit. Est autem lucernarum oleum communi magis tenuium partium. Aliud Here, ad molli carne praeditos. Sem. erucae, & nasturtij, nitri, sing. partem unam: contritis affundito picem liquidam, utitorq;.

Aliud a Critone descriptum. Herinaceorum cinere permisto ursino adipi, utitor. Aliud. Calami radices ustas, adipeq; ursino exceptas, impone.

Aliud ad inueteratas. Muscerdae, thuris, cuiusq; drach. ij. aceto acerrimo dissolutis utitor. Aliud.

Cinerum ranarum minimarum in ollula ustarum, muscerdae, ueratri albi, radice calami ustae, piperis albi, singulorum æquis portionibus aceto exceptis, fricato. Aliud ex libris Cleopatrar. Sandaracham tritam, largoq; uisco querno exceptam, loco per nitrum prius praeparato, imposito. Aliud.

Scillae, ueratri albi, utriusq; drach. j. ex aceto trita, praerasis & nitro confictis, imposito. Aliud.

Muscarum capita contrita affrica. Aliud praecellens. Murium domesticorum ustorum, panniculi ampelini usti, dentium equinorum ustoru, adipis ursini, medullae ceruinæ, corticis calami, singulorum æquis portionibus simul exceptis melle, utitor.

Aliud Archigenis, ad alopecias in altum pro-

grēssas. Cum aceto, nitri gleba, aut fici folijs, usq; ad dilanationem defrica: deinde deterfo sanguine, betam ex uino coctam impone: aut caricas uistas, cum uino, aut lentis farinā ex uino, pro cataplasmate adhibe: Aut cantharidas uistas, pice liquida exceptas, ad ceratq; liquidi formam redactas, impone. Aut testudinis marinæ sanguinem illine. Aut thapsiæ succum cerato exceptum illine.

Aliud Asclepiadis Bithyni. Spumæ nitri, partes duas: salis ammoniaci, partem unam: quibus tum uistis, tū tritis, acerrimoq; aceto dilutis, præscalptam leuiter alopeciam illinito.

Aliud Sorani. Stercoris felis aut crocodili, drach. viij. sinapis drach. iij. ex acri aceto læuigatas imposito. Aliud. Fici folia cum aceto, donec lanugo prodierit, affrica: dein stœbes succum illine.

Aliud. Locum per pumicem proritato, & sulfuris, spumæ nitri, ammoniaci, sing. æquas ptes mixtas cū aceto illinito. **¶** Ad caluescentes præter ætatem, & ad menti pilos non nascētes, remedium.

Adipis taurini insolati, lib. j. adarces vnc. j. succi thapsiæ, vnc. j. S. myrrhæ, vnc. j. polytrichi, callitrichi, sing. lib. S. membri asinini, splenis asinini, ladanij, sing. lib. j. Ladanum in modico uino conterito: adipem ad aque uaporem liquefacito: dein asininum membrum assatū, donec insumatur, radito: splenem uerò cum polytricho & callitricho in noua olla torrefacito: omnia deniq; contusa gleucino, aut sabino excipito: & ante balneum iis utitor. Sciendum autem est, ladanum sordes esse ab hircorum barbis desumptas: quas illi sibi ex cisthi madore contrahunt.

De capillorum defluuio.

Est & alia pilorum affectio, quæ ad raritatem cutis, inopiamq; substantiæ pilos gignentis, consequit; maximè supueniens à morbo cōualescētibus. Quapropter curatio etiam hoc modo læsorū non eun-

Alopecii alii
progreſſis re-
media Archi-
genis.

Caluescētibus
maturius, reme-
dium.

Ladanum esse
sordes ab hircorum
barbis desumptas.

Capillorū de-
fluuii causæ.

Capillorū de-
fluuii curatio.

dem scopum, quem alopecia, habet. In alopeciis si-
quidem, ut uitiatum humor consumatur, primarium
scopum habemus: in his uero, ut capitis habitum ro-
boremus, & alimentum boni succi attrahamus, cu-
tiq; densitate & raritatem moderatam restituamus.
Quamobrem ad pharmaca humectantia aliquid mo-
derate astringens admiscere oportet, quale est lada-
num: quod utraq; in se moderate complectitur, quæ
ad hoc symptoma conueniunt: caliditatem nempe
mediocrem, & astringendi uim moderatam. Quare
si capiti prius raso, perfricatoq; , aliquo mediocriter
astringenti oleo (cuiusmodi Hispanū, & lentiscinum
est) illinatur, maxime ex usu est. Nam quæ uehemen-
ter astringunt, omnia etiam refrigerant, & alimenti
influxum reprimunt: propter cuius inopiam capilli
defluunt. Atqui intentio nostra est sanguinem affluen-
tem non modo non præpedire, sed etiam prolecta-
re: cogere autem sensum, & astringere rarefactam
cutem. Quare ad defluuios capillos omnium præ-
stantissimum medicamentum est, quod ex ladano, & len-
tiscino oleo conficitur. Quod si largè defluant capil-
li, maiorq; uideatur esse raritas cutis, pro lentiscino,
myrteo utendum. Licēbit aliquando unguentū ad-
hibere nardinum, in ætate frigida, & hyemali tem-
pore: sicuti in diuitibus foliatum, & spicatum. Debet
autem ladanū liquari in duplici uase, ac reliqua po-
stea illi misceri. Atq; hæc sanè medicamentum mihi suf-
fecerunt, unā, cū resectoria, salubriq; uictus ratione,
quæ in plerisq; etiam sola sufficit. Archigenis
remedium contra defluuios capillos. Ladani &
absynthij æquales partes, & iuniperi baccas, x. tritas,
in linteolum illigato, & in oleo per dies quinque ma-
cerato, ex eoq; caput illinito, & neq; capilli decidēt,
neq; gignentur furfures. Aliud Cleopatraz ca-
pillos augens cito, densansq;, & denigrans. Lada-

Astringētia ue-
hementer refri-
gerant, alimen-
tiq; influxū re-
primunt.

Defluuiis capil-
lis optimū me-
dicamentū est, qd
ex ladano, &
lentiscino oleo
constat.

num ex oleo, uinoq; dulci leuigatum, in crassatumq;, præfritis illinito.

Comptoria ab exornatoria medicinae parte, quomodo differat.

Comptoriae quidem scopus est, inducere pulchritudinem. Exornatoria medicinae partis, quicquid secundum naturam est, id omne, in corpore custodire: ad quod etiam naturalis pulchritudo confertur. Indecoro enim aspectu est caput alopecia uittatum: sicuti etiam oculi cilijs, & supercilijs nudati. Non solum uero ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem, pili conducunt. At faciei colorem per pharmaca nitidiorem, aut rubicundiores reddere, aut pilos capitis crispas, aut fuluos, aut nigros, aut auctos: hæc inquam comptoriae prauitatis, non medicæ artis sunt opera.

Comptoria & exornatoria artis prout quomodo differant.

Pili ad quod conducunt.

De tincturis capillorum.

Qvandoquidem tamen iam consuetudo hæc inualuit, ut uetulae quidem passim capillos denigrent, tanquam turpe sit canos habere: mariti autem id probent, spectaculum permolestum censentes, uxorem aniculam cano capite habere: sanè quaecumque prædelicijs se ipsas ornant, earum nulli tale quippiam à me petenti, exhibui: quaecumque uero honestiores, tum ut notæ culpam effugerent, tum ut molestias maritorum uitaret, capillos suos nigros reddere optarunt, ijs certè, ne ex astrictoria uide nigrorem inferentiū oblererentur, consului, ut cedri liquore uterentur, ita ut tribus aut quatuor horis ante balneum illi inerent, & postea detergerent: idque per quatuor aut quinque dies facere pergerent. Cedria siquidem non modò nihil lædit, sed etiam comoda est eis quæ faciliè offenduntur à frigore: abundè uidelicet calfaciēs. Ad hæc, defluentes capillos corrigit, & non defluentes auctiores reddit. Contra uero, quæ ex austeris & acerbis

Aniculæ & cano capite uxorem habere, spectaculum fastidendum censetur.

Capillos denigrari cedri liquore.

Comptoria & exornatoria

composita sunt, magnopere lædunt. Caterum materia ex qua constant hæc, etiam quippiam tenui partium habeat oportet: quo non in superficie tantum, sed in profundo etiam cutem permutet, progrediendo usque ad capillorum radices. Non solum autem in periculo uersatas sepe scio fœminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis ab huiusmodi medicamentis inducta. Offenduntur tamen citius, quæ frigidius

Similibus affectionibus facilius singula corpori: minus tamen periclitari.

capitis temperamentum sortiuntur. Frigidæ namque particulæ frigidis affectionibus: calidæ calidis corripuntur facilius. Verum minus periculum subeunt, utpote quum à minori causa lædantur, quæ frigidius habent temperamentum. At calidæ, propterea quod ægrè & uix tandem lædi à frigidis causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperatæ causis, maiorem læsionem incurrunt. In morbis siquidem minus periclitantur illi, quorum nature, ætati, habitui, ac temporis ipsa ægritudo congruit.

Periclitari in morbis minus, quibus consiliatur.

Tingentia capillos, ab Archigene prodita.

Capillos tingentia, ab Archigene prodita.

R Adicem capparis cum muliebri lacte, uel asinino ad tertias concoquito, & ad noctem pro caplasmate imposito. Aut urina canis in quinque aut sex dies asseruata lauato. Aut corticis salicis succum ex oleo affricato. Summè namque denigrat. Denigrant barbam suber aridum & plumbum ustum, cum betæ crudæ succo mellis spissitudine illita. Fuluos aut reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiti. Crispos reddes capillos, si spuma salis cum myrrha confricaueris.

De pharmacis corrumpentibus pilos.

Pilos corrumpentia pharmaca.

EX Pharmacis corrumpentibus pilos, quædam propriè psilothra nominantur: quædam capillorum attenuatoria: quædā penitus extirpantia. Atque hæc sanè ultimò nominata, periculosi sunt usus. Ex liquidis igitur est lixiuium tali ui præditum. Ex aridis

autem & metallicis, arsenicū, & sandaracha, & calx non extincta. Manifestum itaq; est, uehementem ipsum uim, per admissionem imbecilliorū pharmacorum, frangi: quorum congruentem miscellæ modum coniciet primò, qui ipsorū uires cognorit. Dein uerò per experientiā defectum corriget, aut et addet.

Psilothra Critonis.

C Alcis uiuæ partes duas: auripigmenti partem unam. Hæc in mortarium plumbeum cōiecta, Psilothra Critonis.
aqua aut ptisanæ succo affuso terito: atq; ubi nigra reddentur, calfacta illini, maximè in balneo, iubeto.

Aliud. Amyli, calcis uiuæ, auripigmenti, sing. ꝑnc. j. contritis utitor ex aqua dilutis.

Quæ pilos disperdant.

D Isperdentia pilos componunt ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum cruore, marinæ testudinis sanguine, lachryma uitis albæ, lachryma hederæ, similiterq; bryoniæ, atq; oleo insulso. Ex marinis item scolopendris, urticaq; marina, & stellis marinis, nitro, & amurca, ad hæc admittis. Quin & fortiora his ex herinaceis & salamandra componunt, in oleo coctis. Admiscent autem ipsis alcyonia, & sandarachen. Pilos disperdentia.

Quæ pilos attenuant.

A Ttenuantia pilos, deterforig sunt facultatis. Igitur hordei, fabarum, atq; erui farina, spuma nitri, atq; ipsum nitrum, familiaria pharmaca sunt, omnibus ad tollēdas sordes usurpata. Assiduus autem eorum usus etiā pilos attenuat. Quæcunq; uerò fortius detergent, in ijs qui ualde duros & magnos pilos habent, adhibere oportet. Ac talia sanè sunt nitrum ustum, nitri spuma, & aphrolitrū spumosum, pumex, testæ ustæ, os sepia, utrunq; ueratrum, struthium, bryoniæ & dracunculi radix, aristolochia utraq; canchry, radix panacis, atq; id genus alia. Pilos attenuantia.

Quod si hæc ipsa odorata facere uis, cyperum, melilotum, rosas siccas, iunci odorati florem, iridem illyricam, melissophyllum, & cydoniam herbam eis admiscebis. Si uerò pro diuitibus pharmacū præpares, spicam nardi Indicam, Celticamq; & montanā inijcies; necnon Eretriada terram, folium malabathri, amomū, myrrham, crocum, costum, & hedychrom.

De furfuribus.

Furfures capitis a serosis succis oriuntur.

Quibusdam se scalpētibus furfuribus similia ex capitis cute decidunt, ob idq; Medici hoc symptoma furfures uocant, à uitiosis iisdemq; serosis succis proueniens, quos absumere propositum est, ijs qui huic malo mederi uolūt. Manifestum igitur est, discusoria & extersoria pharmaca adhibenda esse, præparato prius uniuerso corpore, si uitiosis succis redundet. Admiscuerūt quidam huiuscemodi pharmacis etiam astringentia nonnulla, quibus partem læsam ita corroborarent, ut non faciliè influentes humores susciperet.

Furfurum capitis curatio.

Remedium Archigenis contra furfures. Nitri spumam, & atramentum sutorium æquis partibus, cum uino tundito, utitorq; ter aut quater in mense. Aut uini Rhodij fecem, & punicis, & nitri, pares portiones, cum lupinis affrica.

De phthiriasi, hoc est, morbo pediculari.

Pediculi in capite a quibus causis oriuntur.

Pediculi nonnullis in capite acerrimè gignuntur, ex multis humoribus calidis quidē, sed non ad tantam caliditatē progressis, ad quantā perueniunt acres atq; serosi humores. Quare manifestum est, in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiā animalcula huiusmodi gigni possibile est: nō in superficie, in qua ipsi consistunt furfures. Pharmaca itaq; ipsorum necessariò exiccantia sunt, & quæ ex alio trahere, & euacuare possunt, magis utiq; q̃ ea, que conueniunt furfuribus.

Remedia Archigenis contra morbum pedicularē.

Staphidis

S Taphidis syluestris, partes. ij. sandarachæ & nitri, utriusq; partem. j. cū aceto & oleo capiti illine. Aut oxylapathi radicem cum oleo. Aut ueratrum album, & staphidem syluestrem, & nitrum, pari pondere cum oleo in balneo adhibe.

Pedicularis
morbi reme-
dia.

De Achoribus, hoc est ulceribus capitis manātib.

I Nter affectus inuadentes capitis cutem, Achor an numeratur, ex genere tumorum præter naturam existens; quo affectu infestata particula, foraminibus quibusdam tenuibus erodit, tenui humore modiceq; uiscido redundantibus. Ad similitudinē uerò eius pro-

Achores.

ximè accedit alia cutis affectio, quæ Ceriō Græcis, Latinis Fauus, uocatur: habens maiora foramina, in quibus humor hymetrio melli similis continetur. Generatio ipsis ex humore mixto est, qui partim tenuem, sero-
sumq; ac mordacem; partim crassum succum in se habet. Tenuis itaq; humor, utpote mordax, primū quidem, ad scaldendum ipsos impellit: progressu uerò tē-
poris, ad sculpturam, tum tumor augetur, tum forami-
na circa ipsum erumpunt. Manifestum igitur est, hu-
mores qui affectionem gignunt, debere uacuari. Qui

Cerion,

si etiam fluant amplius, prohibendus in primis est ip-
sorum influxus, per capitis, atq; uniuersi corporis eua-
cuationem. At uerò si affectio ipsa sit parua, sola reme-
dia localia sufficiunt, uel si minimè totum corpus ua-
cuetur. Ea igitur pharmaca idonea erunt, quæ crassum
humorem incidant, quæq; facultate sua necessariò dis-
cutiant, repellantq;. Atqui acetum ex incidentium or-
dine existens, ultra hoc quòd discutit, etiam reprimi-
t, depellitq; id quod influit: * quū nimirum secundum
substantiam suam habeat exiguum quid calidi: pluri-
mum autem frigidi, sed tenuium partium. Esse autem
debet acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus
uini qualitas persentiat. Ac tali profectò pharmaca
metallica imbues, achoribusq; ex ipsis medeberis. In

Achorū, fauo-
rumq; curatio

Aceti facultas

cipere autem ab imbecillioribus præstat, præsertim si simul dolor infestet. Apta igitur ad hanc rem sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiaq; terra: præterea pompholyx, spodiū, lithargyros, & cadmia tenella. Quòd si his remedijs malum non cedat, pharmacum ex chara siccum, aceto dilutum illinito. Prius tamen capillos abrades. Quòd si quando in ulcus manans inflammatum simul & afflictum dolore, incidas, lenies primum dolorem ipsum per humectum, cōcoctoriumq; & emolliens pharmacum, & quod acrimoniam arce-re possit: cuiusmodi sunt tum uocatum parygron, tum quæ sedis ulceribus, & cancris opitulantur.

Remedia Archigenis ad achoras.

CAdmiam cum oleo ueteri illinito. Aut cinnabari similiter tritum imposito. Aut chalcit. dē cum myrteo oleo, uel suillo felle liquido inungito.

Remedia Apollonijs ad Achoras:

CAput succo betæ illinito, aut laurino oleo, aut crocino unguento, aut taurina, aut camelina urina. Vel fursurum chœnicem dimidium in aquæ heminis duabus madefacito, posteaq; terito, cremoremq; excolato, cumq; dimidia aceti hemina ad lini spissitudinē coquito, & ex eo caput fricato. Vel cucumeris agrestis radicum coctarum succo partē lēsam illinito. Vel argenti spumæ, drach. viij. foliorum rutæ tenerorum drach. v. olei drach. viij. aceti quartam partem hemina: simul trita capiti illinito.

Quæ Crito ad Achoras prodidit.

FIculneæ furculos, aut folia tenera trita cum aqua imposito. Aut recrementi ferri, & rosarum par pondus cum uino tūdito, impositoq;. Vel lithargyri, drach. l. foliorum rutæ tenerorum, drach. xxv. aceto diluito: & rosaceo, aut myrteo excepta, cum penna illinito. Vel, si affectio fuerit inueterata, Ladani, cerussæ, singu. drach. viij. sulfuris uiui drach. iij. uino &

myrteo oleo subactis utitor.

Ex libris Cleopatrx ad Achoras.

Foenogræco tenui cocto, & in betæ nigræ succo macerato, caput eluatur. Post ablutionē uerò myrto cum uino & oleo trita, illinatur: superneq; betæ folia imponantur. Vel cerussę, thuris, sing. drach. ij. sulfuris drach. j. trita ex oleo illinito.

Remedia Sorani contra Achoras.

Plumbaginis, sulfuris uiui æquales partes terito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut lētiscino, illinito. Vel sulfuris uiui, lithargyri, cerussę, sing. æquas portiones, croci dimidiam: trita cum passo cretico illinito.

Ad psidracia, & achoras, pustulasq; ulcero-
sas, & eruptiones in capite.

Ad affectiones præscriptas, conuenienti uti oportet uictus ratione: corpusq; atq; caput purgare, catapotijs ex aloe, colocynthide, & scammonio, succo braslicæ coactis. Dein localia remedia adhibēda sunt: cuiusmodi existit adiantum ex rosaceo illitum: aut fœnigræci decoctum affrictū; aut malua cum farina hordeacea pro cataplasmate imposita: aut melilotum cum farina fœnigræci, cicerumq; decocto impositū; aut ipsummet cicer decoctū, impositumq;: aut amare nuces cōmansæ & illitæ. Discutit autē maximè & lilij radix affricta: & thus cum uino & aqua: & lupinorum amarorum decoctum: & bulbi cum nitro affricti:

Pustularū capi-
tis medicatio.

thus præterea ex aceto illitum: putamē mali

punici cum laurino illitū: & anchusæ

radix usta, tritaq; cum oleo, &

per pinnam inuncta.

Xxxx ij

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca, Liber Secundus.



Capitis dolor
discrimina &
generationes
variae.

VI citra distinctionem scripserunt auxilia doloris capitis, maius detrimentum, quod emolumentum, attulerunt ipsi, qui eis fidem adhibuerunt. Nec enim omnes ob unam affectionem caput dolent; sed tum ipsae affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singulatim propria existit. Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicem citra humorum affluxum; alia iuxta humorum qualitatem uersatur; tertia, secundum eorum solam multitudinem accidit; quibus accedit quarta, quum transitus liquorum atque uaporum ipsi humores obturant; ac praeterea quinta, dum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem, spiritus flatuosus innascitur. Est quum ob causam aliquam procatacticam (cuiusmodi sunt ardor extrinsecus, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut ictus) dolor capitis accidit. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt, iuxta caliditatem & frigiditatem: maximè quum inaequales fuerint; moderati autem iuxta siccitatem; ad humiditatem uerò nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, capitis dolor oritur, uehementior quidem, ob calidos & frigidos accidit; moderatior autem, ob exiccantes citra calorem aut frigus. Humectantes uerò, penitus nullum dolorem inferunt, quantum ad qualitatem quidem ipsorum attinet; nam ob multitudinem sanè, instrumentalium partium morbos efficiunt; non tamen similium particularum ullum aliquem: quum nimirum earum morbi in pura intemperie consistunt. Ad hæc, affectiones ob copiam humorum ortæ, citra quidem obturationem

Dolor capitis
nullus ad humiditatem consequitur.

Similium particularum morbi in pura intemperie consistunt.

caput grauāt: cū obturatione uerò si quidē ea modera-
ta fuerit, moderatè dolorificæ fiunt: sin fortes, uehemen-
ter affligunt. Quòd si etiā mordacem qualitātē mul-
tudo humorum sortiat̃ur, etiā iuxta hanc dolorem
augebit. Quòd uerò ad naturam affectarum particu-
larum pertinet, interdum quidem extra caluariam affe-
ctio fit: aliquando intra: & interdum quidem omnes
externas, aut internas partes infestat: interdum autem
non omnes, sed unam tātum speciem corporis: arteriā
nempe, aut uenā, aut neruum, aut membranā, aut
cutem, aut ipsum deniq; cerebrum. In uniuersum igit̃,
singularum affectionum curationis scopum, ratio nos
docet: materiæ uerò facultates experientia cōmōstrat.
Porro aliquando sola intemperie calida ex insolatu la-
borat caput: aliquando cum ipsa intēperie accedit etiā
humorum affluxus: præcipuè quum uniuersum corpus
daborat plethora, quæ fit ipsis quatuor humoribus ex
æquo auctis: aut etiā sanguine solo. Nam quum alius
quispiam humor redundarit in corpore, non plethorā,
nec simpliciter plenitudinem, sed pituitā, aut bilis fla-
uæ, aut atræ, tunc plenitudinem dicimus. Igitur eis qui
ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primū
contactum apparet: oculosq; rubros habēt, ac frigidis
tum perfusionibus, tum illitionibus, oblectantur. Prin-
cipio itaq; repulsoria curatione est utendum, ex refrige-
rantibus, astringentibusq; constante. Postea uerò mi-
tigatoria & cōcoctoria pharmaca, ad repulsoria misce-
re oportet. Deinde etiā ex discussorijs quippiam ad-
dendum, paulatim detractis pharmacis quæ repeliūt.
Optima sunt autem censenda, quæ substantia tenuiū
partium sunt prædita. Quapropter in principio quidē
melius est frigidissimū rosaceum perfundere, iuxta frō-
tem nempe, & tempora, & occiput: non tamen longē
inferius. Neq; enim faciliē exurit̃ur ea pars: neq; etiā,
citra noxam, refrigerantia sustinet, propterea q̃ isthic

Capitis dolorē
discrimina, se-
cundum diste-
rentiā affecta-
rū particularē.

Plethorā fieri,
q̃tuor ex æquo
humoribus au-
ctis: aut etiā
sanguine solo.

Doloris capi-
tis ab ardore
contracti, indi-
cia, & curatio.

Occiput nec fa-
cile exuri, nec
citra noxā re-
frigerari, prin-
cipiū spinalis
medullæ quum
sit.

Spinalē medullam in sexaginta nervos diuisiui.

Sincipitis regionē esse apertissimū ad trāsmittēdas vires medicaminum applicandorū. Rosaceū exussis cōmodum, quāliter cōfici debeat.

Chamæmelino oleo in quibus sit veniendū corporibus.

Refrigerandi medicamenta ratio.

Pergamus Galeni patria.

principium medullæ spinalis existat, ad stipitis modū in ramulos complures diuise, uidelicet in sexaginta (ut existimo) nervos. At uerò regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis ad coronalem suturam, & ob ossium tenuitatem & raritatem, faciliè tum caliditatem, tum frigiditatem omnium quæ adhibent pharmacorum, intrò distribuit. Quare siue refrigerare oporteat ex caliditate ardorem, siue calfacere frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Rosaceum autem ipsum, quo in exussis utemur, ex oleo crudo (quod omphacinum appellant) citra salis admistionem, confici debet: nempe rosis quibus plurimis in eo maceratis. Sit autem rosaceum non uetus, sed eo ipso anno confectum. Proximum à rosaceo chamæmelinum existit, quo utendum in istis corporibus est, quibus inducere uehementem frigiditatem ueremur: qualia sunt foeminarum, eunuchorum, puerorumque; ac breuiter eorum omnium, qui molli carne sunt præditi, albumque colorem sortiuntur. Refrigerabis autem quæcunque adhibere uoles, in aqua uehementer frigida collocata: quæ si non adsit, niuem uasculo circumpones. Etenim frigidorum fontium & niuis maxima Romæ est ubertas, quemadmodum apud nos in Pergamo. In regionibus autem calidis, qualis Ægyptus est, ubi maxima fontium frigidorum atque niuis Penuria, sub dio rosaceum per integram noctē exponi debet: eique semper uiui, aut portulacæ, aut lactucæ, aut psylli, aut polygoni succū iniungere oportet: sicuti & solani aliquando paululum, & pampinorum uitis, & uuarum immaturarum. A papa ueris uerò & mandragoræ succo abstinendum, quum non citra damnum refrigerent. Vitanda etiam sunt, quæ cum refrigeratione manifestè astringunt: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscendum, si quando necessitas postulet. Propterea sanè & solani succū aut nunquam pernitus, aut modicè certè, admiscemus: sic etiam & mali

*Ægyptus aqua
minimè magis*

Stupefaciētia, et quæ uehementer astringunt refrigerando, uitaenda in capitis doloribus eē.

punici, & mali cydonij, & mespili. Ad hanc tamē rem malorum punicorum acidorū succus præstantior est: magis enim refrigerat. Equidem aliquando cucurbite cremorem permiscui omphacio. Poterit etiam quis similiter seridis succo uti, necnon tum hortensis, tum sylvestris lactucæ. Quin & mororum non admodū maturorum succus est aptus ad refrigerandū. Si igitur calidus sit æger, aut breues habeat capillos, uberrimè refrigerari poterit: tum per iam dicta, tum per omnia illa quæ erysipelatis auxiliant. ¶ Qui ex frigore caput dolent, ijs facies decolor, minimeq; arefacta conspicitur: & frigidis neq; gaudent, neq; item iuuantur. Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum rutaceum oleum, si calidum affundatur sincipiti, perfectè hominem liberat. Si uerò uehemētiori calore sit opus, euphorbium oleum indatur, & pharmaca quæ cunq; cōstant ex pipere. Inungenda autem est facies, ac tum aures, tum nares, precipuè irino, amaricino, & nardino unguētis: necnon solatis, spicatisq; uocatis. At opobalsamum sæpe expecti sumus ad nullam affectionem calore indigentē, euidenter opitulari. Sampsuchinum autem, laurinum, & serpyllinū cōmendo. Propinādum p̄terea ijs est uinū tenuium partium, & motus corporis præcipiendus, lauaq; calida: & quandoq; à raphano uomitus.

In capitis autē inueteratis affectibus, necessarò pilos radimus, aut præsecamus ad cutim usq; ac rasis quidē, admouemus pharmaca emplastica: liquida uerò ijs, quæ breuissimè habent capillos præfectos. Ac sanè medicamenta refrigerantia, ex ijs quæ erysipelata curant, sunt transferenda: calfacientia uerò, ex pharmacis calfacientibus conficiēda: quorum simplicissimum est ex euphorbio compositum. Sufficit autem uncia euphorbij unā, ad tres ceræ liquefactæ in olei libra una, coniungere. Atq; utendum quidem astrin genti oleo, ad affectiones quæ indigent calore, non est: sed aliquo tenui

*Refrigeratium
sylvæ, quibus, tu-
to vti in capi-
tis doloribus
possumus.*

*Doloris ca-
pitis cū a fri-
gore idicia, &
curatio.*

*Opobalsamū
ad effectiones
indigentes ca-
lore, nō magno
pere opitulari.*

*Dolorum capi-
tis inueterato-
rum curatio.*

Dolorum capi-
tis ab ebrieta-
te curatio.

partium, cuiusmodi Sabinum existit.

Quibus autem ob portionem calidiorum uinorum, ca-
put repletum uaporibus aut humoribus calidis (solent
etiam hi uel absq; uini potu, suapte natura ad caput at-
tollī) dolore affligitur, iubendi s̄ sunt, si crudum adhuc
in eis uinum p̄maneat, ut hausta aqua tepida uomāt.
Quòd si etiam post concoctionem caput doleant, re-
frigerantibus ac repellentibus est utendi: quae est ro-
faceum per se, & cū aceto, aut hederā, & brassicā cre-
more. Quin & ipsa brassicā folia calida macerata, ca-
pitiq; circūposita, ac obligata, naturaliter ebrietati re-
sistunt. P̄ter eum somni quietisq; cura in primis habē-
da est: ubi uerò per totum diem quieuerint, ad uesperā
loti, cibis boni succi nutriendi sunt, non tamen calfaciē-
tibus. Sunt autem tales ptisanæ succus, & sorbitio ex
alica, & panis ex aqua, & oua sorbilia absq; garo. Ad-
miscetur autem eis ex melle, uel ex sale condimentis
aromatum p̄parato, quantum sit satis ad suauitatē
saporis. Ex holeribus congruit illis lactuca, utpotē bo-
ni succi atq; refrigeratoria: necnō brassica, ut q̄ uapo-
res reficet: sic & ex leguminibus lens. Potu uerò om-
nino aqua utendum est. At quia nonnullis uenterculus
à frigidā potu subuertitur, malum punicū ipsis super-
edēdum est, aut solum per se, aut cū alica flaccida cali-
da, p̄beq; cocta. Quin & mala Cestiana appellata in
urbe Roma, citra cocturam quidem, sunt austera. post
cocturam uerò, stomacho euadunt cōmoda. Coquen-
da autem sunt ad uaporem aquæ suspensa. Abstinen-
dum uerò à palmulis est, ut quæ ex proprietate dolorē
capitis excitent. Quòd si moderatē iam habeant, &
aquā bibere nequeant, permittendus est eis potus ali-
cuius uini diluti et aquosi, quale est in Italia Sabinum:
in Asia Titacazenum. Quin & moderatē habētibus,
gallorum testiculi & alæ, & saxatiles pisces, mollesq;
exhibendi sunt: necnon columbarum pulli. Hæc uerò

*Brassica ad
uersari ab
notab*

Cibi idonj.

Cestiana mala

Palmulas ex
proprietate ex-
citare dolorem
capitis.

omnia, citra garum et uinū, in albis simplicibusq; co-
quantur iuribus, quæ ex aqua, oleo, anetho, ac modicò
porri constāt: ad cocturæ finem, salis pauxillo ad-
iecto. Caterū ante cibum quidem pluribus deam-
bulationibus est utendum: post acceptū uerò cibum,
breuib; ac lentis. Oportet tamen nec multa edif-
se, nec statim post cibum sumptum inambulare, sed
post duas, aut tres, aut plures horas. Quòd si quan-
do à uaporibus aut humoribus in caput sublatis,
reliquiæ quædam supersint, in poris ipsis, meatibusq;
angustis impactæ, & ob id etiam perseueret
capitis dolor, non rosaceo, sed utendum primū cha-
mæmelino est, moderatè calido: postea uerò irino.
In balneo uerò caput calida perfundatur, nō modò
ut aliquid eorum quæ circa ipsum consistunt, discutiatur,
sed somni etiam conciliandi gratia. Quapropter
secundum etiam, aut tertium, ad uesperam, bal-
neum apparandum est: post quod exhibendæ lacu-
cæ ex aceto, cui pauxillum, aut omnino nihil gari ad-
ditum sit: uerū aqua affusa multa, ita ut acetū exæ-
quet, nisi acetum sit planè aquosum: quale utiq; illi
desyderant: quandoquidem quod acerrimum est,
aliquem calorem sortitur. Post hæc uerò postera die,
quæ magis caput calfaciant, administranda sunt: ita
ut ad irinum aliquando amaracinum unguentum,
aliquando nardinum addamus. † At capitis do-
lor ob plagam cōspiciuam ortus, nihil est aliud q̃ in-
flammatiō: quæ non ex plaga solū aut casu, sed absq;
manifesta etiam causa, iuxta omnes partes fieri ob
affluxum humorum consueuit. Si igitur plaga uul-
neris aut cōtusionis existat causa, plures scopi erunt
ad inuenienda præsidia. Vnus qui circa uulnus uer-
satur, quod, postea q̃ fuerit constrictum fibulis, glu-
tinantia & arcentia phlegmonem medicamenta po-
stulat. Secundus contusioni est intentus. Tertius, toz

Albi iuris cō-
positio.

*Ex melle
Soma. gnat.*

Balneum con-
ciliat somnū.

Capitis dolor
ob plagam or-
tus, quos medē
dī scopos lar-
giatur.

tus in doloribus est: qui interdum quidem in ipsis solis percussis partibus sunt: plurimum autem ad uicinas etiā partes se extendunt. Etenim pericranium, & eius cutis exterior, propriam continuāq; substantiam habent, per totum caput extensam: ob idq; sanè contingit uniuersum caput dolore affici: præsertim si ad periostion membranam, quæ cranio est adhærens, plaga ipsa penetret: cui medebimur diuidentes pericranium membranam, subditumq; illi os radentes, utq; illic rursus concrescat caro, curantes. Quod si ob cōmercium illud quod per futuras periostion habet cum duro cerebri inuolucro, etiam intra caluariam distribuatur phlegmone, non absq; periculo talis dolor contingit. Contingit autem non rarò, ubi quis ex sublimi cecidit, ut aliquid circa cerebrū, aut membranas eius, rumpatur: quod ubi cōtigit, adhuc amplius inualefcit ipse capitis dolor: affectioq; tota ægrè curabilis redditur, & periculū maius, magisq; præceps imminet. Optimum itaq; fuerit in his, nisi ætas prohibeat, uitalis uel facultas appareat debilis, curationem à uenæ sectione auspicari: & conuenientibus capitis irrigationibus subinde uti, oleo dulci imbuentes lanam, capitiq; illam circumponentes. Quod si aut per ætatem, aut uires, non liceat sanguinem ipsum detrahare, deiiciēda alius per clysmum est, tum ut eius excrementa uacuentur, tū multo magis ut reuellantur humores n̄, qui consueuerunt ferri ad affectas pticulas. Postea uerò auxilijs utemur ad inflammationes congruentibus. Si igitur membrana cerebri uulnerata fuerit, egregiè ipsam cōglutinat (ut ait Archigenes) calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa: deinde butyrum & roseaceum, ac adeps fuillus insulfus, uetusq; , omnia in unum commixta, tepesactaq; , & infusa. Hoc modo affectos, à uino & cibis crassioribus abstinere oportet.

Dolor capitis
ex ictu et ortu,
cor si pe ex
tendat per uni
uersum caput.

Capitis dolor
ex plaga, quan
do exiit per ei
us os.

Meningem ce
rebri uulnera
tam cōgluti
natis.

set, maximè si correpti sint febrî. Etenim affectio ipsa nobis auxilia indicat: quantitatem autem singulorum, particularemq; materierum differentiam, tum affecta particula, tum ægri temperamentum com-
monstrat: necnon uitalis facultas: deinde ætas: ambientisq; nos aeris temperies, iuxta regiones, anniq; tempora, & prædominantem anni constitutionem euarians. Porro ad phreniticos, quandoquidem omnia quæ extra caluariam circa cutem atq; ipsum pericranium consistunt, immunia ab affectu sunt, rectè, mea quidem sententia, alijs pharmacis acetum miscuerunt ueteres. Siquidem ad affectiones in profundo delitescentes, pharmaca diuersa ab iis, quæ affectibus in superficie hærentibus congruunt, debent administrari. Exoluitur nanq; omnium ipsorum uis in transitu per profundum: & ob id ad propria affectioni auxilia, aliquando contrariæ, & nocentis facultatis pharmaca temperamus. Quippe acetum ex se, quum nec mitigandi, nec laxandi uim habeat, præter rationem miscetur auxilijs ijs, quæ ad dolentem inflammationem administrantur. Quia uerò per sinciput pharmacum penetrare uolumus, ob id sanè ali-
quod eorum, quæ in profundum deducunt, miscemus: interdum quidem frigida facultate, sed tenuium partium, præditum: cuiusmodi acetum existit: interdum uerò calida, quale est euphorbium. Quocirca, dum crassæ membranæ cerebri nudè instillamus rosaceum (quod fieri solet, ubi ossiculus aliquod est exemptum) solum ipsum leniter tepesfactum infundimus. Quum uerò citra denudationem, integra existente caluaria, rosaceum cupimus ut per sinciput ad membranam cerebri penetret, acetum illi, ut ipsum perducatur, temperamus: cuius uehemens facultas, tum per uiarum transitum, tum per rosacei miscellam, exoluitur. Iam uerò, inflammationes quæ in ca-

Affectiones sitæ in profundo diuersa pharmaca ab iis, quæ hærent in superficie, desiderant.

Acetum cum miscetur rosaceo ad phrenitidæ.

Fractio cranio, commodè instillari rosaceum tepens in crassam meningem. Acetum quando sit rosaceo miscendum ad affectiones capitis.

Acetum rosaceo mistū, quibus profit, & quib⁹ oblit inflammationibus.

pitis cute, aut etiam in pericranio consistunt, si quidem citra uehementem dolorem accidunt, per modici aceti ad rosaceum mistionem iuuari possunt: legentur autem, si & magnæ fuerint, & dolorem uehemētem induxerint. Adhæc, rosaceum cum aceto, incipientibus: in uigore uerò consistentibus, rosaceum solum administramus: quemadmodum etiam in induratis, absynthium ei atq; pulegiū miscemus: nam quæ absq; duritiæ iam decrescunt inflammationes, pharmaca laxatiā desyderāt. Porro ad dolores capitis, in quibus exiccare est animus, commodissimum cataplasma ex lolij farina & adipe anserino conficitur. Sciendum autem est, myrrhæ odorem plurimis etiam sanis dolorem capitis conciliare: unde eos ipsos qui iam caput dolent, non parum offendet. Opio autem eo tantū tempore uti cogimur, dum præ doloris uehementia æger de uita periclitatur. Extinguit siquidem sensus, maximeq; solidas partes offendit, adeò ut postea correctione sit opus. Quū autē difficile sit, ut qui homo est, non in multis hallucinetur, quædam uidelicet penitus ignorando: quædam male iudicando: quædam negligentius scriptis tradendo: mirum cuiquam esse non debet, si aliquādo deliquisse comperiat. Archigenes, in ijs quæ de curatione capitis doloris conscripserit.

De capitis dolore à uentriculo exorti.

Capitis doloris ob uentriculi cōsorti oborti, & indicia, & curatio.

Nonnulli autē uel si modicus humor in eorum uentriculo colligat, & præsertim circa os eius, statim caput dolent: atq; ob id, si diutius à cibo abstineant, offenduntur. Augetur quippe esuriētibus eiusmodi humorum malicia. Quū igitur huiusmodi affectus capiti proprii non sint, sed ab humorum noxijs uaporibus à uentriculo uolitantibus exoriantur, quemadmodum etiam ob id genus succos, alijs suffusorum symptomiata eueniunt: capiti adhibenda re-

media non sunt: sed q̄ celerrimē qui in uentre con-
tristant succi, uacuandi. Vacuantur autem in ijs qui
ad uomitum sunt procliuēs, facilē ab aque potu: egrē
uerō uomentibus, difficilius. His igitur conabimur
q̄ primum cibum boni succi, ac uentriculo commo-
dum exhibere, si res ita ferat, à balneo: si nō, ante bal-
neum tantum cibi offeremus, ut non lædantur inde
postea lauantes. A cœna autem modicum absinthij
in potu dabimus: postridie uerō, in posterumq̄, si-
mitem uictus rationem illis instituemus, donēc exa-
ctissimē concoquant. Quo tempore iam licebit illis
modicum panis præbere circa tertiam aut quartam
horam, aut citius, aut tardius: sic tamen, ut satis am-
plum spatium ad consuetam balnei horam intersit.
Quod si qui panem absq̄ obsonio edere nequeant,
his oliuas, aut palmulas, aut uuas, aut tale quippiam
addemus, iuxta naturæ cuiusq̄ proprietatem. Cate-
rū ad prauorum in uentre colligendam succorum
copiam, plurimum conducit tum imbecillitas conco-
ctricis potentia: tū oris uentriculi infirmitas; quem-
admodum etiam ad capitis hinc dolores gignēdos,
tum facilitas sensus, tum caput ad eiusmodi humo-
rum uapores suscipiendos promptum: sicuti etiam
& in nōnullis oculi. Qui igitur propter acres humo-
res caput dolent, mordacem dolorem, non tēsum,
percipiunt: at fames in tensionibus commoda est:
contraria autem iis, qui mordaces humores college-
runt in ore uentriculi. Quum itaq̄ hic mordax hu-
mor fuerit amarus, pallida & flaua bilis uocatur: que
ob leuitatem insitam sursum fertur, ad os uentriculi:
quum uerō pituitosus, aut acidus, aut salsus fuerit, ma-
gis in totius uentris spatio continetur: ac fuerit sanē
optimū, si in fundo uentris is cōtineatur. Omnium
autem est pessima constitutio, dum uiciosi humores,
uentris tunicis ineluibiler sunt defixi, & imbibiti:

Vitiosis succis
in uentriculo
colligēdis, que
conferant.

Famem aduer-
sari iis q̄ mor-
daces humo-
res collegerūt
in ore uentri-
culi.

Famem aduer-
sari iis q̄ mor-
daces humo-
res collegerūt
in ore uentri-
culi.

Hiera picra,
optimi medica-
minis ad ex-
purgandos hu-
mores tunicis
uentriculi infi-
xos, descriptio.
Crocī odorem
ferire caput.

quibus educendis optimum remedium est hiera picra, cuius talis sit compositio. Aloes, drach. C. cinnamomi, spicæ nardi, xylobalsami, Chia mastiches, asari, & croci, sing. drach. vj. Præstantius autem est pharmacum, ubi minus de aloë additur: minusq; etiam ex croco: quando quidem nonnulli ex usu ipsius oblæduntur capite: id quod sæpe ex solo eius odore perpetimur, Quare optima erit ea compositio, quæ aloes drach. xc. croci quinas receperit: quā sanelle ipse utor. Præstat etiam pro asaro carpesiū coniicere. Propinatur ad summum ex pharmaco drachma una cum aquæ calidæ cyathis tribus: minimum uerò, dimidium eius præbetur. Confert autem hoc pharmacum, ijs qui suffusorum afficiuntur symptomaticis, & mulieribus quæ non pro dignitate purgantur. Quemadmodum autem in uentris & intestinorum regionibus ob caloris quidem inopiam, interdum ex cibo ac potu uapor flatulentus producitur: propter imbecillitatem uerò facultatis comprehensiuæ, adeò inflantur atq; replentur ea organa, ut ipsius quidem repletionis ratione tendantur: ob tensionem autem impense doleant: sic etiam in partibus quæ ad caput pertinent, possunt hæc eadem contingere. Et enim ob dissolutionem continuitatis partium dissimilarium, dolor oritur. Dissoluunt autem ipsam, erosionem, dissecantiam, distendentiam, uehementer calfacientiam, atq; refrigerantiam. Si igitur erosionis, aut punctiōis sensum percipiāt ægri, acredo uel humorum, uel flatus, causa putanda est. Si uerò citra morsum tendantur, tensio ipsa uel ab spiritu flatulento, uel ab humoris colluuiē, oboritur: quo in genere phlegmone erysipelasq; consistit: phlegmone quidem, ubi plurimum sanguinis affectam particulam occupat: erysipelas uerò, ubi biliosus fuerit is humor. Quod si ab utrisq; redundantibus aliqua pars repleatur, aut in-

Hiera picra quibus congruat affectibus.

Dolor unde exoritur.
Cōtinuitatem quæ soluant.

Phlegmone fit a sanguine.
Erysipelas oritur a flaua bile.

Inflammatio erysipelatosa, aut erysipelas inflamma-
 tum talis affectio erit. Maximè itaq; artis curadi con-
 iectura in affectionum cognitione consistit: quæ ubi
 inuentæ fuerint, curationem non coniecturaliter, sed
 scientificè indicant: cum hoc quòd etiam cognoscere
 datur, q̃p̃ ægrè aliquæ affectiones medelis cedant: in
 quibus ut utamur semp̃ remedijs ab indicatione pro-
 fectis, rationi est consonū: tametsi nihil iuuare in prin-
 cipio uideantur. Aliquando enim adeò uehementer
 in angustijs meatuū flatus uaporosus, atq; eo adhuc
 magis uiscidus crassus ue humor, impingitur, ut mul-
 to tempore ad curationem sit opus. Ac sanè quæ sic
 infarta sunt, attenuare oportet, dilatareq; meatus, per
 quos excernantur, habita simul prouidentia, ne quid
 aliud amplius influat: utq; ps affecta corroboretur,
 ne ipsa etiam flatulentum gignat spiritum. Qui igitur
 primi ad eiusmodi affectiones pharmaca compo-
 suerunt, meritò habuerunt opus materia uaria si qui-
 dem influentem substantiam, siue humor, siue uapor
 ea sit, repellere necessarium existit: impactam uerò
 concoquere, & attenuare, eandemq; ipsam discutere:
 ac nihilo minus, immo longè magis, affectæ parti ro-
 bur inducere, ne uidelicet quod influit, suscipiat: utq;
 attenuatum excernat, impactumq; concoquat, atq;
 subtilius reddat. Ergo in proposita dispositione, si do-
 lorificus calor unà cum spiritu flatulento præpolleat,
 in principio quidē repulsoria curatione est utendum,
 quæ ex facultate refrigerante constat. Quod ubi fa-
 ctum moderatè est, ex mitigatorijs & concoctorijs
 quippiam ad repulsoria miscere oportet: dein discus-
 soria addēda ita, ut paulatim repulsoria detrahamus,
 donec pharmacum ipsum plurimū quidem digerens
 attenuatoriumq; reddatur: minus autem concocto-
 rium & mitigatorium: minimum uerò repulsorium.
 Portulaca igitur refrigerantis & aquosæ substantiæ

Tumores cō-
positi.

Coniectura ar-
tis medicæ, in
affectuum co-
gnitione consi-
stit.

Præsidia opti-
ma, cur sepe in
principiis nihil
iuuare uidean-
tur.

Impacta eē co-
quenda, atte-
nuanda, discu-
tienda. p.

Acceti facultas.

Boreæ frigiditatem esse tenuiū partium. Rosacei facultas.

Inedia nō esse utēdum in causis biliosis.

Vena in quibus non sit secanda.

Clysmos fortes ualide reuellere a capite.

Capitis dolentis remedia.

Capitis doloris a bile orti, indicia, & cura tibi.

Bilis quibus medicamentis purganda.

est: minus ea polygonum: in solano tantum crassæ & terreæ est admistum, quantum alstrictionis. Acetum repulsoariam simul & attenuatoriam, immo & discussoriam facultatem sortitur: utpote quod secundū temperiem, frigiditate quadam tenuium partium prepolleat, nō secus quā exquisitè serenus Boreas. Rosaceum porrò, repulsoariæ, concoctricis, mitigatricis, ac denique discussoriæ facultatis est princeps. Vt ergo sermonem iam habitum repetam, neque in biliosis causis iniungenda est inedia: neque utendum uenæ sectione, si puer aut senex sit æger, aut uirium imbecillitas adsit. Licebit autem uti ualidis clysmis, quā maximè hi possint reuellere à capite, uacuareque non modò quæ circa uentrem & mesenterium consistunt, sed etiam quæ in finis hepatis hærent. Commendat autem Archigenes irrigationes ex ruta, oleo, & aceto intrita, ad dolores capitis: sicuti & succum baccarum lauri cum aceto, & ruta. Sciendum uerò est aridam rutam esse multo acriorem, & calidiorē uiridi.

Qui caput ob humorem biliosum dolent, iis signa similia sunt eis quæ ab ardore profiscuntur. Accedit his maior morbus, & faciei pallor, & nonnunquam oris amaritudo.

Ætati autem uigoris, & temperaturis calidioribus, & uitæ sollicitæ, & iis qui flauam bilem accumulānt, hæc affectio præcipuè cōtingere solet. Itaque balnea temperata, & unctiones, & potus dilutus, eis exhibēda sunt, omnisque uictus ratio tum * humidior, tum boni succi, constituenda. Euacuandus item biliosus humor per absynthij cremorē est, aut per aloē, & per ipsam picram antidotum, per se datā, aut modico scamoni adiecto: uel per catapotia ex aloë confecta. Illinenda frons pastillo croceo, aut appellato Trigono, aut aliquo alio his simili. Si cum uerso corpore caput consortij lege afficiatur, prospiciendum illi est. Igitur si plenitudo humorum, ac ma-

ximè

ximè circa uenas constiterit, tundemus uenam. Si uerò magis qualitas inualuerit, utemur purgâti pharmaco. Si caput uni tantum parti condoleat, ut hepatis, uentri, aut ipsius ori, illis in primis opitulabimur: nêpe calida in ipsis præpollente intemperie, panem ex diluto uino exhibentes, sorbitionesq; ex alica: ac foris etiam utentes irrigationibus, quæ tum refrigerent, tum firmitudinem addant. At si ob uiscidos & crassos in uentriculo contentos humores caput quis doleat, etiam hos exturbabimus, acetum mulsum in potu præbendo. Ex hyssopo etiâ origanoq; potionibus, & quæ his adhuc ualentiores sunt, magisq; incidendi ui præditæ, utemur: necnon à radiculis uomitu, irrigationibusq; & cataplasmatis calidioribus.

In doloribus autem capitis qui ab initio inuasērūt cū febribus, uena secanda est, post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediât: & præsertim in corporibus bonæ habitudinis, & multo sanguine redundantibus. Quod si serius post septimā diem dolor ipse prehenderit, aluo prius abundè per clysterem soluta, cucurbitulæ ad occiput, aut ceruicem, sunt affigendæ: caputq; irrigationibus ex oleo fouendum: rosaceo quidem, & cum modico aceto, in calidioribus, & tempore æstiuo; chamæmelino uerò, in frigidioribus habitudinibus, ac hyeme: quinta parte aceti illi adiecta. Illinenda frons in frigidioribus quidem, est ex cyphi: ex crocomagmate aut, in calidioribus. Porro uitæde sunt in oibus capitis affectionibus ea quæ subduntur: nêpe viticis semē, absynthij succus, lac in potu, glâdes quercinæ in cibo, oliuæ nigræ, arbuti fructus, eruum, quod etiam exoluit articulos: amplius autem offendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem etiam perturbât lentisci fructus, crocus, paucedanū, cyclaminus sicca cum uino epota. Styrax modicus quidem potatus, tristitiam uultus discutit: multus uerò, somnos turbat.

Capitis dolorum cum febri ab initio affligitū, curatio.

Cucurbitulæ quando affigendæ occipiti.

Capitis in omni dolore quæ sint vitanda.

Crocus perturbat mentem.

Styracis facultas.

lentos conciliat.

De Cephalæa.

Cephalæa.
descriptio,

Cephalæa inueteratus & ægrè cedens capitis dolor uocat, qui ex leui occasione maximas exacerbationes habet: adeò ut neq; strepitum, neq; uoces uehementiores, neq; lumen splendens, neq; uini potum, neq; odora menta caput repleant, ægri perferre possint: neq; item motum: sed in quiete & tenebris decubere ob doloris magnitudinem uelint. Etenim tanquã à malleo percuti sibi uidentur. Sunt qui ueluti contundi ac distendi sibi ea quæ circa caput sunt, sentiunt: nõ paucis uerò usq; ad oculorum radices ipse dolor progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando quidem continuos dolores: aliquando uerò exacerbationes, & interualla. Manifestũ igitur est, hanc affectionem consimilem aptitudinem capitis, ut obliædatur facili, habere, quemadmodum in cephalalgia. Verũ ad maiore

Cephalæa magis deicit facultatē, q̃ cephalalgia.

Cephalæa varia symptomata a diuersis causis producta.

imbecillitatem deueniunt in hac affectæ particulæ capitis. Ac sanè quidam ex sic affectis, cerebri inuolucra dolitant: quidam pericranium dūtaxat. Dolores igitur cum grauitate, multitudinem humorum significant: cū mordacitate uerò, aut humorũ, aut uaporum acredine: ut cum pulsu, obortam inflammationem: at cū tensione, si quidem citra grauitatem & pulsum accidat, spiritus tenuis ac flatulenti multitudinem indicant: cum pulsu uerò, membranosi corporis inflammationem: at si cū grauitate distentio accidat, humorũ multitudinem intra membranas contētam arguit. Rursus, dolores quidem in superficie herentes, pericranei affectionē significant: qui uerò in profundo sunt, cerebri inuolucrorũ.

Dolor capitis intra caluariã situs. cur extendatur ad oculorum vsq; radices.

Quibus cunq; autē affectio intra caluariam est, is usq; ad oculorum radices dolor extendit, propterea q̃ oculorum tunicæ ex cerebri inuolucris suam ducunt originem. Si uerò putrefactus humor calidior fiat, cū febris capitis dolor inuadit. Febricitant autē omnino, & qui

dolent propter inflammationem. Si igitur totius corporis plenitudo sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore uniuerso uacuato. Si uero imbecillum existēs caput, sublato ad se humores ac uapores susceperit, materiā reuellere oportet in totum corpus, atq; ita mederi particulæ. Reuellemus itaq; & clysmis, & uinculis extremorum, & pluribus ifernarum partium frictionibus, interdū etiam sanguinis ex cubito detractiōe. Quod si amplius redundare sanguis uideatur, etiam reserata in naribus uena, & sanguine, quantum par sit, vacuato. Dein hieram dabimus exacutā: posteaq; apophlegmatismis elicientibus pituitam, & medicamentis quæ naribus inferuntur, utemur, qualia sunt quæ ex elaterio, & cyclamino cum lacte & porro apparantur. Caput autem curabis, quando quidē reuulsorij uti oportet, per repulsores irrigationes. **C**æterū post totius corporis euacuationem, uteris caput uacuātibus: dein ijs quæ firmitudinem addant. Repellit igitur immaturum oleum, rosaceumq; per se, & cum aceto, & ex papaueris capitulis, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, & menta uiridi præparatum. Applicentur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior multitudo humorū extiterit: frigida uerò, ubi calidior, biliosiorq;. **D**igerit autem oleum dulcis simū calidum, & magis inueteratum, itemq; sicyonium. Si uerò cras sior sit copia humorum, spondylium, aut serpyllum, aut pulegi comam, aut calaminthen, aut mentham, oleo incoquens, multitudinem euacuabis. Eadē hæc parti etiam firmitudinem addunt, quapropter usq; ad perfectam curationem ipsis utendum est. Omnium porro longè maximè discutit perfectè corroborat uerbenaca recta, oleo incocta. Conijcienda etiam ad eam crocodiliadis præsertim iuxta aquas nascentis, radix. Maximè etiam conferunt sub hydrijs aselli nascentes, si oleo incoquantur. Aduerte autem, capitum papauere.

Reuellēdi a capite modi diuersi.

Venam reserata in naribus conferre ad dolorem capitis. Erthina.

Caput esse uacuandū post totius corporis euacuationem. Repellentia.

Digerentia.

Verbenacæ rectæ facultas. Aselli.

ris usum, tempestiuum esse incipiente affectione: nocere autem, si ijs in dolore inueterato urantur. Iuuant uero non instrenuè fomenta tñ ex semine lini & rosaceo;

Papaueris capitibus quādo sit nobis vten- dum.

Sal est ad capitis fomēta in- ptum.

Perseæ fructū in Persis letalē ēē in Ægypto autē innocuū.

Cucurbitulis i affectibus capitis quādo vte- dum.

Cohibitio spiritus.

Sternutatoriū ab Asclepiade scriptum.

Apophlegmatismus Asclepiadis.

grauitatem, capiti negotium facescunt. Archigenes inter cataplasmata uaria, uiticis semen, perseę uiridis folia, & myrrhā æquis portiōibus mista, exceptaq; Ægyptio unguento, fronti ad mouere præcipit. Cæterum in sola Alexandria ipse Perseam arborem uidi; cuius fructum in Persis quidem letalem esse; in Ægypto autem innocuum, sunt qui contendunt. Porro sanguinis à locis affectis detractiones conuenire in affectibus inueteratis, non Archigenes modò, sed omnes serè Medici consentiunt. Verum cucurbitæ occipiti affixæ, ex reuulsiōis auxilijs sunt, quū humores ad oculos, aut ad anteriorem capitis partem ferri consuetos, auertere properamus. Iubet autē Archigenes ut sternutatorijs quatiamus caput, fasciolaq; circumposita collo, spiritu cohibitionem moliamur. Tam uero, ad affectiones frigidas inueteratas, eisdem medicamenta ex thapsia & sinapi soleo adhibere: minimè autē ad calidas. At chamæmeli (quā anthemidē uocāt) florem quidē, olfactu auxiliari dolenti capiti, ait Archigenes; folia autem nocere. Sternutatorium ab Asclepiade scriptum. Veratri albi, rad. cucumeris syluestris, struthij, sing. partes. ij castorij, acori, nitri rubei, euphorbij, cumini Aethiopici, sing. partem. j. trita insufflato. Medicamen ab eodem traditum, quod mansum caput purgat, Piperis albi, origani, staphidis syluestris, cassiæ, sing. drach. ij. excipiantur passularum exacinatarum, aut caricarum carne, & mādenda exhibeantur. Cæterum non statim à principio efficacissima adhibere conuenit, sed à debilioribus auspicari. Porro fortia pharmaca, quibus ad mouēda sternutamenta utimur, mitigatoriorum admistione lenita, moderata sūt. Ob id quædam ipsorum muliebri lacte

fecēti & aqua diluo: post hoc, oleo dulci: dein betæ suc-
co: & anagallidis quæ florem cœruleum habet, itidem
succo: atq; ita sensim in usu eorum progredior, donec
postremum etiam per opobalsamū talia dissoluo. Ego
autem melanthium soleo infundere naribus: aliquando
quidem aceto acri præmaceratum: aliquando oleo ue-
teri intritum. Interim uerò dum æger errhinis utitur,
habeat os aqua plenum.

Errhina quib;
leniri debeant
liquoribus.

Os aqua replē-
dum esse, dum
quis errhinis
utitur.

De Hemicrania.

Hemicrania uerò affectio dolorifica est, dimidiam
tantum capitis partem infestans: interdum quidē
dextram: interdum autem sinistram: quæ futura exten-
sa secundum illius longitudinem, terminatur. Vt pluri-
mum autem per circuitus exacerbatur, influxu uapo-
rum, aut humorum, causam dolori suggerente. Quidā
igitur, ipsorum circa temporum musculos uehementer
dolitant: quidā dolorem longē ulterius progrediētem
habent. Sunt qui ad eò uehementer cruciētur, ut ne ma-
nus quidem contactum faciliē ferant: in quibus palā
est, pericranium affectum esse, neq; eius cutem omni-
no immunem ab affectione existere. Rationi igitur cō-
sentaneum est, uaporum, aut humorum, aut utrorūq;
influxum, aut à cerebro & illius inuolueris, aut ab uni-
uerso corpore illuc trāsmitti. Quapropter ubi quis he-
micraniam curare aggreditur, prius quali purgatione,
aut uenæ sectione æger indigeat, consideret: atq; ita
deinde ad capitis auxilia progrediendo, tum per digi-
tos suæ manus, tum per linteū, dimidiam frontis par-
tem, & eam maximē quæ circa temporis musculū est,
confricando excalfaciat: id quod ante exacerbationis
tempus faciundum est. Post exacerbationē uerò, phar-
macis hemicranicis dictis utendum: si quidem multa
caliditas in doloribus percipiatur, ijs quæ refrigerans
quippiam habēt: citra uerò hanc, eis quæ * sufficiēter
excalfaciūt. Vtriusq; tamen aliquid ex ijs quæ robur &

Hemicranie
descriptio.

Hemicranie
causæ.

Hemicranie cu-
ratio.

**Hemicraniiis in-
ueteratis reme-
dium,**

**Euphorbiū re-
cens quidē, esse
candidius; pal-
lidius autē in-
ueteratum.**

**Pergamus pa-
tria Galeni.**

**Hemicranii frigide que opitu-
lentur.**

firmitudinem addūt, misceatur, quod astringentem uel
delicet facultatem sortiatur. Porro ex meis præcepto-
ribus quidam ad hemicranias inueteratas utebatur pi-
peris albi, & crocei magmatis singulorū drachmis dua-
bus: mistis cū euphorbi drachma dimidia. Quum au-
tem cito facultas euphorbi exoluatur, in huiusmodi
sanē medicamentis non est utendum ueteri. Est autem
candidius, quod recens est: nam quod inueteratū exi-
stet, flauiolem aut pallidiorlem sibi colorem contrahit.
Similiter etiam & columbarum turricularum, sibiq;
uictum quærentiū, stercoris, & atramenti scriptorii, li-
cebit addere utriusq; dimidiam drachmam: ex ipsisq;
omnibus aceto acerrimo dilutis, conficere medicamē
hemicranie sanandæ idoneum. Ad hanc autem rem,
Pergamenum nostrū atramentū multo est præstātius.

Aliud pharmacum ad hemicraniam, & omnem in-
ueteratam capitis affectionem summē utile. Croci
drach. xv. chalcāthi, drach. x. aluminis scissilis, drach.
xiij. myrrhæ, opij, omphacij, sing. drach. iij. gūmi, drac.
xv. omnibus tritis uinum Phalernum adijce, et rursus
tanq; collyriū tere, deindeq; in pastillos redige. Postea
uerò ex posca dilutis utere. Sæpe simpliciter euphorbi
illitione misti cum oleo & cera, sum usus. Sufficit au-
tem ad libram olei cuiuspiam tenuis, ceræ quadrantē
injicere, & euphorbi vnciam vnam: quo quidem me-
dicamine utendum in ea tantū hemicrania est,

quæ à frigidis causis oritur. Iuuat etiam hos
si oleum tepidum instilletur in aurem:
euphorbi vncia, cum libra olei
prius temperata.

GALENI PERGA MENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVN- dum Loca Liber Tertius.

De affectibus aurium.



AURIUM dolores nonnulli quidē sunt ex frigidityte: nonnulli ob inflā-
mationem, uel cutis meatū auris am-
biētis, uel etiam nerui auditorij. Qua
uerò ratione inflammatio ipsa partes
inflammatas distendens, dolorē exci-
tat, eadem datulentus spiritus, transirum non habens,
dolore cruciat. Consimilis etiam fit dolor à serosis hu-
moribus * in toto corpore genitis, ei qui ex mordaciū
humorum forinsecus aduenientium illapsu contingit.

Dolores auris
quæ causæ ex-
citare possint.

Dolores igitur à sola ortos frigidityte, calfacientia
q̃ celerrimè curant. In quem usum solent nonnulli ru-
stici exenteratas cæpas oleo replere, & in feruenti cine-
re modicè calfacere, atq; ita auribus ipsum infundere.
Alij non cæpas modò, sed allium etiam oleo frigentes
postea ipsum instillant auribus. Ego uerò euphorbio
omnino modico, ad multū uetus oleum admisto utor,
ueluti etiam pipere exquisitisimè trito. Prodest etiam
amaracinū oleum ipsis infundi, & optimam nardum.
Quòd si aliquod oleum tenuium partium, in quo rutā
præcoxeris, auri infundas, magnopere iuueris. Magni
ficè autem eos mitigat oui candidum, quo etiam ad lip-
pitudines utimur: itemq; lac muliebre. Plurimum iuuā-
tur item, ex adipe anserino, uulpinoq; infundi tamen
omnia debent mediocriter calida.

Doloris auris
a frigidityte
orti remedia.

At si inflammatio adfit, nardinum unguentū, cum phar-
maco appellato Basilico cōmodissimè infunditur. Por-
rò medicamen Basilicon, alio nomine diciē tetraphar-
macum. Est etiam & Cōmagenum perutile, & ex adi-

*notandum
quam
frigida.*

Aurium inflā-
matarum cura
tio.
Basilicon phar-
macum.
Tetrapharcū.

Opiū quibus
mīceri debeat
ad inflāmatas
aures.

Sapa ex musto
dolorē sedat.
Dolere affigē
te, præstat om-
nino nō tange
re auditorium
meatum.

Rosacei opti-
mi compositio

Doloris auriū
a flatulēto spiri-
tu, aut a crassis
humoribus ex-
citati, curatio.

Aristolochia
triplex.

pibus pharmacum. Cogente uerò dolore, necessum est
etiam ijs quæ sensum stupefaciant, uti. Miscetur autem
opium muliebri lacti, & oui candido, quæ ipsa per se,
sæpe aurium inflammationibus contulerunt. Miscetur
etiam & castorio opium: uerū multo ante usum tem-
pore, pparatum id esse oportet: & miscetur quidem, in
uehementissimis doloribus, parit: in minoribus autem
duplo. Liquor quo hæc diluētur, sit sapa ex musto: mul-
to nāq; magis hæc, q̃s dulcia uina, dolorem sedat. Ve-
rū ego nullum pharmacum dolore uexatis infundo,
neq; etiam per lanam instillo, nimirum experiētia edo-
ctus, q̃ præstet neq; omnino contingere doloris tem-
pore auditorium meatum. At remisso dolore, per auri-
culare specillum, obuolutum lana mollissima, partem
dolentem foueo: pharmacumq; in iñcio modicè tepefa-
ctum in aurifusorio specillo: postea uerò forinsecus tū
orificio auditorij meatus, um uniuersę auri, mollem la-
nam impono. Iam quæ ex fomentis crassa & spissa fue-
rint, cuiusmodi sunt spicata & foliata unguenta, diluē-
da sunt ungento nardino: uel (si æstas sit, & caloris sen-
sus ægrū in aure inflāmata infestet) rosaceo, uel amygdalino.
Conficitur bonū rosaceū ex oleo immaturo, sa-
lisq; experte, in quo plurimæ rosæ sint maceratæ.

Si uerò flatulētum spiritum, aut humorem crassum
& uiscidum, siqui transitum non habeat, inclusum esse
coniecēris, etiam ex pharmacis liberantibus ab obstru-
ctione, quippiam admisce. Porro frigiditate antegres-
sa, spiritus flatulētus colligitur: grauitate uerò capitis,
cibisq; pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humo-
res: quibus si accedat frigiditas, dolores cōtingunt. In
his igitur spuma nitri, & nitrum ipsum molle, eiusmo-
diq; aphrolitrum, & oleum amygdalinum, rationabi-
liter in pharmaca auricularia miscentur. Ex hoc gene-
re est utrunq; ueratrum, & struthium, & amygdalæ
amaræ, & ex tribus aristolochijs, quæcunq; fuerint ad

manum, & iris Illyrica. Inijcies aut & cinnamomum si habueris, aut, si id non habeatur, cassiam, tum eam quæ Zigit, tum quæ Motos uocatur: ac præterea Carpesium. Aurium etiã meatus ab obstructione liberat, quæ lapides in tenibus atterunt: atq; omnia breuiter, quæ tenuium partium substantiam absq; mordacitate fortiuntur. Ex quorum numero est etiã cucumeris syluestris radix, itemq; bryonia, & ari, & dracunculi, & cetauræ, & polii, & omnino amarorum omnium. Rurius, moderatè aurium inflammationes, & nõ pulsatiles, rosaceo & aceto simul temperatis, tepesactisq;, atq; infusis curantur. Glaucium etiã ex aceto in cote medicã tritum, doloribus à modica inflammatione ortis opitulatur. Prestat autem pastillum ex glaucio, multæ sanè utilitatis pharmacum, prius præparatum habere: qui fit ex glaucio probè cum aqua pluuiali trito, deinq; in pastillũ coacto, exiccatoq;. Licebit uerò decimam quintam gummi ad glaucium portionem addere, ut melius compingi in pastillum possit. Quin & collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita, eis profunt, auribus instillata: atq; his nihil minus collyria ex croco. **V**lcera aurium recentia, tum glaucium solum cum aceto tritum curat: tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco & ex rosis cõfecta: quemadmodum etiã quod Nili dicitur. Curat item eã Damocratis collyriũ ex myrrha. Quæ uerò pure manant citra dolorem, atq; id moderatè patiuntur, iisdem medicamentis curantur. At quæ fortiter affliguntur, per eiusmodi qualis est pastillus Andronis, & qui ad Musam refert, sapa, modicoq; aceto dilutus. Quod si hæc ab ipso morbo uincantur, scoria ferri ad plurimos dies in sole ex acerrimo aceto contrita, laeuigataq;, est intrè pidè utendum. Huiusmodi etiã ulcera pastillo meo, ex charta combusta ipse aliquando curauit. Porro per papaueris succum mitigantur aurium dolores: haud

Cassia duplex.

Aurium meatus obstructos quæ referent.

Aurium moderatè inflammationes rosaceo & aceto simul temperatis curantur.

Pastilli ex glaucio, ad inflammatas aures.

Aurium ulceratũ remedia.

Aurium putulentarum curatio.

Pastillus ex charta combusta.

Papaueris succus aurium dolores mitigat: affectionem autem non sanat, nisi ex accidente quodam.

item affectiones iuuantur: nisi fortè ex accidenti quis eas iuari dixerit, q̃ nimirum sedato dolore, atq; inde somno sequuto, natura ipsa affectus dolorem gignent-
 tes concoquat Per aurium autem inflammationes, gal-
 linaceus atq; anserinus adeps, si quidem euacuatum
 corpus inuenerint, & humorem, qui inflammationem
 excitat, non amplius influentem, dolorem leniunt, affe-
 ctioniq; auxiliantur. Si uerò humore adhuc fluente adhi-
 beantur, affectioni quidem nihil opitulantur: leniūt ta-
 mē doloris symptoma: ut si ob humorum acredinem

Stupefacienti-
 bus quādo co-
 gamur uti me-
 dicamentis.

aliquis morsus contingat. At pharmaca ex papaueris
 succo, omnia sensum stupefaciunt: & ob id sanè tunc
 solum illis cogimur uti, ubi nullum aliud mitigatiuum
 doloris contulit. Miscetur autem castorium papau-
 ris succo, ut uehementem eius frigiditatem retundat:
 quo nomine etiā meconium ipsum, & quidem rectè,
 nonnulli torrent: quāquam satius mihi uidetur uti il-
 lo minimè torrefacto, inueterato tamen, & cum casto-
 rio permisto. Porro galbanum susino unguento dilu-
 tum, melliq; & rosaceo commistum, discutit citra mo-
 lestiam aurium inflāmationes, in quas nihil fluit iam
 amplius, doloribusq; à frigore opitulatur.

Ad ue-
 hementes aurium dolores medicamen ab Androma-
 cho scriptum. Castorij drach. ij. succi papau. drach.
 iij. opopanacis drach. ij. spumæ lycij, drach. j. passo
 excipito, & tepesactis utitor. Aliud eiusdem ad
 purulētas aurium & ueteres affectiones.

Fabæ
 Aegyptiæ internæ amaræ, aluminis scissi, piperis al-
 bi, spumæ nitri, croci, opij, malicorij, myrrhæ, thuris,
 nardi, sing. drach. ij. castorii, drach. j. aceti & mellis,
 quod sit satis, conficito.

Aliud eiusdem, ad dolo-
 res flatulentos, & aurium sonitum congruens.

Nitri, myrrhæ, sing. drach. j. rosacei cyathum. j. aceti
 tantūdem: simul tritis utitor.

Aliud ad auriū so-
 nitus. Veratri albi drach. j. castorij obolum. j. spu

mæ nitri sexquibolum: tritis cum aceto optimo utere. Aliud ad purulentas aures. Alumen scissum ustum, & myrrham cum melle terito, & præelotæ auriculæ pharmacum lana exceptum imponito.

Auricularis compositio probata, ex Apolloniæ libris.

Myrrhæ, thuris, sing. drach. ij. nucum amaranum drach. j. spumæ nitri, drach. ij. aluminis scissilis, malicorij, sing. drach. j. spicæ nardi drach. ij. aloes drach. ij. uini mulsi ueteris, cyathos. ij. Arida trita uino mulso admisceto, & cocta in stanneo uase reponito, ac tepido utitor.

Ad carnem excrescentē in auditorio meatu: quo usus est Heraclides Tarentinus. Aeruginis rasæ drach. viij. squamæ æris drach. iij. mellis heminæ dimidium. Arida trita, ac melle excepta, donec rubeant, coquito; & ablati utitor.

Aliud ad sanguinis ex auribus eruptiones, Heraclidæ Tarentini. Marubij succum exprimito, & acetum dilutum infundito.

Aut mali punici in aceto cocti succū exprimito, infunditoq; . Aut polygoni succum cum modico aceto. Ad uermes innatos auribus, ueratrū album cum melle imitte, aut aridū insuffla: aut rubi succū infunde.

De sonitu aurium.

EX Sonitibus aurium, alij quidem, spiritus flatus lentī sunt soboles: alij uerò, ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem sunt: quemadmodum etiam in oculis oriri solent suffusorum imagines, ob uapores exhalantes ab ore uentriculi. Cæterum neutrius affectiōis exacta cognitio haberi in principio potest. Porro si in febribus sonitus fiant, minimè interturbandi sunt: ut plurimū nanq; statim sedantur. Si uerò ob flatulentum spiritum, cui non pateat exitus, sonitum fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc rem dissecantibus, at tenuatorijs, ac discussorijs admotis pharmacis, nihil contulerit: simulq; apophlegmatismis usus sit, & uniuerso prospexerit capiti: huic merito in hanc suspicio-

Aurium ex crescenti ulcere remedium.

Aurium sanguinem effundentium, remedia.

Aurium uermes exterminantia.

Sonitum in auribus causæ.

Sonitus aurium per febres non esse cōpescendos.

Sonituū auis
ob exquisitam
sentiendi faci-
litatem ortus,
curatio per stu-
pefacientia.

nem inclinatus animus erit, uidelicet sensus audiendi exquisitam facilitatem, causam eius rumoris existere: præsertim si acuto audiendi sensu præditus esse æger appareat. In talibus igitur, ex sensum stupefacientibus quippiam soleo admiscere: cuiusmodi est mandragoræ, & papaueris succus.

Ad sonitum remedia ab Archigene prodita.

Sonitui aurium
remedia uaria
ab Archigene
prodita.

IN Sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum, & oleum, crassitudine mellis. Aut radicis syluestris cucumeris succum. Si uerò protrahatur, omnibus amaris, acribus, attenuatorijs, & discussorijs, quibus utimur ad dolorē ex crassis humoribus ortum, utaris, singulis in aceto coctis, admi- stoq; melle. Aut reclinato egro, & nitro trito in aurem insperso, acre acetum infunde tepidum, ac postquam feruere desierit, exterge lana, & nucum amararum suc- cum infunde, lanaq; obtura. Cæterum quibus ob ma- ximam ad audiendū facilitatem, id genus sonitus fiūt, castorium & cicutæ semen cum aceto trita instilla.

Ad auditus grauitatem.

Auditus graui-
tatis curatio.

IN Surdastris, qui exiguas quidem uoces omnino non audiunt, magnas autem uix percipiunt, hoc ip- sum symptoma ualde suspectum habere oportet. Pau- latim nanq; temporis progressu augescens, perfectam surditatem inducit. Quapropter perhieram purgandi sunt, et per catapotia ex colocynthide: pituitaq; eis per apophlegmatismos detrahenda, & caput resiccandum est, eiq; ut robur addatur, omni studio curandū. Vten- dum etiam attenuatoria uictus ratione. At in ipsam au- rem pharmaca injicienda sunt, quæ crassos uiscidosq; humores cōminuant, & dissecent. Cuiusmodi existunt hæc, quæ Apollonius prodidit. Caparum succo & resina oleo dilutis, utitor. Aut oleo nucum & resina mi- stis pariter utitor. Vel adipem anserinum, & fel bu- bulum, ac laurinum, ex æquo mista instillato. Porro

*Surdastris
remedia
Apollonius.*

surdastri contrariis præsidii habent opus ijs qui aurium doloribus infestantur. Quippe in doloribus affectæ partes exquisitam quietem desyderāt; surdastri uerò, uehementem motum postulant: transmutationēq; in contrariam ei, quæ iam adest, dispositionem.

Fomenta ad aurium dolorem, ab Apollonio scripta. Fomentis porrò utendum est per spongas aqua calida imbuta, sac sufficienter expressas; itemq; per cucurbitas affixas. Amplius uerò & per uaporem ex arundinibus perforatis allatum. Oportet autem alterā arundinis oram, auriculæ cavitati adaptari; alteram uerò, in ollam perforatum habentem operculū, & undiq; obturatum, incumbere. Sit autem in olla absynthium in aqua feruefactum, quo uapor inde sublatus perferatur ad auditorium meatum. Confert etenim hoc fomentum etiam auditui graui.

Aurium doloris
fomenta.

Archigenis ad surditatem remedia.

Chalbanum cum aceto & melle feruefactum in stilla, Aut collurio ex nitro, sicu, & sinapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea uerò assiduè acutisq; uocibus, & uicissim grauib; inclamamus; & per tubam sonitu incusso, conamur malum depellere. Post hæc, & asphodeli radices oleo ueteri incoctas, commodè infundimus, caprinaq; assiduè eluimus urina.

Surditatis remedia ab Archigene scripta.

Eiusdem de corpusculis quæ auribus illabuntur.

Quod si aqua illabatur aurē, auxiliatur acetum, & cum altero pede, qui respondet affectæ auri, exilire, aliquo modo se ipsum inclinādo: hoc enim modo faciliè excernitur. Quin & exuctio simplex per os, aut etiam per stipulam, egregiè aquam extrahit. Si uerò calculus, aut fabæ, aut consimile quid in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito: aut lana circa auriculæ specillum obuoluta, & resina tincta, extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharmacū fieri po-

Aures illapsa corpora quo modo ab eis excutienda.

test. Quodd si neq; sic sequatur, sternutatorio in nares iniecto, os ac nares obturato. Facta nanq; spiritus inclusi extensione, id quod est illapsum, efflabitur: idq; assidue, donec excidat, facito. Nam si intus manserit, aure inflammata conuulsiones inducet. Optimè etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, cōcusio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum, & in caput sublatum, concutiens ipsum uibrabis. Si uerò perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatum, caput ad tabulam firmare iubeto: dein leuata tabulæ iuxta caput parte, deferri finito, idq; sæpius facito. Mouebitur enim sic quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur. Atq; ita angusta & concaua specilli parte immissa, scitè extrahito. Si uerò faba, aut simile quippiam in aurem illapsum, in ea hæreat, madefactumq; & tumefactum, dolores inferat, impossibile quidem est integrum ipsum eximere. Quare per specilli concauum diuidere id industriè expedit, atq; ita particulatim extrahere: deinde sapam, aut uinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex laniatione oblæsum. At uerò si animal aliquod sit illapsum, scammonium aceto dilutum, aut absynthij, aut peucedani succum, nitrumq; ac sulfur, cum radiculæ succo instillato.

De parotidibus.

Parotidas esse glandularum secundum aures inflammationes. Inflammationum incipientium curatio.

Parotidū medicatio.

Parotides è genere quidem inflammationum existunt. Fiunt autem, glandulis secundum aures affectis. Cæterum prima parte curationis partium inflammatarum in eis minimè utimur. In illis siquidem plurimum curatione reprimente, repulsoriaq; uti conuenit: præcipuè quum nec malignum sit, nec multum quod influit: nec uniuersum corpus plethoricum. Sic nanq; spongia sola ex posca imposita, incipientes inflammationes represit. Verum in parotidibus con-

trariam curationem molimur: nempe pharmaca attractoria adhibentes: & si hæc nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitulas affigentes, aut fomenta assidua adhibentes, conantesq; ut infestans humor ad cutim ipsam trahatur: præsertim si affectio in capite hæreat. Similiter quum natura per acutas febres, redundantes humores ex uasis ad regionem inter cutem et subiecta corpora pellit, quandoquidem illis etiam glandulæ imbuuntur, multo satius uidetur tunc opitulari nature, febres per abscessus curanti. Verum si uehementi impetu influant humores, nihil nos curiosius agentes, omnia permittimus naturæ. Nam siue cucurbitam, siue aliud pharmacum humores ex alto eliciens, admo-uerimus, uehemens dolor hominem apprehendit, unde & uigiliæ, & febres oriuntur, atq; exoluuntur uires. Mitigare itaq; tunc, & non influxum prouehere, oportet, per cataplasmatum maximè lenientium usum: cuiusmodi est quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis lini farina, cum mulsâ, aut sænigræci, aut althææ, aut chamæmelorum decocto conficitur: & quæcūq; non modò humectant habent caliditatem, per quam mitigare dolores ualent, sed etiam influentes succos possunt concoquere, suppurareq;. Quod si etiam sanguis redundare uideatur, per uenæ ipsum sectionem uacuabimus, præsertim si liceat per uires. Ergo si humor non discutiatur, suppurantibus pharmacis est utendum: cuiusmodi est frumenti farina cum oleo & caricarum decocto: itè quod ex polline & fermento conflatur pharmacum. At si suppuratæ fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, aut per pharmacum abscessum rumpere, quale est Smilium uocatum, & quod ex alijs constat: aut tètare, ut ipsum per attractoria & tenuantia medicamenta discutiamus: bis in die ipsidem ablatis, & fomentis admotis, donec dolores remiserint. Vbi uerò iam plurimum puris discussum fuerit,

Naturæ impetus quando nimis sit iuuandus.

Indulgere naturæ qm.

Cataplasma dolore leniens.

Dolore lenientia.

Suppuratio qm & quibus medicamentis molienda: Pus suppuratarum parotidum quibus modis uacuandum.

tunc iam primum semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: dein uerò neq; ex re est id facere, sed ipsis pharmacis permittere, ut si quid reliquum in profundo hæreat, ipsum discutiant. Quòd si durities adsit, ea ipsa quoq; mollienda est, emollientibus medicamentis ad attractoria admistis.

Parotidib⁹ uaria remedia ab Archigene prodita.

Plantago constat ex facultate discussoria simul & repulsoria.

Repulsoria quòd miscenda medicamentis parotidum.

Archigenis ad parotidas. Rumicis radices in uino tenuium partium coctas, applicabis parotidibus citra uehementem dolorem ortis. Aut buccina marina, aut purpuras uistas, melle aut axungia exceptas imponito. Aut ficum aqua marina muria ue incoctam, admoue: aut lanam etiam butyro imbutam. Còmendat etiam usum plantaginis, tamen si ex mistis facultatibus, discussoria nempe & repulsoria constet. Ego uerò nunquam pharmacis ad parotidas destinatis repulsoria admisceri operæpretium existimo, nisi fortè aliquando pauxillum repulsorii, multo discussorio addatur: idq; ubi citra uehementem dolorem ipsæ irruunt parotides.

Aliud Archigenis ad discutiendas parotidas. Lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, modica calce uiua addita, pro cataplasmate imponito. Aliud. Picis brutiæ, mannæ thuris, utriusq; drach. j. terebinthinæ, palmularum Syriacarum nō uetustarum, pinguium, carnis puræ, utriusq; drach. ij omnibus simul unitis utitor.

Aliud. Caricarum, chalbani, nitri, sing. drach. j. sulfuris, tertiam unius drachmæ partem, terebinthine, opopanacisq; utriusq; pauxillum, simul unitis utitor. Quòd si medicamentis parotis non cedat, Archigenes consulit esse confugiendū ad cucurbitulā, adhibita scarificatiōe. Porro simplices parotidas curāt, emplastrum Mnaseg, & quod ex succis cōstat, & quod ex prifana. His molliora adhuc, sunt cetrati forma, tū ex butyro, tū ex æsypo conflata, ostreis, aut buccinis, aut purpuris uistis additis, adipeq; porcino salis experte, singulis quadrātis pondere. Sic ipsum

etiam

etiam licet conficere. Butyri, vnc. j. ceræ vnc. ij. S. ostreorum vstorum, redactorumq; in pollinem, vnc. ij. Conficito & vtitor. Efficacissimum nanq; est ad parotidas.

De affectibus narium.

EX genere tumorum præter naturam polypodes in naribus generantur: ut ozænæ ex genere ulcerum. Secundum genus autem excretionum præter naturam, sanguinis effusiones contingunt in morbis acutis. Primum itaq; de ozænis sermonem faciam, quæ ex humorum acrium, putrilaginosorumq; influxu gignuntur: nam si ij duntaxat sint acres, ægrè curabilia ulcera inducunt, graueolentia uerò non item. Cæterùm cura cõmunis tum his ambobus, tum etiam polypo est, primùm caput siccare, corroborareq;: quũ palã sit ob redundantiam uitiosorum humorum, fieri ab eo in ipsas nares defluxum. Capite roborato, naribus adhibenda curatio est, scopo in ozænis proposito, ut affecta pars per mixtę facultatis pharmaca, tum repellentia, tum discutientia, exiccetur. Repellunt itaq; tum auftera, tum acerba, quæ communem astringentium appellationem sortiuntur. Discutiunt calidam & siccam uim obtinentia. Archigenis remedia ad ozænas. Obline eos chalcitide, uel atramento sutorio, uel pso-rico, ex melle tritis, Vel iridem & sandaracham cum melle illinito.

Polypodes.

Ozænæ a quibus gignantur humoribus.

Ozænæ atq; polypi cõmunis curatio.

Repellentia q.

Discutientia q.

Ozænarum remedia.

De polypo narium.

Polypus tumor est qui præter naturam in naribus generatur, polypodis carni assimilis. Quę affectio ex crassis & uiscidis humoribus gignitur: ob idq; mixta medicamētōrũ materia indiget, quę partim astringat, partim secet & tenuet, partim etiam discutiat, condensetq;. Asclepiadis ad ozenas remedium. Aluminis scissi, drach. ij. myrrhæ, sandarachę, sing. drach. iij. gallę drach. j. æris usti, tantundem, Tritis utere, na-

Polyp i descriptio, causæ, remedia.

Ozænarum remedia varia.

ribus prius uino odorato elotis, & pharmaco per specilli extremum admoto. Lamponis ad ozænas,

eggilopas, polypos, & quæcunq; uelis citra sectionem, uisionem uel extirpare, remedium. Scobis æris rubri, vnc. j. salis ammoniaci sextantem. ammoniaci thymiamatis tantūdem. aluminis rotundi, quadrantem. aceti acerrimi heminas sex. Arida terito, & affuso aceto, omnia in uas æris rubri coniungito, in eoq; ad solem sub ardore caniculæ cum rubri æris radio agitato, donec exarescat pharmacum: quod postea in mortariū transfatum, diligenter terito, in fictiliq; recondito. Vsu uerò exigente, aquam sorbendam dato, quæ ut ore cōtineatur, præcipito: dein pharmacum per fistulam insufflato. uel etiam melle exceptum immittito. Cæterū

*Escharas inge-
nitas naribus,
excutiēdas ster-
nutatoriis cē.*

*Punicorū suc-
cū ad ozænas
polyposq; ma-
gnifice cōmen-
dat Galenus.*

post huiusmodi pharmacorū adhibitionem, etiam sternutatoriis utimur, quo uidelicet tectoria ulceri obducta excutiamus, q̄ tribus aut quatuor diebus ferè excidere consueuerunt. Vbi uerò exciderint, adipe anserino, ac butyro cum cerato curant. Porro ipse in ozænis polypisq; p̄stantissimū pharmacū reperi succū ex malis punicis, tū dulcibus, tū austeris, acidisq; & maturis & integris, pariq; magnitudine & numero maceratis, expressum. Cæterū si humectior esse polypus uideatur, plus ex austeris malis est cōtundendū. At ex aridis pharmacis, diphryge citra mordacitatē aliquando per multum tempus consumptum polypum noui. Probatum etiam prædictum ex malorum succis collyrium, si ubi exaruerit, redigatur in pollinem, indeq; exuffletur, aut etiam per specilli nucleū indatur. Omnia autem hæc assiduè facere oportet, ut nunq; ab affecta parte absit pharmacum, quum faciliè ab humiditate eluatur. / Iam uerò rosæ siccæ contusæ, inditæq; in ijs qui molli carne sunt præditi, citra noxam curare aliquando solent polypos. Nam pleraq; eorum quæ polypodas exterunt, eos exacerbant, si quando ab scopo

*Resarum pul-
uis in quibus
curare poly-
pos solet.*

aberrarint. Cæterum ulcera in narium meatibus semper per pastillos curauī, Andronium uidelicet, & Pafionis, & Polydæ, & Bithynum, & per eum quem ipse composui. In diuite uerò quopiam, qui odoratum pharmacum exigebat, hedychroi usum excogitauī, ipsumq; Phalerno ueteri dilui, et mirum quàm breui affectio ipsa est curata.

Heraclidæ ad sanguinis è naribus eruptiones remedia.

VBi grumos sanguinis eduxeris, lanā specillo obuoluito, eamq; in lycio aqua diluto ibuito, & sanguine manantē locū illinito. Aut linamentum ex elychnio contortum, madidatumq; aqua, & chalcitidis poliline inspersum inferito. Aut mentham tritam indito. Iuuat etiam frontem spongijs refrigerare, extremaq; uinculo excipere, qua parte magis contracta uidentur obturareq; aures, & os pluuiali aqua & frigida opplere. Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem è naribus. Spongiam cruda pice imbutam, & linamento exceptam indito. Aliud. Putaminis oui, & gallegomphacitidis, utriusq; partem unam. Trita linamento intorto, aqua aut aceto madefacto, excipito, inditoq;. Andromachi ischœmos. Chlaciditis, drach. C. chalcanti, drach. L. Misyos assati, drach. xxv. æris vsti drach. xij. & S. tritis utere.

Narū vlcera
qbus medica-
mentis curēf.

Sanguinis e na-
ribus eruptio-
num remedia

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca, Liber Quartus.



DE Oculorum affectibus, ocularijsq; medicamentis, agere in præsentī cōmentario est consilium. Pompholyx igitur lota nulli pharmacorum mordacitatis exper

Zzzz ij

Pompholyx
optimū est me-
dicamē oculo-
rū fluxionibus

tiū inferior est: atq; ob id ea utimur ad tenues & acres
oculorum fluxiones, sed uacuato prius capite et uniuers
so corpore. At uacuamus quidē corpus, uenæ sectio-
ne, purgationeq;: caput autē, per apophlegmatismos
uindicamus à pituita. Potest tamen pompholyx lota,
quemadmodum etiam spodiū, atq; amyllum, simul &
moderatē resiccare humores; simulq; ne per tuniculas
euacuetur ea quæ in magnis oculorū uenis superflua
humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius
q̃ caput ab humoribus ad oculos defluētibus purget,
utatur obturantibus pharmacis, uehementes dolores
ob tunicas distentas inducet, et ob multitudinem influ-
entium humorum, aliquando ipsarum rupturam aut
erosionē pariet. Eiusdem generis cum prædictis phar-
macis subtenuis ouorum liquor existit, abundē ualens
humiditates oculorū abluere, & exasperata lenire: ob-
turandi autem tenues meatus non parem illis faculta-
tem sortitur, sicuti nec similem uim resiccandi. At fœ-
nigræci succus, quod ad uiscositatem attinet, similis est
ouorum albugini: discussoriam tamen possidet faculta-
tem, & moderatē calfacitoriā: ob idq; multos dolores
mitigare cōsueuit. Maximē p̃dictis cōtrarij s̃m genus
existunt liquores acres, ut Cyrenaicus, Medicus, ac-
tum sagapenum, tum euphorbium, omnesq; breuiter,
qui citra exasperationem calfaciunt uehementer. For-
ti autem facultate sunt prædita extergentia medicamē-
ta, cuiusmodi est æris squama, chalcitis usta, es ustum,
flos æris, misy, fori, atq; stibium. His adhuc aliud ge-
nus adiacet, erodentium uidelicet, siue putrefacien-
tium: quale est auripigmentū, & sandaracha, & Asia-
petræ flos: cuius facultatis misy etiam paululum par-
ticeps est. Est & aliud genus pharmacorum, quod in
oculares compositiones iniicitur, eorum uidelicet quæ
natura astringunt. Quæ igitur mediocriter hanc uim
habent, influxus repellunt: quæ uerò uehementer, am-

**Oculorū fluxio-
nibus** cur non
sint adinuen-
da obstruen-
tia pharmaca,
ante capitis va-
cuationem.

Albumen oui.

**Fœnigræci de
cocti facultas.**

**Extergētia me-
dicamēta** quæ
sint.

Putrefacientia
medicamenta
quæ sint.

pliozem dolorem infligunt, tunicas exasperando, q̄ iu-
uent influxionum impetū repellendo. Porro quæ me-
diocriter astringunt, lippitudinibus cōmodissima exi-
stunt; conferunt autem & reliquis ferè omnibus affe-
ctionibus ulcerum, pustularum, atq; fluxionum. Sunt
uerò huiusmodi. Folia rosarum, & flores, & succus.
Ericę fructus, spica nardi, malabathri folium, crocus,
lycium, & hypocisthis. Vehementiorem his astringē-
di uim acacia & omphacium habēt, quæ & ipsa in suc-
corum genere numerantur. Balaustium etiam, & cyti-
ni, & gallæ omphacitides, ex genere eorum sunt quæ
multum astringunt. Inflammationes et alias affectio-
nes concoquunt, myrrha, crocus, castoriū, thus, & cre-
mor fœnigræci decocti: quæ etiam discussoria faculta-
te sunt prædita, & p̄sertim ex ipsis myrrha. Hæc itaq;
sylvia ocularium medicamentorum existit. Porro quæ
medicamenta substantia terrestri sunt, citra manifestū
calorem aut frigus, ea emplastica nominantur, uim ha-
bentia contrariam ijs, quæ ab obstructione liberant,
quali facultate insigniuntur Samius aster, pompholyx
lota, eiusq; cinis elotus, atq; etiam cadmia tum usta, tū
lota, cui deterforij etiam nonnihil inest. Pompholygi
uerò & spodio parum quid inest astringens, quemad-
modum etiam plumbo post exustionem. Nam & hoc
pharmacum omnis mordacitatis est expers, parum ta-
men quid astrictiōis sortitur. Amylum etiam exactè
lotum, q̄ mitissimum est, & medium, ut nec astrictio-
nem nec acredinem habeat, hoc est nec calorē, nec fri-
gus. Quin & cerussa lota proximè accedit ad facultatē
plumbi usti, atq; eloti: manifestè tamen astringit: amy-
lum autem & samius aster, quatenus ex gustu & odo-
re licet colligere, sunt penitus qualitatis expertes. Igi-
tur uniuersum huiusmodi pharmacorū genus, siue mo-
dicam in gustu aut odore qualitatem exhibeat, siue pe-
nitus nullam ostendat, ueluti aquæ purissimæ, expers

Lippitudini cō-
uenire, q̄ astringunt mediocri-
ter.

Astringentia
vehementer q̄
sint.

Ocularia me-
dicamenta.

Emplastica me-
dicamēta, quæ
& sint, & di-
cantur.

Amylum

Aq̄ purissimæ
sunt qualitatis
expertes.

Corneę tunice
erosę, quę me
dicamenta cō
gruant.

qualitatis uocatur, moderateq; per solam terrestrē sub
stantiam secundum propriam naturam ficcatur. Ac sa
nē sola hęc medicamenta conueniunt in erosionibus
corneę tunicę, ipsiusq; rhagoidis prolapsibus, ob in
fluxum tenuium atq; mordacium humorum ortis: quū
nimirum astringentia cohibeant effluentes humores,
atq; ob id dolorem ex mordacitate ipsorum ortum in
tendant: acria uerō, affectionem simul adaugeant. In
uniuersum tamen ipsi particulę affectę, quo facilius
curationem recipiat, prospicimus, tum uniuersi corpo
ris purgationibus: tum reuulsionibus: primum quidē
ad infernam corporis partem: dein etiam ad occiput,

Arterię secus
aures, & tēpo
rum quādo in
cidende sint.

& ad capitis cutem. **U**timur etiā sectionibus arteria
rum, interdum quidem incidētes eas quę retro caput,
iuxta aures sunt exporrectę: interdum autem earū par
tem, quę temporibus inest: idq; ut medeamur disposi
tioni, quę tunicis oculorum est genita, ob quam etiam
optimus sanguis ad tunicas ipsas delatus corrumpit̃.
Ad has igitur solas dispositiones conuenire uidetur p̃
dictorum medicamentorum genus, citra mordacita
tem exiccans in affecta parte cacochymiam, à qua id
quod influit corrumpitur. Vocantur autē collyria que
ex eiusmodi medicamentis cōstant, tum Libiana, tum
Cygni: nempe ob candorem, qualem cygni possidēt.

Collyria Libi
ana & cygni.

Collyria læui
gandi modus.

Praualet quippe in ipsis amyli, & terra Samia, & ce
russa Rhodia, quę præstantior est, & candidior. Sunt
qui collyria id genus in cotibus terant, lacte boni suc
ci ex nutricis uberibus instillato: ut astrictoriam, uim
quę ouillo inest, effugiāt. Etenim quum in lacte sero
sa quędam, exterforiaq; facultas insit, eius usus con
gruens est ad propositam curationem: quippe ulcera
explenda, extergentibus citra acrimoniā habent opus
medicamētis. Quod si huiusmodi haberi lac nequeat,
per fœnigræci decoctum terere collyria præstiterit, ut
pote quod exterforiam quandam uim habet, qua qua

Lactis mulie
bris vsus com
modissimus vl
ceribus corneę
existit.

Fœnigræci de
coctum.

omnino sunt destituta.

De aspritudinibus palpebrarum.

QUum ægrè curabiles prædictæ dispositiones existant, adhuc earum difficultatem adaugent palpebrarum asperitates: à quibus etiam in lippitudinibus, tunicæ oculorum commorsæ, affliguntur dolore. In illis tamen audemus ad pharmaca inflammationi congruentia, non nihil ex detergentibus immiscere, ueluti est collyrium ex uino, aspritudinibus accommodatum: quo primum ea quæ ad palpebras succreuerunt, deprimantur. Nam ubi oculi minus infestantur inflammatione, ea quæ aspredines expurgare possunt, administramus. At dum cornea exulcerata est cum mordaci influxione, impossibile est tali aliquo uti pharmaco.

Collyrium ex uino.

Cornea siquidem ipsa amplius exasperabitur: uuea uero impèsius procidet, hominemq; uehemens dolor corripiet, augebiturq; ipsius fluxionis malignitas. In huiusmodi itaq; affectionum miscella, solent Medici, præ inopia consilij, palpebras ipsas reuertere, atq; absq; medicamentis purgare, idq; tum specilli concauo, tum molli spongia. Quidam ex præceptoribus meis, ex pumice læuigato, cum tragacantha aut gummi, collyriū faciebat, eoq; ab extentis atq; reuersis palpebris, aspritudines deradebat. Vbi uerò temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus tunc iā ea quæ palpebras extergunt, paulatim adhibere medicamenta: quæadmodum ubi fluxus omnino fuerit iam resiccatus, & palpebræ moderatè habuerint, caua ulcera sunt collyrio ex thure complenda.

Aspritudinis palpebrarum curatio.

De lippitudine, siue ophthalmia.

Ophthalmia est inflammatio periostij mēbranæ, quam etiam agnatam uocant, q̃ alijs, quæ oculū ipsum constituunt, tunicis, forinsecus agnascatur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscripta ossa. Ob id enim omnia quæ circum oculos sita sunt, usq; ad ma-

Lippitudo.
Ophthalmia ē inflammatio periostij tunice, q̃ barbari coniuā appellāt.

las quandoq; simul per uherentem lippitudinem intumescunt. Igitur pharmaca omnia huiuscemodi affectionem curantia, ex genere eorum sunt, quæ medent inflammationibus: assument tamen necessariò non nihil, pro ipsius partis natura, quæ excellentem molliciẽ, atq; eximiam quandam supra omnem totius corporis cutem, ad patiendum facilitatem est nacta, ob sensus subtilitatem, ac raritatem substantiæ. Adhibenda

Ophthalmiæ
cõgruentia me-
dicamẽta qua-
lia esse debeãt

itaq; sunt pharmaca repellentia, minimè tamẽ exasperantia, hoc est, non uerementem attrictionem sortita: sed quæ tum propria sua substantia moderatiora sint, tum lenitui liquoris admistione adhuc magis talia reddantur. Voco autem lenitiuos liquores oui candidum, & foenigræci decoctum, magisq; adhuc ipsum lac. Ut plurimum uerò albumen oui cum accõmodatis pharmacis lippitudines curare sufficit, per collyria uidelicet uocata monohemera, hoc est diaria. Sæpe siquidem magnas inflammationes, hæc adeò mitigauerunt, ut in uesperam quidẽ homo balneo uteretur: in sequenti uerò die, nardino collyrio ad instaurationem & corroborationem inungeretur. Admiscere autem ei circa primam inunctionem minimum quiddam acrium & sistentium medicamentorum oportet: ut circa secundam paulo amplius quiddam priore. Sufficiunt namq; hæc duæ pharmaci adhibitiones, & deambulatione aliqua non multa ante balneum. Foveri tamen oculi per spongiam debent ex meliloti & foenigræci decocto, semel quidẽ, aut bis in die, si mediocris sit dolor: sæpius autem, si uehementior.

De ulceribus oculorum.

Oculorum vl-
cera, q̃ia me-
dicamenta po-
stulent.

Oculorum ulcera eandem secundum genus curationem requirunt, quam reliqua omnia: ob ipsius tamen partis naturam, q̃ lenissima eis adhibenda sunt, quale est, quod ex lota pompholyge constat. Admiscetur ipsis etiam succi quidam non solum mordacitatis

expertes, sed qui etiam uehementissimos mitigare dolores possint, ueluti mandragorę succus. Quidã etiam polygoni succum miscuerunt, ut aliq̃, ipsoꝝ ouorum candidum. Quæ omnia dum tempus utẽdi instat, miscenda sunt: propterea q̃ facillè acescunt: quo tempore etiam rosarum additur succus. Eorum autem omnium esse debet scopus, ut ulcus mundum seruetur: utpote partium natura ipsum replente, atq̃ ad cicatricem ducente. Si itaq̃ inflammatio adhuc oculum urgeat, aut quispiam etiã dolor, collyria ex thure, & metallicis lotis, & succis mordacitatis expertibus, adhibenda sunt. Vbi uerò sordida reddita ob eorum usum ulcera fuerint, ex repurgantibus quippiam miscẽdum est: quale existit Paccianum croceum, ex uino: quod etiam aspritudines exterit, pterygiaq̃ attenuat. At uerò ulcẽra quæ per erosionem tunicæ corneæ sunt, ita ut aliquid ex ipsa rhagoide procidat, repellentibus & astringentibus pharmaciis opus habent. Discussoria autem postulant tum pustule, tum pus intra rhagoidem contentum. Recẽtia igitur, & adhuc inflammata, pharmacis ex myrrha, thure, & croco sedantur: uetustiora autem, nonnihil ex discussorijs desyderant, quemadmodum etiam induratae tunicarum inflammationes.

De ocularium pharmacorum uiribus.

Igitur omnimodæ acrimoniæ sunt expertes hi tres liquores, scœnigræci decoctum, lac, & candidum oui: ex quorum genere existimare oportet tum gummi, tum tragacantham. Quippe nisi predicta illa tria, tum copia, tum usu, prompta & expedita essent, possemus utiq̃ parum gummi, aut tragacanthæ in multa aqua maceratum, in eundem usum ueluti illa assumere: & per ipsa etiam in medica cote collyria tere: & per sola infusa, serofos in affectis oculis generatos humores eluere. Oculariũ itaq̃ pharmacorum unum genus in illis tribus liquoribus, atq̃ etiam in

Paccianũ collyrium.

Oculariũ medicaminũ uires. Gummi. Tragacantha.

Oculariũ medicamentorum genera uaria.

tragacantha, gummi, metallicisq; elotis consistat. Alterum uerò genus eorum sit, quæ modicam mordacitatem sortiuntur, propterea q̄ quædā eis sunt admixta, quæ parū astringunt, deterguntq;: qualia sunt, rosæ, & thus: illæ quidem, pauculam astrictionem: thus uerò modicam extergendi uim, possidentes. Habet tamen ob moderatum calorem thus etiā & concoctorium quid, ac doloris mitigatorium. Ex eodem genere cum ipso, quantum ad concoctionem & discussionem attinet, censendus est crocus & myrrha: quæ inter se in eo differunt, q̄ crocus quidem, moderatè astringat: myrrha uerò, citra astrictionē, non instrenuè discutiat, & resiccet humiditates. Sūtq; hæc uiribus præstantiora thure, & ob id etiam maiorem discutiendi uim habent: quum autem careant ui detergendi, ad ulcerum curationem thure inferiora existunt. Huius generis medicamentorum, concoctorij inq; & discussorij, lyciū quoq; est, & castorium. Sarcocolla ēt concoctoriū & discussoriū medicamētum existit, ac magis q̄ ipsa, chalbanū. Meliloti uerò decoctum ad cōcoctoriā facultatem assumpsit ēt quid astringitorium, eiusdem ferè generis cum croco existens. Inijcitur etiam in oculares compositiones lapis hæmatites uocatus, humores resiccandi uim habens, ueluti & cadmia. Mitius tamen pharmacum lapis ipse q̄ cadmia existit, utpote ex humida substantia, non terrestri, ueluti cadmia, generationem indeptus. Hui similis est lapis Schistus dictus, sed fortiorē obtinet facultatem. Quod uerò stibium uocatur, illotum quidem, fortem astringendi facultatem ostendat: lotum autem, exoluif: ut propè ad uim mordacitatis expertium accedat. At æs ustum uehementem extergendi possidet facultatem, itemq; squama eius, & flos. Nec minus efficax, sed minus mordacitatis expers chalcitis usta est. Quod si lauentur talia

Thus dolorem lenit, concoquitq;.

Crocus moderate astringit. Myrrha citra astrictionem, discutit, resiccatq;.

Lycium.

Castorium.

Sarcocolla.

Chalbanum.

Meliloti decoctum.

Lapis hæmatites.

Cadmia.

Schistus lapis.

Stibium.

Æs ustum.

Æris squama, flosq;.

Chalcitis usta.

pharmaca, exterforia quidem adhuc manent: tanto tamen imbecilliora, quantum amiserunt mordacitatis. Huius generis sunt etiam misy, & ærugo, fortissima pharmaca, ijs quæ sycosi & callis conueniunt, admista. Sunt qui etiam gallas admisceant, uehementer astringens pharmacum: sunt qui etiam chalcanthum, quod unà cum acredine uehemētissimè astringit. Moderatius tamen redditur ustum, & lotum. Ad hanc syluam pertinet & stomomatis squama. At thuris cortex, astringit quidem & ipse admodum: prædictis tamen est longè inferior. Porro manna thuris à thure ipso differt, q̃ exiguum quid astrictiōis sortiat, ratione corticis thuris, cuius nonnihil contra xit. Quæcunq; igitur ex astringentibus multam terream compagem habent, aspritudines, & sycoses, & callos consumunt. Cæterum quæ ex succorum genere sunt, ueluti omphacium, & hypocisthis, eluuntur faciliè in subliationib, diffuētia simul cum lachrymis. Ex hoc genere est glauciū, & acacia. Citra mordacitatem uerò exterget cerui cornu ustum, ueluti etiam caprinum: non tamen dolorē sedant, nec concoctoria facultate sunt prædita, ut thus, frigidi nimirum & sicci tēperamenti existētia. Mixtæ facultatis est aloë, quēadmodū rosa. Habet enim qđ exterege re est natū, aliquid in se amarū: sicuti et astrictorium quippiam, ut & cōmittat, & ad cicatricem perducatur.

Quæ ad scabras affectiones conueniant.

EX iis quæ ad scabras palpebrarum affectiones cōueniunt, sunt sales ammoniaci, & lapis Asius, tum ipse, tū eius flos: & quod psoricum appellatur, non simplex, neq; sponte natum, sed præparationis modum indeptum. Admiscetur ijs & misy ustum, & sandaracha, & arsenicum. Ex medicamentis uerò aromaticis, casia, malabathri folium, & amomum. cinn amomumq;.

Lota euadere imbecilliora.

Misy.
Ærugo.

Gallæ.
Chalcanthum.

Stomomatis
squama.

Thuris cortex
& manna.

Omphacium
Hypocisthis.
Glaucium.
Acacia.
Cerui cornu
ustum.

Aloes facultates.

Scabris palpebris quę opem ferant medicamenta.

Quæ induratis auxilientur.

Induratis tuni-
cis oculorum
quæ conferat.

Compositiões quæ ad induratas oculorum tu-
nicas congruunt, ex succis constant, & ammo-
niaco thymiamate. Miscent autem eis myrrha, thus,
chalbanum, & consimilia.

Quæ suffulis medeantur.

Suffusorum re-
media.

Ad Suffusos habetur compositum medicamen-
tum ex succo fœniculi, hyænæ felle, ac melle Attico
constans: cui uonnulli caprillū fel addiderunt. Nunc
autem in pretio habetur pharmacum ex felle scaro-
rum compositū: sicuti & quod ex myrrha stacte con-
ficitur: quorum omnium promissa magna: effectus
autem interdum nullus.

Pharmacum aridum ad tuendam oculorum
ualetudinem à me compositum.

Oculos robo-
rans pharma-
cum.

Lapidis phrygi, ter usti, totiesq; extincti, sed pri-
ma quidem extinctione, butyro: secunda, uino
odorato: tertia attico melle, ad ipsum extinguendum,
iniecto lib. j. æris usti, piperis albi, folij malabathri,
sing. vnc. j. Stibij, drach. xij. Postquam uerò omnia
fuerint læuigata, & reponere medicamentum uelis,
adijce opobalsami Syriaci vnc. j. S. Porro usus ip-
sius ad solas palpebras competit cum specillo indu-
cti, citra tunicarum ipsius oculi contactum.

Aridum ad circunrosos oculorum angulos ab Ascle-
piade scriptum. Spodij Cyprij, drach. iij. ompha-
cij aridi, drach. ij. nardi obolos. iij. piperis fricti, gra-

Ocularia, medi-
camenta uaria,
a medicis ua-
riis conscripta.

na. xv. tritis utere. Pharmacum calliblepharon,
exornandis palpebris accommodatum. Facit & ad
lippitudines inueteratas. Stibij usti ac uino ex-
tincti, drach. xvj. plumbi usti & loti, drach. viij. fuligi-
nis thuris, spicæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, squa-
mæ gris, sing. drach. j. omnibus tritis ac repositis uti-
tor. Aridum Philoxeni ad pruriginosos & cir-
cunrosos angulos. Facit & ad obtusum uisum.

Cadmice, drach. iij. salis ammoniaci, drach. ij. piperis albi drach. j. tritis & laeuigatis utitor.

Liquida oculares compositiones ad omnem extuberantiam carnis tollendam: & ad incipientem lippitudinem.

Compositio qua usus Philippus est in Cæsaria. Misys assati, drach. viij. myrrhæ drach. iij. cadmiæ, drach. viij. croci drach. ij. salis ammoniaci tantūdem, nardi indicæ, piperis albi, utriusq; drach. j. mellis Attici cyathum unum: misceto. Panchrestos Erasistrati ad lippitudines omnes, & ad purulentas aures. Aeris usti, myrrhæ, singul. drach. j. piperis obolos. ij. misys tosti drach. j. croci obolos. iij. uini Chij heminam. j. passi cretici heming dimidium. Coquantur ad lentum ignem ut decet. Philoxeni liquida exacuens uisum, ac cicatrices & callos extrens. Ammoniaci thymiamatis drach. iij. æruginis drach. ij. uino diluta, & contrita, melle Attico excipito. Compositio largi exacuens uisum.

Succi radiceis fœniculi partem unam: mellis tantundem: misceto. Alia. Succi radix fœniculi, succi chelidoniæ, mellis Attici, sing. drach. j. misceto.

Ad tingendas albugines. Gallam tritam per specilli nucleum calfactum imposito: dein chalcanthū aqua dilutum admoueto. Ad glaucos oculos, quo pupillæ nigræ reddantur. Malicorij dulcis succum infundito: dein post temporis interuallum hyoscyami florem cum uino tritum instillato.

Ad paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus. Chalbani partem unam cum modico nitro mixtam imposito. Cataplasma Heraclidis Tarrentini ad uehementes oculorum dolores. Rosarum uiridium, aut siccarum, drach. iij. croci drach. j. opii tantundem, excipito meliloti decocto, aut passo, utitorq;.

Aliud. Rosarum, uolarum albarum,

Oculorum uehementes dolores soluentia cataplasmata.

meliloti, capitem papaueris, ſing. drach. ij. croci, opij, myrrhæ, ſing. drach. j. oui aſſati uitellū. Tritis & paſſo ſubactis utitor. Agglutinatorium ad repel-

Oculorum flu-
xionibus repel-
lendis aggluti-
natorium phar-
macum.

lendas fluxiones ab oculis. Pollinis, myrrhæ, man-
næ thuris ſing. drach. j. candido oui excipito, tempo-
ribusq; & fronti admoueto. Collyriū Moſchio-

nis, ad epiphoram, dolores, atq; fluxiones congruēs.
Glaucij, drach. vj. Sarcocollæ drach. viij. croci drach.
iiij. gummi drach. ij. tragacanthæ, ſucci mandragoræ,
ſing. drach. ij. opij drach. j. Aqua pluuiali excipito, uti-
torq; . Pacciſi ſphragis. Cadmiæ uſtæ, & lacte ca-

prillo, ſiue muliebri, extinctæ ac lotæ, aſſiccataq; in-
umbra, drach. x. æris uſti ac loti, acaciæ, utriuſq; dra-
chmæ. x. opij drach. vj. croci tantundem gūmi drach.
xv. aqua pluuiali excipiantur. Collyrium ad

acerbiſſimos oculorum dolores. Cadmiæ uſtæ & lo-
tæ, acaciæ, ſtibij uſti, & loti, aloes Indicæ, ſing. drach.
viij. croci, myrrhæ, opij, ſing. drach. iiij. gummi drach.
viij. aqua excipe, utereq; ex ouo. Ego etiam pōpho-
lygis & thuris, utriuſq; drach. iiij. adieci. Mala-

Malabathrinū
medicamētum
uehementibus
oculorum do-
loribus.

bathrinum noſtrum ad uexationes dolorum. Cad-
miæ drach. xvj. acaciæ, drach. xl. æris uſti & loti, drac.
xiiij. opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indicæ, caſto-
rij, croci, aloes, ſing. drach. ij. myrrhæ drach. iiij. ceru-
ſæ drach. viij. ſtibij loti tantundem. gummi drach. xl.
aqua excipito & utitor ex ouo in principio affectio-
num, & etiam in declinatione, * ubi panchreſtum
ab ipſa parte remoueris. Collyrium album try-

Collyrium try-
phera nomina-
tum.

phera dictum, admodum lene, ad epiphoras maxi-
mè congruens. Cadmiæ lotæ drach. xvj. ceruſ-
ſæ drach. viij. amyli, gummi, tragacanthæ, ſingul.
drach. iiij. opij drach. ij. aqua excipito, & cum ouo uti-
tor. Cygnus inſcriptus Reginae, ad maximos ocu-
lorum dolores. Cadmiæ drach. xvj. ceruſæ lotæ
drach. viij. amyli, tragacanthæ, acaciæ, opij, ſingul.

drach.ij. gummi drach.xij. excipe aqua pluuiali, & dum uti uoles, adijce cādida ouorum quatuor, recen-
tium.

Aerianum pharmacum ad ueteres ac re-
centes affectiones accommodatum. Cerusæ drach.
xxiiij. Cadmiæ ustæ, & lotæ, stibij usti & loti, thuris,
singul. drach.x. squamæ æris drach.v. opij drach.ij.
myrrhæ tantundem. gummi drach.xij. aqua pluuiali
exceptis, utere ex ouo.

Collyrium ex cornu cer-
uino, ad ulcera, & pustulas, quod cicatrices exterit.

Cornu ceruini usti, & loti, thuris, plumbi usti, sing.
drach.iiij. squamæ æris lotæ, drach.ij. opij, drach.j.
gummi drach.iiij. excipe ex aqua pluuiā.

Colly-
riū diarhodon, ad fluxiones atq; dolores oculorum
congruens. Rosarum drach.C. croci drach.j. opij,
myrrhæ, sing. drach.vij. gummi drach.L. uino odo-
rato excipito, utitorq; ex ouo. Ego uerò pro folijs ro-
sarum, tantundem earundē florum inieci, feliciterq;
succesit.

Lynceus, ad affectiones callosas, exa-
cuens uisum. Cadmiæ, æris usti & loti, ammonia-
ci thymiamatis, sing. drach.xij. myrrhæ drach.xvj. la-
pidis hæmatitæ, drach.vj. opij tantundem. aloes, fel-
lis taurini, chalbani, sing. drach.iiij. æruginis drach.j.
opopanacis drach.iiij. salis ammoniaci drach.ij. gum-
mi, drach.vj. Aqua omnia pluuiali excipito.

Melinum Lucij præceptoris, ad scabros & corrosos
angulos, intēfos pruritus, oculos humectos, omnēq;
hebetudinem uisus, cicatrices etiā & callos exterens.

Cerusæ, croci, singul. drach.xxiiij. ammoniaci thy-
miamatis, salis ammoniaci, nardi Indicæ, opij, myr-
rhæ, omphacij, sing. drach.vj. gummi, drach.xxiiij. Ex-
cipiantur aquæ pluuiali.

Quæ Archigenes ad oculos affectos scripserit.

IN Fluxionibus oculorum primo conuenit cibi
atq; potionis parcitas, aquę potus, ac maximè rei
uenereę, abstinentia. Subducatur aluus & facies assu-

Aerianū phar-
macū affectio-
nibus oculorū
accomodatū.

Oculorū affe-
ctibus remedia
ab Archigene
scripta.

duè primm multa frigida, dein oxycrato abluatur. Fugiant odores acres, & pulueres, fumumq; & tum Solis, tū lucernarum splendorem Si augetur fluxio, dolorq; accedat, confert etiam phlebotomia. Circa frontem porrò & tempora conueniunt medicamenta astringentia. At super oculos lana pura oui candido madefacta imponatur: aut oui asfi luteū: aut melilotum in passo coctum. Omnia enim ex astringentium genere in principijs conferunt.

Oculorum plagis quæ opitulentur.

Ad plagas illatas oculis facit columbinus sanguis instillatus, & præsertim is qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculū instillatum, ac præterea lana exceptum, & supernè impositum. Prodest etiam melilotum coctum cum uino, impositumq;. Ad tumores ex plaga in oculis ortos ualde conuenit fomentum per mollem spongiam aceto diluto madentem. Ad palpebrarum defluuia, æruginis tritæ partem unā, ammoniaci thymiamatis tantundē, trita imposito. Ad inutiles atq; pungentes palpebrarum pilos. Vbi auulsi fuerint, illinito sanguinem cimum, & non renascentur: aut chamæleonem albā & tritam, cui uiridiū ranarum sanguis sit mistus, inungito. Offuscationem omnem, incipientemq; suffusionem sanat fel omne, cū marubij succo ac melle Attico.

Ad pterygia, chalcanti, et salis ammoniaci æquales partes: gummi dimidiū, cum aceto in collyria formato, illinitoq;.

Galenī

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca Liber Quintus.

De suggillatione, quā Græci hypopion nominant.



YPOPION ex genere effusionū Hypopion.
Suggillatio
quid sit.
existit, estq; affectio cutis ipsi oculo
subditæ, ubi contusis uenis quæ in ea
sunt, sanguis per fissuras effundit: qui
quidem nisi discutatur cito, interdum
progressu temporis liuescit & denigra-

tur. Quare meritò ad eius curationem statim festinant
Medici. Cæterum quum tunica uenarum, ex quibus Suggillationis
curatio.
sanguis exilit, rumpatur, parum quiddam ex astringēti-
bus ad discutientia admiscant. Vbi uerò ad propriam
naturam redierint uenulæ, tunc discussorijs solis uti ad-
modum opportunum uidetur: ex quibus tamen imbe-
cilliora quidem, in primis sunt adhibenda: fortiora ue-
rò, inueteratis & denigratis conueniunt. Ego igitur Nili
collyrio diarhodon, in oculariorum cotricula ex aqua tri-
to, partem suggillatam illino, fertulæ campanæ ac sceni
græci decocto prius pro fomento usus: quo ipso deco-
cto, postea etiam collyriū dissoluo: ac dein etiam ex so-
lius scenigræci decocto. Quod si quæpiam affectionis
reliquiæ restitēt, in scenigræci decocto collyria ex myr-
ra dissoluo, illinoq; Vbi uerò affectus his remedijs nō
cedit, collyrium ex sandice est cōmodum.

Archigenis pharmaca ad suggillata.

SVMME facit ad recentia & liuida suggillata, spon- Suggillatis
pharmaca ab
Archigene pro-
dita.
gia muria intincta, & assiduè imposita, sublataq;
post quam, fomentum ex aqua calida prodest. Cata-
plasmate autē utere faba fresca contrita, absynthio, hyssop-
po, origano, raphani cortice, uua passa exacinata, uno-
quoq; per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Minimè ta-

men rectè mihi uidetur præcipere, ut indifferenter uno aut alio utamur. Aqua quippe acrimoniae omnis exper-
tissima est. Mel autem ulceribus mordax, cutem haud-
quaquã offendit: acetum uerò utrisq; mordax existit.

**Lomentum fa-
baceum.**

Aliud. Aut fabam fresam cōmansam, cum melle im-
ponito. Etenim fabæ lomentum, etiam citra manduca-
tionem cum melle subactum, liuida discutit. Ex mandu-
catione autem, summè discussorium efficitur, nimirum
uiribus à salua assumptis.

Aut cerussæ & lithargy-
ri partes æquas cum melle terito, atq; admista faba fre-
sa, ad cerati formam reducito, utitorq;. Aut hordea-
ceam farinam cum aceto mulso coctam imponito.

Aut thus & thapsiam æquis portionibus cum rosaceo
cerato.

Hæc Archigenes. Dictum autem à nobis
est, qd ex discussorijs medicamentis in principio præstā-
tiora sunt, quæ modicā astringendi uim possident: qua-
lia sunt rosæ, melilotum, & crocus. Apollonius autem
ad inueterata suggillata, ari radicem rasam, melleq; sub-
actam, impositamq; cōmendat. At Crito bryoniæ ra-
dicem tritam cum melle, aut rosaceo cerato exceptam,
inter remedia suggillatorum recenset.

**Sugillatis me-
dicamē ab He-
ra scriptum.**

Medicamē
Heræ conscriptum ad suggillata. Succu cicutæ, obolos
ij. croci drach. ij. myrrhæ, acaciæ, sing. drach. j. opij. dra-
ch. ij. succi thapsiæ, gummi tragacanthæ, sing. drach. j. cū
aqua cogito. Tribus enim horis (ut inquit Heras) sug-
gillata dispungit. Ego uerò nucem per ætatem iam
oleaginosam effectam expertus sum aliquando ad cru-
entatos facientem.

De Aegilope.

**Aegilopis de-
scriptio & cu-
ratio.**

INter nasi os & magnum oculi angulum, paruum
quoddam exiguo abscessui p̄simile tuberculum na-
scitur: quod sanè sepe in ipsum angulū rumpitur, egreq;
curationē admittit, nisi maturè illi occurratur. Igitur me-
deri ipsi oportet medicamentis quæ absq; mordacitate
discutiant. Quippe coafficitur ab acris oculis, ac sic

inflammatio particulæ augetur. Heræ ad ægilopas. Maluæ folia cum sale & melle trita imposito. Alica etiam in aceto cocta, incipienti ægilopi opitulatur. Archigenis remedia ad ægilopas. Aegilopas eruo cum melle integimus, aut cinere uiticis cum aceto subacto. Probè facit & thus cum recenti colubino stercore, impositum. In nōdum foratis, staphidem syluestre, & ammoniacum thymiana cum melle, ueluti spleniū, imposito: aut alumen scissile cum terebinthina. Si morbus his remedijs non cedat, diuiso angulo, osseq; nudato, cauterium admove: sic siquidem decedūt squamulæ, atq; ipsum malum curatur.

De Varis.

Tumor parvus & durus in faciei cute oboritur, Varus Latinis, Græcis Ionthos dictus, à crasso concretus succo, ostendensq; meritò sui ipsius curationem futuram per emollientia, et discussoria pharmaca.

Vari descriptio & curatio

De ficosis tumoribus.

VNa quædam hæc affectio est ex ijs quæ in mento enascuntur, differens à varis in eo qd non solum crassus sit qui hos tumores excitat humor, sed serosa etiam tenuitate participet, ob quam exulcerantur cito, si non, ut decet, curentur: & ob id magis exiccantibus pharmacis q̃uari opus habent.

Ficosus tumor a uaro quo modo differat, & qualia medica mēta postulet.

De lichenosis in mento tumoribus.

Et hæc affectio ex mixto quoque generatur humore, serosis nimirum tenuibusq; & acris succis cum crassis mixtis: quapropter facilè etiam in pforam ac lepram transit: indigetq; etiam ipsa pharmacis fortiter exiccantibus. Vbi uerò in pforam aut lepram tranfierit, ultra hoc qd resiccantibus indiget, etiā repurgantia & exterforia desiderat.

Lichenes a q̃b gignant humores & q̃lia medicamenta desyderent.

De menti eruptionibus.

Hoc eruptionum, siue exanthematum nomen, quidam in cōmuni usurpant de affectionibus ulce-

Exanthemata
resiccātib^s me-
dicamentis in-
digent.

rosis & asperis in mento sua sponte oborientibus.
Indiget uerò & hæc ipsa affectio resiccantibus medi-
camentis.

De furunculis.

Dothienes.

Furunculorum
species.

Furunculi, Dothienes Græcis uocati, ex similibus
humoribus, ueluti uari, gignuntur, per uniuersum
corpus duplices existentes: nonnulli quidem, Varosi,
duri, & egrè concoctiles: aliqui uerò inflāmati: in qui-
bus aliquando febres consistunt, & tumor excrescit in
magnitudinē, & in pus transmutat. Vnde curatio ipso-
rum ut plurimum eadem quæ inflātionū existit.

Critonis ad Varos remedia.

Varis remedia
scripta a Cri-
tone.

Mellis Attici, et acerrimi aceti, sing. cyathum unū
misceto, ipsisq; uaros illinito, cū digito pfricādo.
Vel amaras amygdalas aceto intritas, faciei illine.

Aut alumen scissile probè leuigatum terebinthina ex-
cipito, imponitoq;.

Ad Varos callosos. Saponis

Gallici drach. iij. Ammoniacy thymiamatis, drach. j.
thuris drach. j. aqua dissoluito, & cerati spissitudinem
facito, eoq; illinito, & post horæ interstitium calida ab-
luere iubeto.

Ad affectiones eminētiores, ac prin-

cipium elephātiasis. Gummi albi, spumæ nitri, thuris,
sulfuris uiui, sing. æquales partes aceto dilutas ac pro-
bè tritas, in pastillos redige, eosq; in umbra exicca: usu
uerò expectēte, aceto dilutos illine: atq; ubi resiccati fue-
rint, subscripta compositione deterge. Saponis Galli-
ci lib. j. ammoniacy thymiamatis, tantundē. thuris, ma-
stiches, spumæ nitri, sing. vnc. iij. Saponem & ammo-
niacum in fictile uas coniecta, & aquæ sextarijs duo-
bus affusis, coquito: atq; ubi dissoluta fuerint, arida cō-
rusa atq; cribrata adijcito: deinde in mortariū transfu-
sa, & probè conquassata, in uase uitreo reponito. Vsu
uerò postulante, faciem ex eo smegmate inquinato, &
post modicum temporis larga aqua molliter perfrican-
do abluito.

Eiusdem ad ficosas menti papularum

Elephantiasis
incipienti me-
dicamen egre-
gium.

eruptiones. Spumæ argenti, misyos crudi, æquas partes tritas insperge. Aliud: Atramenti sutorij, sulfuris uiui, singul. drach. ij; æruginis drach. j. nitri rubri drach. ij. trita insperge. Andronis pharmacum ad idem accommodatum. Chalcanthi, myrrhæ, sing. drach. ij. thuris, aluminis scissi, sing. drach. iij. malicorum, gallarū, aristolochiæ, sing. drach. viij. vino austero exceptis utitor. Critonis remedia ad lichenas. Tritici granā multa imposito in incudē: deinde laminam æris candētem tritico superponito: & resolutum ab eo liquorem, calidum adhuc, auferto, illinitoq;.

Aut portulacæ succum assidue illinito. Quod si inueterati sint lichenes, capparis folia trita cum aceto imposito. Aut corticem radicis hortensis rumicis, similiter ex aceto tritam. Pastilli Lichenici. Glutinis fabrilis, chamæleonis, sing. drach. iij. sulfuris uiui, thuris, sing. drach. ij. aceti, hemina dimidium. Glutinum aceto dissoluitur: dein aridis affunditur. Vfus tepore, quantum satis est, aceto diluo, calidumq; impono.

Humida ad impetiginosos affectus. Misyos peregrini, thuris, myrrhæ, aluminis scissi, sing. drach. viij. aloes, sulfuris uiui, utriusq; drach. iij. Passo excipito, ad spissitudinem strigmenti, & bis aut ter in die perfrictis illine. Emplastrum Lichenicum. Cera, picis coctæ, terebinthinæ, sulfuris uiui, sing. libræ dimidium: liquida cōmittito aridis. Excoriatorium lichenum. Squamæ æris, drach. vj. auripigmenti, sandarachæ, utriusq; drach. iij. gris usti, ueratri albi, sing. sesquidrachman. uentrium cantharidum, tantundem. Singula per se terito: dein simul mista, cedria excipito, & ad strigmenti spissitudinem reducta, pyxide æris cyprij reponito. Cæterum ante q̃ excoriatoria imponantur, circumscitas & uicinas licheni partes pharmaco aliquo inflammationem arcēte in splenio excepto, integere ac tueri oportet. Post ex coriatoriorū usum

Papulis in mēto erūpētibus medicamentā congruentia.

Lichenū remēdia scripta a Critone.

Impetigini cōgruentia remēdia.

Lichenas excorians.

emplaftra uiridia & alba sunt imponenda. Emplaſtrum uiride Pamphili ad lichenas. Cerae libram, æruginis raſæ, quadrantem, reſinæ phryctæ, lib. ij. olei cyathos. iij. aceti acerrimi quod ſit ſatis. Conſcito ut decet. Viride Herophili. Æruginis drach. ij. mannae drach. iij. adipis uitulini drach. xij. chalbani drach. iij. cere drach. lxxx. reſine drach. xx. aceti quod ſit ſatis.

**Lichenas exco-
riatos ſanantia
medicamenta.**

Emplaſtrum album, quo Magnus circulator eſt uſus ad exco-riatos lichenas. Lithargyri, cerae Tyrrenicæ, ſing. libram. j. olei ſextarium. j. ceruſſæ lib. j. aquæ ſextarium. j. conſcito. Aliud. Lithargyri, ceruſſæ, plumbaginis lotæ, ſing. drach. xxv. cere, terebinthinæ ſing. drach. xvj. olei heminam. j. aquæ tantundem. conſcito. Compoſitio Menecratis ſquamas decidere faciens, & corpora attenuans. Picis brutiæ pellucidæ, ſiccæ, & electæ, drach. ij. S. reſinæ pinus pellucidæ, lib. j. & quadrantem, cerae ponticæ tantundem. chalbani quadrantem, aceti heminam unam. Conſcito diligenter. Heraclidæ Tarentini ad capitis & menti ſiſcoſos tumores. Elaterij ſalisq; pares portiones confundito utitorq;.

De dentium affectibus.

**Dentes dolere
& pulſare.**

E Quidem in me ipſo manifeſtè aliquando percepi, non dolentem modò, ſed etiam pulſantem dentem: quemadmodum carnoſæ partes inflammatione uexatæ conſueuerunt. Quare mirabar ſanè, qd in dente ori inflammatio poſſet. Atqui quum etiam alio tempore dentem dolerem, perſpicuè ſenſi, non ipſius dentis, ſed gingiuarum inflammatarum, eum dolorem exiſtere: ita ut etiam citra coarctationem dolerent, ob uicinitatem tamen durorum dentium illis inaueretur dolor. Vtriuſq; itaq; doloris ſenſum expertus, alium quidem in gingiuæ, alium in ipſius dentis ſubſtantia eſſe, clarè ſcio. At uerò, & quòd neruus quidem ad radicem dentis ſubſtratus aliquando etiam doleat, im-

ponat autem nobis, ut credamus ipsum dentem dolere, consentaneum rationi est. Etenim q̄ dente exempto remaneat adhuc exigua quædam portio doloris, id ob nerui inflammationem contingit: quum nimirū tunc dolor nerui leuior tantū reddatur, eo quod nō amplius ab osse, cui cohærebat, tendatur: & q̄ iam liberius perspiret, fruaturq̄; medicamentis quæ illi adhibentur. Neq̄ enim per contactum, neq̄ per distributionem possibile fuerit inflammato neruo mederi, utrinq̄ à dentiū locellis coarctato, & ab anteriori parte ab ipso dente. * Iam uerò quum liuidi tota substantia sua interdū reddantur nerui, nihil mirū sit, si phlegmone simile quid patiantur. Cui rei hinc maior accedet fides, q̄ tum nutriantur, tum augeantur per totum ferè ipsius uitę curriculum: id quod euidenter sapenūmere in ijs dentibus liquet, qui sunt exemptis oppositi: utpote qui semper augescunt. Siquidem quantum augentur dentes, tantū in ciborum laxigatione atteruntur. Quum igitur illis absq̄ nutrimento augeri non liceat, utiq̄ duabus affectionibus, & his contrarijs, obnoxij erunt, inopiæ scilicet & redundantiaæ alimenti, quod ipsis suppeditatur. Inopia ergo, aridiores & tabidiores, atq̄ ob id tenuiores eos efficit: redundantia uerò, cōsimilem in eis excitare affectionem potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone: ac proinde curandum est, ut redundantia euacuetur, partim discutiendo, partim eam repellendo. At tenuitatis dentium ob alimenti inopiam, nullum remedium est: quum tūc necessariò laxentur, moueanturq̄; nempe compage ipsorum laxiori reddita, ob tenuitatem non modò dentium, sed locellorum etiam eos amplectentium. Hæc itaq̄ affectio senibus accidit citius aut serius, ueluti etiā magis aut minus. Quæ uerò phlegmonem refert, magis iuuenes corripit. Auxiliari tamen etiam oportet senibus, auxilio gingiuis adhibito. Eas autem astringen-

Dētes interdū nōnihil simile inflammationi perpeti.

Dentes augeri et nutiri, quod liquet ex iis q̄ sunt exemptis oppositi.

Dētes duabus sunt obnoxij affectionibus.

Dentium tenuitatem ob alimentum inopiā esse incurabilem,

tibus medicamentis robustiores, & magis circa dentem astrictas facere conuenit: tanquam ipsæ ad stabilitatem & firmitudinem dentium, aliquid etiam conducant. Porro forantur dentes ab humorum acrimia & erodentium influxu, quemadmodum etiam cutis contra externam causam solet exulcerari. Verum cutis exulceratur assidue & multis: ossa autem rarius, quæ ob duritiem ægrius quam cutis ipsa patiantur. Igitur corporum erosorum medela, erit resiccatio uitati influentis humoris: qui si paucus fuerit, per localia exiccantiaque auxilia absumetur. Si uero multus, uniuersi capitis prouidentia est habenda: quod quidem si ob uniuersum corpus affectum sit, huic etiam est prospiciendum. Etenim erosos ob mollitudinem dentes, duriores impatibilioresque per austeram & acerbam medicamenta reddendi sunt. At liuidos redditos, per siccantia curare oportet, ut qui ex uitiosorum humorum influxu id patiantur: unde similem cum foratis curationem desyderant.

De gingiuarum medela.

Gingiuas inflamas oleum lentiscinū persanat.

Gingiuis ex inflammatione dolentibus optimum pharmacum est oleum lentiscinum recens, calfactumque in duplici uase, atque ore retentum. Repellit enim citra molestiam, discutitque absque mordacitate, cuius rei inflammatis præcipuus est usus.

Dentium doloribus medicamina ab Archigene prodita.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit. **D**olentes dentes colluant acri aceto calido cum galla. Aut pinguibus tedis in aceto feruescitis. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepescitis. Aut hyoscyami cum aceto. Aut agrestis cucumeris radice, uel marrubio, singulis cum aceto, pipere, & nitro. Aut pulegii decocto. Mirifice facit dens caninus ustus & tritus, deinde cum aceto coctus & ore retentus. Aut scillam, aut radicem hyoscyami in aceto coctam colluito. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocynthidis medulla similiter co-

Quito, liquoremq; ex eis longo tēporis spatio in ore teneto. Hæc Archigenes. Porro solanum, stupefaciendo sensum duntaxat, auxiliatur dentium doloribus. Ad foratos atq; dolentes dentes remedia ex Archigene. Sory Aegyptium resina terēbinthina exceptum obline, indeq; intra dentis cauernulam.

Foratos atq;
dolentiū den-
tium remedia

Aut senectam anguis dentibus apprimito, & excidant. Aut uermes terrenos tostos cauernulæ præmundatæ inspērgito. Aut piper, uel roris marini semen, opio exceptum, in cauernulam inde. Aut in aurem denti uicinam oleum sesaminum, in quo uermes terrestres concocti fuerint, instilla. Ipso aut dolente dente hyoscyamū conterant. Erosi etiam atq; dolentibus dentibus, candens admoueto cauterium. Præstat ad eliciendam pituitā, staphidem agrestem per se, & cum pulegio manderē.

Fomenta ad dētiū dolores extrinsecus fiunt ex sale & milio, simul & torrefactis, & coniectis in sacculos. Dolenti autem denti affricetur origani ramulus, oleo feruido intinctus. Aut opopanacem & peucedani succum unita, linteolo illigato, & intra oleum feruefacta, denti dolenti apprimito. Aut bene contecto, & hiare iusso, hyoscyami semina in suffimentum adhibe.

Ad eximendos absq; dolore dentes. Pyrethrum acerrimo aceto ad dies quadraginta condito, terito, & reponito. Vsu uerò exigente, reli-

Dentibus exi-
mēdis citra do-
lorē remedia.

quis cera obturatis, dolentem ipso pharmaco integito. Deinde horā interposita, digitis extrahito, aut scalpello exigit. Dentes educunt fortiter tithymalli succus, & fori, cum chalbano imposita. Apollonius

autem radicis betæ succū per se iubet instillari in nares: ad soluendum dētiū dolorem.

Dentium fœto-
ri remedium.

Eiusdem, ne erosi dentes uacillent, ne ue fœtorem edant, remedium. Veratrum nigrum erui magnitudine melle cocto exceptum, cauernis inde. Eiusdem ad den-

Dentifricium
optimum.

tes denigratos optimum dentifricium. Alabastris
usti, drach. viij. pumicis usti, drach. iij. salis torrefa-
cti, drach. iij. tritis utitor. Ab horum usu collutione
utendum est, ex uino odorato, in quo ad multū tem-
pus iris sicca fuit macerata.

Dentes confir-
mans remediū.

Asclepiadis reme-
dium ad dentes motos. Cornu cerui usti, drach. viij.
Rhois rubri, drach. iij. omphacij drach. ij. balaustrij,
drach. iij. corticis pinus, myrrhæ, sing. drach. j. tritis
utitor. Collutio eiusdem ad molarium dolores.
Radices smyrnij cum aceto mulso coquito, & exco-
latum liquorem ore tenendum dato. Ad erosos
dentes præseruatium. Zingiber cum aceto mul-
so coquito, ac probè terito, indeq; in cauernam indi-
to, forisq; dentem ex eo integito. Aut hederæ la-
chrymam chalbano misceto; aut tithymalli, uel ficus
syluestris succo dissoluito, ac utitor.

De mobilibus & prominentibus dentibus.

Vbi dentes absq; ictu precedente mouentur, ue-
rissimè est, neruos radicibus eorum adnatos,
præ nimia humiditate laxatos esse: ob idq; siccantibus
medicamentis eis esse opus. Quum autem emoti den-
tes prominentiores sint reliquis, præcipuè ubi ex pla-
ga mouentur: sanè semper optimum iudicauì fore, si
sic affecti, in tantum attererentur lima, quantum su-
per reliquos prominent: idq; ne oppositos sibi offen-
derent, in loquendo, mandendo ue: quod consilium
semper mihi satis feliciter cesit. Oportet autem gin-
guis linteolum molle usq; ad radices dentium cir-
cundare; dein digitis sinistræ manus leniter ample-
cti, simulq; tutè, & citra compressionem, ne concutia-
tur cui limulam adhibemus, chirurgiam ipsam aggre-
di: eamq; non una uice absoluere, sed pluribus. Im-
perandum etiam est ægro, ut nec loquat, nec durum
aliquem cibum accipiat: utatur autem alimento suc-
co ptisanæ, & sorbitione ex alica, & pane madido.

Dentes promi-
nentes exten-
di ratio,

atq; alijs id genus mollibus. Ad firmandos dentes, ex Archigene. Myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorū partes tritas admove. Postea asininum lac colluant calidum, aut acetum, aut uinum, in quo malicorium & galla sint cocta.

Ad dentium autem stuporem portulacam manducent. De dēitione puellorum, eiusdem.

Dentienti infantulo, si doluerit, canino lacte gingiuas obline. Aut si leporino cerebello gingiuas eius ille ueris, cito dentes prouenient. Mulcet gingiuas dolentes acetum cui hyoscyami radix incocta fuerit.

Quod si enascens dens ægrè erumpat, & compūgat gingiuam, cyperum ex butyro & unguento susino iuxta exortum illinito.

Præseruatiua dentium ab Archigene prodita. Alumine scisso & modica myrrha confricato, nec erodētur unquam. Aut iridem Illyricam mandito.

Compositio Andromachi eadem hora dentium dolorem sedans. Piperis, pyrethri, succi tithymalli, chalbani, sing. drach. j. chalbano excepta in cauernam indito.

Alia. Seminis hyoscyami, opij, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, sing. drach. j. chalbani drach. ij. tritis ex uino utitor.

Collutio ad motos dentes, Critonis. Lentiscum, myrtum, gallam, in uino cocta colluenda præbeto.

Eiusdem ad corrosos dentes. Capparidis radicem cum acri aceto ad dimidias coquito, & colluito tepidum.

Dentifricium ad gingiuas madore laxatas, putrescentes, & cruentatas, concussos dentes, ozænas, parulidas, dolores, & omnia oris ulcera. Perdicij recentis drach. x. mellis, aluminis scissi, iridis Illyricæ, sing. drach. iij. piperis albi drach. viij. nigri, drach. iij. pumicis, pyrethri, hyssopi, pulegij, seminis apiij, sing. drach. ij. myrrhæ, menthæ siccæ, herbæ sideritidis, singul. drach. iij. salis fossilis drach. iij. Perdicium, sideridem, mel, & salem, mista urito; alumen uerò per

Dentium stupor
portulaca auxi
liatur.

Dentitioni pue
rorum congruen
tia medicamen
ta.

Dentes præser
uantia contra
erosionem.

Dentifricium ad
omnia gingiuarum
& oris ul
cera faciens.

Dentifricium
insigne.

se ustum uino extinguito: dein omnibus simul contusis utitor. Smegma dentes reddens candidos, eosq; ab erosione defendens, oriq; bonum odorem concilians. Nitri, testæ sepiæ, myrrhe, sing. vnc. j. tritis utitor. Aliud ad idem. Aluminis scissi sexuncem, mastiches, vnc. j. comæ rosarum, quadrantem, iridis trientem. Tritis utere, indeq; aquam tepidam colluendam præbe.

G A L E N I P E R G A M E N I, D E C O M P O S I T I O. N E P H A R M A C O R U M S E C U N. dum locos, Liber. VI.



Inuentionē rationalem auxiliorū præstare illi, quæ soli experientia innititur.

Inflammationis causa, & curatio.

QUANTUM PLURIMUM interest, ex uiua ne aliquis uoce, an ex libris discat, non tamen paruum commodum studiosis ex commentarijs accedit: ob idq; ad hosce conscribendos me accinxi: quum rationalis auxiliorum inuentio præstet illi, quæ soli experientia innititur. Igitur in stomaticis pharmacis, de quibus agere in præsentī commentario est animus, primus medendi scopus est communis omnium partium inflammatarum: secundus autē, proprius illius cui medemur. Porro inflammationes, ex influxu calidi sanguinis sunt, qui repellendus est, nisi ueremur ipsum ad partem aliquam principem recursurum, atq; illic grauiorem aliquem morbum excitaturum. Utimur igitur uenæ sectione, & purgatione & clysteribus, et inedia, ubi totum corpus plethoricum, aut cacochyum extiterit: Si uerò neutrum sit horū, statim properamus ad curationem per localia remedia. Impossibile autem est, pharmaco rite uti eum, qui uim ip-

sius non cognorit, secundum quam auxiliatur. Porro medicaminum repellentium genus, quibus utimur in principijs inflammationum, in materia refrigerantium consistit: quorum sanè ea quæ astringendi natura prædita sunt, efficaciorum uim habent, ad ocys repellendum influxum. Inest quippe ipsis statim etiam facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur. Communis itaq; scopus in oris inflammationibus est, prohibendi eos dū incipiunt: secundus autem, ab ipsa particula sumitur: quum sciamus longè rariorem atq; molliorem esse oris tunicam, cute qua uniuersum integitur corpus. Taceo tunicam oris, medicamentorū insuauitatem percipere: posseq; medicamenta ori indita defluere in uentriculum & pulmones: quorum neutrum cuti reliquæ adest. Quare fortibus medicamentis, cuiusmodi chalcanthos existit, quæq; uenenosam facultatem fortiunt, uti ad oris affectiones non licet, nisi magna urgeat necessitas. Ergo succus mororum solus, recensq; à fructu ipso expressus, ad incipientes oris inflammationes est melior illo, qui, ut asseruari diutius possit, ex melle coquitur: quanquam ad sequentia inflammationis tempora, utilior est qui ex melle est coctus. Nam quemadmodum in principio utilia sunt pharmaca repellentia id quod influit: sic post principium usq; ad finem, pharmaco opus est ex utrisq; misto, repellente uidelicet facultate, & discutiente, prædito: ac primo quidem tempore, astringens precellere oportet: ad finem uerò discutiens: atq; interposito tempore æquales utrorumq; partes esse conuenit. Quando uerò ueluti induratum quippiam ex ipsa inflammatione relinquitur, penitus non conuenit astringens ad discussorium miscere, * si prius uniuersum corpus fuerit uacuatum. Similiter neq; in principio bonum est discussoria miscere astringentibus.

Astringentium facultas.

*Oris affectio-
nibus cur exhi-
benda non sunt
fortia, nec ue-
nenosa medica-
menta.*

*Oris inflama-
tionibus quæ
opitulent me-
dicamenta.*

*Digerētibus so-
lis utendum ef-
se ubi durities
aliqua ex oris
inflammatione
relinquitur: cæ-
terū prius cor-
pore uniuerso
uacuato.*

Meritò autem qui pharmacum diamoron cōposuit, parum ex croco & myrrha ei commiscuit, q̄ communem habeant facultatem concoctoriam inflammationum: priuatim uerò, crocus quidē astringat: myrrha autem calfaciat in tantum, ut sufficienter discutiat, tenuium partium etiam substantiam possidens, qua faciliē in altum subire possit, uiresq; aliorum medicamentorum deducere. Soleo autem ipse in principio ad pharmacum dia moron miscere rhois succum, aut omphacium, aut florem rosarum, aut ipsas rosas siccas, necnō balaustium, cytinus, malicorium aridum, gallam omphacitin, pini, thurisq; corticem, hypocystidem, lentisci succum, ac breuiter astringentia omnia, præter ea quæ corrumpentem possident facultatem, quæ & deleteria dicitur, & letalium species quædam existit: quippe cum non omne letale, necessariò etiā deleterium, hoc est uenenosum, existat. At ubi inflammatio iam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse tantum crocum & myrrham, ut ipsa inflammatio coquatur. Quæ ubi concocta fuerit, addere aliqd ex discussorijs licet, cuiusmodi sunt nitri spuma, nitrum Berenicarium, sulfur uiuum, sapia, origano interdum incocto, aut hyssopo, aut pulegio, aut thymbra, aut thymo, aut calamintha hortēsi & agresti. At uerò Erasistratus, quum mororū succus illi ad manum non esset, rubi cremore usus, se ipsum curauit. Ego autem pharmaci ex succo nucum uiridium confeci, facultate ad oris inflammationes cæteris omnibus stomaticis plurimum antecellens. Cuius compositio est huiusmodi. Succum externi nucum uiridium corticis cum mellis iusta portione coquo, donec ex utroq; mellis crassitudo cōsistat. Hinc autem liquet qualis sit eorum corticum succus, quantaq; astringendi uis, q̄ ne per fortissima q̄dem extensoria, nigredo elui possit ab eorū manibus, qui uiri-

Croci facultas.
Myrrhæ facultas.

Dia morō medicamen.

Letalia omnia
non esse deleteria.

Oris inflammationi
concoctæ
quæ congruât.

Rubi cremor.
Stomatici ex
succo nucū uiridium,
ad oris inflammationes
conuenientissimū,
cōpositio.
Nucum succo uiridium
adest astrictio pene
trans.

des nuces decorticāt. Atq̃ nisi in profundū manuum illa facultas descenderet, non certè agrè eluibilis esset. Quum autem descendat, indicat planè substantiam succi, tenuium partium esse. At rationi est consonum astringēdi uim esse maximè ex usu, ubi in eius modi contineatur substantia: ineptam autem existere, quæ crassarum partium substantiæ est coniuncta. Optimum itaq; ac simul suauem esse nucum succum mihi persuadens, eum in quatuor partes diuido: & ad primam statim aliquid ex astringentibus misceo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiam sulfuris & nitri non nihil. Quartam uerò solam synceram seruo, ob dulcorem futurā utilem pueris, mulieribusq; & uiris effœminatis. Est autē quod ex succo rubi constat, fortius eo quod ex moris conficitur: quemadmodum hoc eo, quod ex musto parat: omnibus tamen præstat quod ex succo sit nucum. Porro in pharmacis quæ deglutuntur, maximè coniectare oportet naturam eorum qui ipsa sument. Nam quod cum molestia aut fastidiosè accipitur, os uentriculi euerit. In stomaticis autem medicamentis, eiusmodi synceritatem interdum contemnere licet. Si quis igitur medium aliquod medicamen cōficere omnibus aptum uelit, ut exempli gratia quod constat ex succo mororum, ad quinque libras succi, unam mellis adijciat: croci autem & myrrhæ, utriusq; drach. j. S. Vini item austeri, heminam unam: omphacij, drach. j. Quod si non adsit, pro ipso rhois succū inijcies: & si uolueris par pondus utriusq; imponere, nihil peccaueris. At Hera drachmam unam scissilis aluminis addit. Quod uerò ad coquendi modum spectat, ego sanè censeo succum ipsum solum esse per se præcoquendum usq; ad crassitudinem strigmentitiam: dein uerò adijciendū mel: atq; ubi iam cacabum ab igne uelis auferre, reliqua imponenda esse. Etenim ut spuma argenti, & plum-

Astringentē tenui substantiæ iunctā, esse maxime ex usu ad repellendas inflammationes.

Stomatici ex succo nucum quadruplex cōpositio.

Stomaticū ex succo nucū, cæteris uniuersis præstare.

Stomatici dia-moron compo-sitio apta omnibus.

Aromaticorū
complurū vi-
tes, per cocturā
exolui.

Oris induratis
inflammationi-
bus qualia sint
apta medica-
menta.

Oris uigentes
inflammationes
quibus sint co-
quendæ medi-
camentis.

Punicorū malo-
rū species tris,
austerorū, dul-
ciū & acidorū.

Stomaticū ex
punicorum suc-
co.

Stematicū ex
nucibus deuor-
andū nō esse

bago, aliaq; multa metallica, per cocturam meliora
euadunt, sicuis complurium aromaticorum exolui-
tur. Ceterum ad induratas inflammationes, quū iam
præterierit uigor, nec amplius influat quicquam, præ-
dicto pharmaco discussoria miscere oportet, cuiusmo-
di sunt spuma nitri, nitrum, petræ Asiæ flos, sulfurq;
uiuum. Ac sufficit sanè nitri vnciam, S. sulfuris vn-
cias duas, si addideris. Quodd si nihil horum sit præ-
sto, in sapa aut mulsā, origanum feruefacito, ipsa mq;
stomatico pharmaco adijcito, & gargurizare iubeto.

Nihil autem refert, etiam si hyssopum coniicias pro
origano, aut pulegium, aut thymum, aut thymbram,
aut calaminthem, aut hedyosmum. In uigore autem
inflammationum, collutionibus & gargarismis con-
coquere inflammationem oportet, pinguium carica-
rum decocto, lentiscinoq; oleo tepefacto in duplici
uase. Quin & ipsum stomaticum pharmacum in ui-
goribus gargarizare cōuenit mulsæ dilutiori permi-
stum, aut calidæ sapæ, aut etiam aquæ calenti.

At meum ex succo nucum medicamentum, aliorū om-
nium est ualidissimum, utilissimumq;. Quum autē
tres sint Punicorum malorum species, austerorū nēpe,
dulcium, & acidorū, equas singulorum partes, unā cū
corticibus soleo ipse etiā contundere, expressumq; suc-
cum cum melle coquere, ac sic conficere medicamen-
tum non solum stomaticū, sed ad multa alia utile.

Con-
tunditur etiam cum illis & rubi fructus; cuius succus
similiter præparatus succo mororū, melius illo phar-
macum redditur, sed minus ualidū eo, quod ex nucum
succo paratur. Quin & malorū coroncorum, & pisorū
syluestrium, ac mespilorū succus, similiter præparatus,
stomaticum pharmacū redditur, aptumq; etiam ut de-
uoretur; quum hoc quod ex nucibus constat, deuorare
non liceat. Verū quod ex punicis constat phar-
macum, aptum est exoluto & cibos fastidienti uentri-
culo deficit

culo; deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Inno-
 cum est etiam rubi mororum succus uoratus, ueluti
 et ipsorum mororum: sed succus rubi mororum habet
 quid quod stomachum roborat: quod ipsum, mororū
 cremor non habet. Iam uerò succus nucum plurimo
 melle opus habet: & post eum, rubi mororum: modi-
 co autem, malorum, & punicorum, & punicorum syl-
 uestrium. Medius inter hos est mespilorum succus.
 Ex cornis etiam, brabyliis q̄, & prunis, stomatica pre-
 parantur. Cæterum si crassus esse uideatur succus, sta-
 tim mel admiscere oportet: sin liquidior, precoquatur.
 Suscipit autem pirorum atq; malorum succus parem
 mensuram mellis. Succus uerò eorum quæ nimis acer-
 ba sunt, ueluti est corni fructus, aliquando duplum, ali-
 quando triplum mellis desyderat. Porro si atramentū
 sutorium admistum sit, non admodum deglutire opor-
 tet confectum pharmacum, præter q̄ si iuxta stoma-
 chum, aut aluum, ulcerosam affectionē fieri uereamur.
 Quin & si in ipso ore maligna ulcera fiant, præstant ex-
 atramento sutorio medicamenta. Sufficit autem drach-
 ma ad prædictam compositionem admista, in qua unā
 mellis libram coniūci dicebamus. Iam uerò quū rhus
 sit duplex (alter enim obsonijs inspergitur, stomacho
 cōmodus: altero coriorum tinctores utuntur) uterq; sa-
 nè musto incoctus, stomaticum efficitur medicamen-
 tum. Mustum etiam solum, citra mellis misturam in mellis
 compagem redactum, bonum sit pharmacum in prin-
 cipijs, augmentis, atq; uigoribus. Ad declinationem
 autem præstiterit, si in ipso diem integram tedas pin-
 gues p̄maceraueris. Quod si preciosius efficere phar-
 macum uis, iniicies etiam cassiæ corticem, aut nardum
 Indicam, aut malabathri folium: singulorum nempe
 unam drachmam. Ad induratas autem inflammatio-
 nes, coniūciuntur quæ generosius discutere possint, tu-
 sa uidelicet, & cribrata, idq; ubi olla ab igne est exem-

Rubi mororū
 succus os ven-
 triculi roborat
 id quod succo
 mororum non
 inest.
 Succorum qui
 nā plus, & qui
 minus requirāt
 mellis.

Calcanthō qñ
 stomaticis mi-
 scere expediat
 medicamentis.

Rhus duplex.

Musto qñ &
 qualiter prepa-
 rato utendum
 in oris inflāma-
 tionibus.

Discutientia
pharmaca que
nam sunt.

Stomatichi ex
multo compo-
sitio.

Inflammationi
incipienti, au-
striora, vigēti,
moderatiōra,
inclinanti, ma-
gis digerentia
conueniunt.
Astringētia pa-
ratu facilia;
Digerētia me-
diocriter.

Digerentia va-
lenter.

pta. Ac talia sanè sunt costus, amomum, macer, cyre-
naicus succus, Medicusq; Pauperibus tamē pro sum-
ptuosis discussorijs pharmacis, aut dictamnū, aut aco-
ron, aut meon, aut pyrethrum, aut cardamomum, aut
sinapi inijciendum censeo, pari pōdere: ita ut ad trium
drachmarum pondus, eorum mistorum moles perue-
niat, ad prædictā symmetriā, in qua mellis libra habe-
batur. Verūm pro cōstitutionis affectuū proportionē
augeri ac minui pharmacorum uehementiam oportet.
Ergo pharmacum conficientes ex musto, ad decē mu-
sti heminas, tres inijciemus heminas rhois coriariorū,
aut eius qui obsonijs inspergitur. Si uerò utrūq; inijcia-
mus, utriusq; una & dimidia inijceinda est. Iuxta pro-
portionem etiam, ex discussorijs, quodcunq; tandē in
promptu habeamus. Quod si unum tantūm suppetat
nobis astringēdi uim habēs, quod in principio inijcia-
mus, aut unicum discussorium, quod iuxta finem: ex il-
lo totum pondus explebimus, quod ex omnibus alio-
qui fuisset conflandum. In uniuersum autem, austerio-
ra quidem, in principijs, & uehementibus influxioni-
bus congruunt: moderatiōra in uigoribus: ut magis
discussoria in declinationibus. Porro ex astringētibus
facilia paratu sunt, rosæ, bacce myrti, myrtus, lētiscus,
rubus, canirubus, galla omphacitis, fructus Ægyptiæ spi-
næ, omnia aluminis genera, unus & alter rhus, glau-
cium, omphacium, cytini, & balaustia. Ex discutienti-
bus moderatè, faciliè parantur, caricarum fursurumq;
decoctum: aut malsa, in qua origanum, aut hyssopum,
aut thymus, aut calamintha, aut pulegiū, aut hedyos-
mum concocta sint: quæ si diutius coquantur, fortiora
redduntur: amplius autem & nitri spuma, aut ipsum ni-
trum ustum. Fortius uerò his est sulfur uiuum. Rectè
autem Andromachus medicamini ex succo mororum
confecto addidit glycyrrhizam, ut exasperata leniret,
asperitatemq; astringentium mitiorem redderet.

Stomaticū Andromachi ex musto, quo utor. Gallas, xxx. Rhois coriarij sext. ij. musti sext. vj. Gallas confractas per diem & noctem in musto macerato: dein coquito, donec ex toto quarta supersit portio: quam per linteolum colatam, expressamq; in olla ad mellis crassitudinē spissato: dein trita addito, aluminis scissi, croci, myrrhæ, sing. drach. j. permista reponito, tandemq; eis utor. Iam uerò, quod ex dulci confectum est musto, magis mitigatorium et moderatum erit, sed minus efficax: id autem quod ex acerbis fit uuis, uehementius quidem astringit, leniendi uim tamen non habet: ex medio uino paratum, mediam facultatem sortitur.

Stomaticū Andromachi ex musto.

Stomaticum ex Befasa anginis congruens, ab Andromacho scriptum. Sem anisi, apij, ammi, floris iunci odorati rot. aluminis scissi, iridis Illyricæ, befasa (hoc est feminis rutæ syluestris) cinnamomi, myrrhæ troglodyticæ, aristolochiæ longæ, casia, rosarum siccarū, crocomagmatis, sing. vnc. j. croci, cineris hirundinum tenellarum, utriusq; quadrantem. croci sesquiunciam. nardi Indicæ, amomi, utriusq; vnc. S. gallas. viij. tritis cum melle utor.

Stomaticū ex Befasa Andromachi,

Stomaticum Asclepiadis. Hirudinū syluestrium ustarū cineris, drach. iiij. croci, nardi Indicæ, utriusq; drach. j. melle excipito.

Aliud Andromachi. ad columellam laxatam, Aluminis liquidi lib. j. florum rosarum, lib. S. succi hypocyctidos quadrantem. Alumen in melle coquito: dein sicca inspergito: utorq;.

Columellæ laxate remediū.

Aliud eiusdem ad omnia uitia oris. Crocomagmatis drach. ij. iridis drach. iiij. sandarachæ drach. S. terebinthinæ, drach. ij. Lycij Indici, drach. j. uuxæ passæ drach. viij. aloes, omphacij, singul. drach. j. nucum pinearum tostorum, drach. viij. succi glycyrrhizæ, aluminis scissi, balaustij, sing. drach. j. floris rosarum drach. ij. mellis hem. ij. S. conficito.

Stomaticū ad uitia oīa oris.

Stomaticum Asclepiadis. Succi hypocyctidos drach. ij. balaustij, lycij, acaciæ, sing. drach. j. excipito oliuæ im-

Stomaticum Asclepiadis.

maturæ succo, & postea melle subactis uritor.

Si uerò eger stomatica id genus fastidiat, in moderatis quidem inflammationibus sufficiet succi soli fructuū iam dictorum, ut rubi, & mororum, punicorumq; malorum, & cotoneorum. Quin & succus nucum ubi cū solo melle paratur, gustui suavis existit: itemq; mustū ex uuis acerbioribus pressum, si rhus in id coniiciatur, optimum pharmacum redditur. Ad eas uerò inflammationes quæ multa astrictione indigent, austerorum punicorum, aut cotoneorū, aut utrorūq; succus, melli admixtus, sæpe mihi fuit satis. Singulis autem horum succorum licet omphacium adiungere. Vehementissimū medicamen reddetur, si punica integra tundas unā cū corticibus, indeq; succum exprimas, atq; hoc magis si acerba fuerint. Acerbissimum etiam fiet, si ad punicorum austerorum ita tusorum succum, omphacium superaddatur cum moderato melle. Præstantius adhuc reddes pharmacum, si tota contusa punica mala, passo cocta excolaueris. Ne uerò ualde exasperet, glycyrrhizæ succum admiscens, conficies optimum pharmacū.

Acerbissima
stomatica con-
ficiendi ratio.

Induratis infla-
matiōibus ap-
ta stomatica.

Glycyrrhizā
stomatice ad-
dita, ipsa me-
liora reddit.

Si quid uerò induratū appareat, his succis qui medias facultates sortiuntur, iniicies aliquid, dum coquuntur, ex pulegio, aut thymo, aut origano, hyssopo, mintha, aut calamintha; dein colabis, & habebis optimum medicamen. Quod si calidius efficere uelis, piper addes. Omnibus tamen si glycyrrhizæ succus addatur, melius pharmacum efficietur.

De crustis.

Putredo oboritur cito, in calidis & humidis partibus.

IN calidis & humidis corporis partibus, qualis est os, ex quacūq; tandem causa fuerit exulceratum, cito putredo oboritur. Ad cuius ulcera fortissimis sæpe uti cogimur medicamentis. Atqui fortissima sunt, quæ escharam instar catuterij excitant. In externis igitur corporis partibus, ubi parti curandæ crusta fuerit inducta, à fortibus superse demus pharmacis, trāsgre-

diētes ad deterforia, quæ escharas tollunt. In ijs uerò quæ in ore excitatæ sunt, escharis, tutius mihi uidetur esse admiscere ad exteriora pharmaca, alia quædā fortiora, & quæ per se admota, crustas etiam inurerent.

Melli itaq; maxima extergendi ui prædito, crustifica medicamenta immiscemus: quemadmodum ad sordida quæ in corporis cuticula oriuntur, miscere illi leuiter extergentia solemus, ut thus, eruunt, iridem, aristolochiam, & alia id genus. Porro Andromachus, ad oris crustas, ex nucibus pineis, amylo, alumine scisso, flore rosarum, croco, & melle, composuit optimum stomaticum.

Critonis ad oris crustas medicamentum. Misyos torrefacti, drac. iij. mellis optimi cyathos sex. misceto & utitor. Idem etiam præstat chalcitis assata cum melle. Archigenis ad crustas oris remedia.

Cōmodissimum est stercus canum, aliorum ossibus, ex melle illitum: quod etiam in angina auxiliatur. Aut rhus Syriacus ex melle. Aut hirundinum ustarum & stercoris humani par modus cum melle illitus. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda dato.

Ego uerò medicamē ex rhoe damno, q̄ astringētis sit facultatis, quæ minimè crustis conuenit. At hepar lupinum eupatorio mistum, ad hepaticas etiam hibitur affectiones. Sorani stomaticū ad crustas, foetēs q; gingiuas & humore pregnantēs. Misyos usti, drach. viij. iridis Illyricæ, drach. iij. croci drach. j. Trita in pyxide lignea reponito, & tum per se, tū ex melle utitor.

Aliud nomine Anthera. Iridis Illyricæ, sandarachæ, cyperis, sing. drac. iij. aluminis scissi, croci, croco magmatis, sing. drach. ij. tritis & mistis utitor.

Stomaticum Heraclidis Tarentini ad uehementes putredines oris atq; reliqui corporis. Chalcitidis partem, j. calcis uiuæ tantundem. auripigmenti partem dimidiam: tritis & mixtis utitor. Aliud. Florum rosarum, drach. iij, aluminis scissi, gallæ, sing. drach. ij.

Oris pustulis extirpādis, miscenda exte-
fortis esse ue-
hementissima
pharmaca, &
quæ per se, ad
mota, excitare
possent escha-
ras.

Oris crustis de
lēdis remedia
uaria.

Crustis nō cō
uenire astringē
tia.

Hepar lupinū
confert hepa-
tici.

Stomaticum
Sorani.

Anthera.

Canterio vten-
dum in putilla
ginosis oris vl-
ceribus, ubi re-
liqua ī cassum
administrant.

myrrhæ drach. j. trita melli misceto, utitorq; . Qui-
dam sale macerato in aceto, resiccatoq; , utunt. Si hec
remedia putredo ipsa respuat, utendū cauterio est: po-
stea uerò colluendum ulcus p̄dictis, imponendaq; an-
thera, donec crustæ abscedant.

De columella.

Columella,
Gargareon
Cion.

Couuma.

Staphyle.

Columellæ in-
flammatæ cu-
rario.

C Aruncula illa quæ ad extremum oris dependens
cernitur, à ueteribus quidem gargareon, & cion,
hoc est gargulio et columna: à neotericis autem cionis,
hoc est columella, uocatur: cuius sanè affectionē quan-
dā, staphylen, hoc est uuam, dicimus. Raro tamē affe-
ctio hæc circa columellam contingit: licet ea sæpe in-
flammeur. Et sanè quemadmodum in alijs omnibus,
in quibus ex humorum influxu contingit morbus, sic
etiam hîc prima auxilia debēt fluxionem ipsam repel-
lere: quare astringentis sint facultatis oportet: uerū
si quidem influxus sit moderatus, moderatè astringen-
tis, quam priuatim austeram uocant: si uerò uehemen-
tior, acerbæ. Ambæ quippe facultates astringunt,

Acerbæ & au-
stere facultates
ut differant.

Collutiōes mo-
deratæ ex qui-
bus fiant.

Collutiōes val-
de astringētes.

sed debilius austera: uehementius acerbæ. Porro mo-
deratæ collutiones fiunt ex palmularum, rosarum, pā-
pinorum uitis, rubi, canirubi, aspalathi, cyperi, cytino-
rum, siliquarum, radicum mori, hypocisthidis, malo-
rum austerorum, pirorū acerborum, ac sorborum de-
cocto. His fortiora sunt myrti, & baccarum eius de-
coctū, & ex acerbis contoneis malis, et uirgultorum te-
nerorū ilicis, arbuti, smilacis, phagi, & ipsarum glan-
dium: mespilorum item, & cornorum, & fructus me-
mæcili. Generosissimum autem est decoctum galla-
rum, & rhois culinarij, & coriarij, fructusq; myricæ, et
Ægyptiæ spinæ. Ex his singula tū per se, tum etiā mix-
tū cocta ex aqua, gargarissare oportet. Mirum enim
q̄ mixturæ ipsorum utiliores sæpe sunt ipso simplici
usu. Quin & arida etiam columellæ insperguntur. Iam
uerò moderatè astringunt etiam lapis Ageratus, aloë,

Miscellæ me-
dicaminū ali-
qñ esse utilio-
res simplicium
usu.

cyperus, flos iunci odorati, radixq; nardi Indicæ. Exi-
miè astringūt omnia aluminis genera: scissum uerò in-
ter ea tenuiorum est partium, & ob id utilius. At atra-
mentum sutorium uehementem astringendi uim possi-
det: non est tamen expers calfactoriæ: ob idq; putrila-
ginosis ulceribus conuenit. Cæterum gurgulionem
exasperat, etiam si iam scirrhum contraxerit. Corrum-
puntur autem succi omnino, si absq; melle reponant:
aut resiccantur si plurimum fuerint cocti. Nonnulli
tantam ariditatem asciscunt, ut conteri queant. Tales
sunt hypocisthidis, uua acerba, glycyrrhizæ, & cen-
taurij succus. Ridiculum autem est quærere, inter duo
eiusdem generis pharmaca, utrum sit ipsorum præstan-
tius. Omnia siquidem medicamenta respectu ad aliqd
tum utilia, tum noxia dicuntur. Quocirca si pronuncia-
ueris pharmaca nihil esse sola per se, rectè dixeris: nihil
enim sunt, nisi nata fuerint utentem rectè. Si uero con-
trà, pharmaca Deorum esse manus fatearis, similiter re-
ctè dices. Iuuant quippe maximè, si is qui eis utitur, in
rationali methodo fuerit exercitatus, atq; natura pru-
dens. Porro mistura pharmacorum eiusdem generis,
mediorum pharmacorum usus fit gratia: ob idq; semp
duo contraria medicamenta in unoquoq; affectu uos
habere operæpretium duco: quæ quidem permiscendo,
multis pharmacis abundabitis. Quum autè rarò quis
affectionem inueniat, quæ (exèpli gratia) solis discusso-
rijs, aut repulsoijs indigeat, cogimur etiã sæpe diuer-
si generis medicamenta miscere: quemadmodum ubi
cum repellentibus aut anodynis discussoria confundi-
mus: ut si gurgulione inflammato, ad alumen iridem
miscamus illyricam, aut farinam eruina, aut thus,
aut myrrham. Etenim quum discussoria sint mul-
ta, est semper à mitioribus auspicandum: quandoqui-
dem inflammata exasperantur ab acribus. Quæ
Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.

Aluminis om-
nia genera exi-
miè astringunt;
Chalcanthi fa-
cultas.

Medicamenta
omnia respe-
ctu ad aliquid
tum utilia tum
noxia dici.
Pharmaca ni-
hil sunt sola
per se.
Pharmacæ esse
deorū manus.

Discussoriis
mitioribus cur
fit in principiis
utendū ubi dē
gerere est op^o.

Gurgulioni in-
flâmato reme-
dia secundum
Archigenem.

Vua laxata, succū cyrenaicū dissolutū illine: aut gallam tritam cum sale: aut ipsum sal dissolutum: aut lycij radicem tritam: aut omphaciū cum melle. Si fortius medicamentum uis, Atramenti sutori, squame æris, aluminis scissi, misyos, myrrhe, galleg, æquas partes tritas, ac uino exceptas illine. In principio tamen, sale nō est priuatim utendum, sicuti nec cyrenaica lachryma: sed ubi columellæ inflâmatio indurata iam fuerit. De gurgulionis aut inflammatione sic Hippocrates differit. Gurguliones cum periculo excinduntur, uruntur, ac resiccantur, quādiu rubri fuerint & magni: quō tempore alijs artibus graciles sunt reddendi. Quum uerò totum id quod appellât uam, abscesserit, extremum autem gurgulionis maius, liuidumq; redditum fuerit: superior uerò pars tenuior, tunc sanè intrepidè curationi admoliendæ sunt manus.

Gurgulionis
affectū curatio
secundum Hip-
pocratem.

337.1

Quæ scripserit Archigenes ad uigentem inflam-
mationem gurgulionis & tonsillarum.

Gurgulionis
inflammati cu-
ratio secundum
Archigenem.

SI uerò in uigorem affectio peruenerit, subducatur aluus, aut calidam lotionem furfurum gargarisset, aut ptisanæ succum, aut passum tepidum, aut radicis dulcis decoctum cum passo, & hyssopo, aut ficus uino incoctas, aut succum ptisanæ, in quo uuæ sint passæ incoctæ. Magnopere iuuantur, si amygdalinum oleum in aures infundens, forinsecus spōgīs expressis leniter foueris. Quin & omelysis ex cruda hordeacea farina imponenda: aut ex farina seminis lini aut fœnigræci.

Tonsillarū in-
flammarū cu-
ratio secundum
Archigenem.

Quodd si iam prope ad suppurationem accedere tonsillæ uideantur, coadiuare assidue per ficuum decoctū oportet, p̄p̄modumq; incessanter id gargarisma exhibere, similiterq; aquam mulsam calidam. At si nihil tale apparuerit, auge scat autem malum ita, ut ægri uis transglutire possint, ac suffocationis principium sit nobis suspectum, aluus forti ciyistere, aut glande subducenda est, & secanda cubiti uena, cucurbitaq; cū sca-

rificatione collo ac mento affigendæ. Fomentis etiam & cataplasmatibus robustioribus est frequentius utendum, gargarismisq; assiduïs. Quod si ne his quidē remediis mitescat morbus, sed augeat̃ indies, uenæ sub lingua secentur, aut iuxta angulos oculorum, atq; illa quæ in fronte consistit. Illinatur autem assiduè fel tauri, & elaterium cū melle: aut sal cum oleo ueteri, mel leq; & aceto: aut cētaurea cum melle: aut absynthium cum nitro & melle.

Heræ medicamen ad collumellam laxatam. Gallæ omphacitidis, aluminis scissi, salis ammoniaci, sing. pares portiones conterito, inspergitoq;.

Vel Ageratum lapidem derasum in pollinem similiter columellæ imposito. Porro Heraclides Tarētinus rectē sanè post usum medicaminum exacerbantū, iubet colluamus fauces lentium decocto, ad tollendam uehementem illam astringentium aspredinem.

Ab Asclepiade prodita. Rosarum siccarum sextarium. j. nardi Celticæ unā cū radicibus, & adhærente terra, fasciculum. j. nidi hirundinum syluestrium aridi, drach. iij. myrrhæ drach. viij. gallas omphacitidas numero. xv. confusa & trita digitis apprime. Est enim hoc mistæ potētiae pharmacum.

Aliud. Piperis albi, myrrhæ, sing. drach. j. aluminis scissi drach. ij. gallæ omphacitidis tantūdem. trita admove. Hoc tamen utendum non est in gurgulione uehementer rubente.

Aliud eiusdem facultatis, quo & nos sumus usi. Lapidis agerati, Asiæ petrae, terræ samiae, sing. drach. iij. aluminis scissi, croci torrefacti, gallarum omphacitidum, singul. drach. ij. tritis utitor.

Critonis medicamentum digerens. Ossium palmarum, rucū tenerarum immaturarum, siccarum, ntrarunq; drach. iij. Vrito atq; in puluillum terito, utitorq; arido admoto.

Aliud Sorani, maximè mitigatorium, ac proinde conuenientissimum ad uigentes inflammationes. Glycyrrhizam contundito, &

Venæ sub lingua, uel iuxta angulos oculorum, inflammatis tonsillis, quæ incidendæ.

Columellæ laxatæ medicamen Heræ.

Faucibus inflammationis remedia ab Asclepiade scripta.

mel & aquam pari mensura affundito: dein coquito, & liquorem ipsum gargarizandum præbeto.

De pharmacis ad ulcera oris
aphthas appellatas.

Aphthæ sunt oris ulcera, præcipue inuadentia infantes.

Aphtharum curatio per moderate astringentia.

Aphthis uaria remedia a uariis descripta.

Vulcerationes in superficie oris obortas, aphthas appellant, habentes quippiam igneæ caliditatis. Fiunt autem plurimum pueris lactentibus, quum aut uitiosum fuerit lac nutricis, aut non probè ipsum concoxerit infans. Curantur faciliè, utpotè quæ uel à moderate astringentibus compescantur. Quandoq; tamen diuturnæ fiunt, ægreq; solubiles, & progressu temporis nonnihil putrilaginosum acquirunt: atq; hæ sanè fortiora medicamenta postulant.

Andromachi medicamen ad aphthas malignas. Aluminis scissi, ũstī, drach. ij. fructus ericæ, drach. j. oleo excipito, & per digitum locis apprimito. Eiusdem ad aphthas leuiiores. Lycium Indicum uino tritum circumlitum, & ericæ fructus tritus, aut rosæ siccæ cum melle, auxiliatur.

At Crito, adipem suillum, & mel, simul liquefacta, commendat: ut collutionem etiam ex asinino lacte: manducationemq; portulacæ intinctæ melle: quæ oia & simplicissima sunt, & pueris maximè idonea. Quæ scripserit Apollonius ad aphthas.

Ad aphthas albas, chalcitidem oleo tritam penna illinito. Postquam uerò puræ factæ fuerint, myricæ fructum tritum, aut aqua mulsa, aut uino dilutum, illinito, maximè infantibus. Ad nigras aphthas, uuam passam exacinatam, & anisum, trita cum melle illinito. Vel atramento sutorio trito cum melle utitor.

Vel æruginis uermiculatæ, obolos. iij. in uini quarta hemina parte gargarizandos præbe. Vel muriam

Oliuæ muria conditæ discutiant & uehementer astringunt.

oliuarum & acetum pari mensura mista, colluēda dato. Mandendæ sunt etiam oliuæ muria conditæ. Hec Apollonius. Etenim oliuæ sic asseruata, discutiūt atq; uehementer astringunt.

Quæ Archigenes ad aphthas scripserit.

ADaphthas faciūt collutiōes ex decocto foliorum oleæ, aut myrti albæ. Facit & amurca, & marrubij succus, aut lētis decoctū. Aut sæx uini dulcis cum melle illita. Sūmè facit ad depascētes, fæniculi radicis ustæ cinis. Porro ex colore ipso facilè licebit colligere qui nam humores ipsas aphthas, pduxerint. Rubicundiores siquidem, sanguinem præcellere indicant: flauiores, amaram bilem: albescētes, pituitosum humorem: quemadmodum nigrescentes, melancholicum succum. Qui autem hæc rite discreuerit, noueritq; facultates singulorum medicamentorum simplicium, is unicuiq; aphthæ speciei, proprium sciet administrare remedium. Expendet autē simul ipsas naturas corporum. Fortioribus quippe corporibus fortiora medicamenta adhibenda sunt: debilioribus imbecilliora. Ego porro infantibus qui adhuc à nutricibus alūtur, lentem cum modico pane, & medulla cerui, aut uituli exhibeo. Admisceo etiam cibus non nihil ex astringentibus fructibus. Quādoq; etiam de lactuca, seride, solano, & portulaca conficio aliquid, si aphtha sit inflammata. Quod si cibum assumere nequeant, nutricē eiusmodi uictu alo, utq; concoquat rectè, prospicio. Veruntamen etiam infantes illino, si quidem subrubras uidero aphthas, in principio quidem, ijs quæ moderatissimè astringunt, & frigefaciūt: deinde uerò, eis quæ citra mordacitatē discutiunt. Si uerò sufflauas uidero, iisdem utor, sed magis refrigerātibus. At si pituitosiores, astringentibus: ut si nigrescentes, discussorijs generosioribus. Cæterum in maioribus pueris, eiusdem generis facultatibus pharmacorum utor, auctis tantum in saniorum uiribus: quemadmodum etiam in perfectis & duris corporibus, singulis relatis facultatibus fortissimis utor. Suffecit autem mihi in his per omnia mihi usos cum uino astringente, quod tum intendit, tum

Aphtharū causas ex colore dignoscendi ratio.

Fortiora corpora ualidioribus egent medicamentis: ut imbecilliora mitioribus.

Aphtharū quæ infestant infantes, curatio.

remittit uim suam, prout magis aut minus uinum fuerit astringens : & prout crassius aut liquidius efficitur pharmacum ex misyos ac uini mistura. Quòd si sordida appareat aphtha, misy cum uino mulso tero. lis uerò qui fortiora q̃ misy, medicamenta postulant, ærugo similiter dissoluta, est utilis. Commodum est etiam pharmacum ad hanc rem, chalcitis oleo trita. Atq; hæc quidem efficaciora. Moderata uerò, & maximè ad incipientes affectus, omphacium cum uino, & cœnomelite: similiter etiam rhus. In pueris sufficit rosarū flos, & ipsæ etiam rosæ siccæ. In summa uerò, moderatæ aphthæ, maximè in corpibus teneris, moderatis pharmacis opus habet: sortes uerò, & maximè in duris corporibus, curantur à ualidioribus. Fortia pharmaca intelligo, tum quæ astringunt uehementer: tū quæ etiam mordicant: sicuti moderata, quæ prorsus sunt mordacitatis expertia, non nihilq; astringunt. Porro oleū per se, infestissimū est aphthæ affectui: ueluti etiā chalcitis: quandoquidem alterum quidem humectat, & sordes gignit: mordet autem uehemēter chalcitis.

Aphthæ moderate moderata medicamenta desiderant: ut maligniores, fortiora.

Aphthis fit optimum medicamen ex chalcith de & oleo moderate cōmisistis. Sarcoticū optimum fit ex cerato & ærugine,

Verū moderate mistura ipsorum, optimum pharmacum efficit. Nā quemadmodum ex cerato & ærugine incarnās effici pharmacum solet, tametsi ambo per se sint contraria carnigignende: eadem ratione ex oleo & chalcith de aptum medicamentum conficitur.

GALENI PERGR.

MENI, DE COMPOSITIO.

NE MEDICAMENTORVM, SE.

cundum partes, Liber. VII.

De affectionibus contingentibus circa
respirationis organa.

SPERÆ ARTERIAE Phar
maca, mos est appellare arteriaca. Vo
cant enim arteriam asperam, uiam il
lam quæ ducit à larynge ad pulmo
nes, ex chartilaginosi corpusculis,
bronchis dictis, cõflatam: unde etiam

Arteriaca phar
maca quæ di
cantur.

Aspera arteria
ex quibus con
stet particulis.

tota arteria, interdum dicitur bronchos. Vestit autem
ipsam intrinsecus quædam crassa mēbrana, quam ob
crassitudinem nonnulli tunicam nominant. Scripse
runt porro ueteres multa & diuersa medicamenta ad
affectus organorum respirationis: ad uocemq; tum in
terceptam, tum raucam. Etenim ubi instrumenta uo
cis ab humiditate uehementius atq; tenacius impa
cta, fuerint imbuta, uox intercipitur: quum uerò mode
ratiùs humecta sunt, oboritur raucedo. Organa uocis
quum dico, intellige arteriam, & laryngem, & pharyn
gem, siue epiglottida. Qui igitur ex uehementi clamo
re uocem amplius oblaxam habet, iis similis quædam
affectio contingit in illa tunica asperæ arteriæ interna,
ei quæ manibus, cruribusq; & musculis, ubi plurimū
laborarunt. Cæterum curationis genus euariat. Siqui
dem crura & manus confricare per oleum licet: quum
per cutem in adiacētes musculos penetrare ipsius pos
sit facultas. Iuxta asperam uerò arteriam chartilagines
post cutē sitæ, prohibent in subiectam pelliculā tran
situm facultatis unguentorum mollientium. Itaq; au
xiliorum materia congruentium respirationis organis,

Vox quādo in
tercipitur.

Raucedo quā
do gignatur.

Vocis organa
quæ.

Respiratiōis or
ganis male af-
fectis remedia
unde petenda
sint.

Tunica eadem
uestiri gulam,
pharyngem, la-
ryngem, & in-
terna asperę ar-
terię.

hypoglottides
ex quibus con-
stentur.

Hypoglottidi-
bus quomodo
sit utendum.

Extergētia ad
uocis puritatē
facientia, quę
sint.

Voci aut impe-
ditę, aut raucę,
ob inflāmatas
affectiones cir-
ca laryngē, aut
asperam arte-
riam obertas,
qualis uict⁹ &
medicinę ra-
tio conueniat.

quum ab alijs petenda est, tum etiam à balneis dul-
cium aquarū, cibisq; & lenibus, & laxantibus. Si qua
uerò aspreo sentiatur, cibis utēdum est, * qui diutius
hæreant partibus quę cum loco affecto commercium
habent. Est enim una, eademq; sibi continua & cohæ-
rens tunica, quę pharyngem, laryngem, gulā, & in-
terna ipsius asperę arterię uestit, obducitq;. Quare ci-
bi congruentes tunc erunt, qui ex lacte, amylo, alica,
ouis, & libis dulciarijs constant. Si uerò per hæc non
curetur affectio ipsa, inuēta sunt à medicis pharmaca
sub lingua tenenda, ob idq; hypoglottides appellata:
quę eadem facultate cum arteriacis uocatis prædita,
ex uino Theræo, gummi, tragacantha, & glycyrrhiza
constantur: quę laxigant quidem, reprimuntq; om-
nes asperitates: quicquid uerò reliqui est, ex inflamma-
tione, concoquunt, & cito persanant. Qui autem phar-
macum linguę subdet, patiens sit laboris oportet, ut
ipsum paulatim liquefcens, in laryngem excipiat, re-
nitens interim tussī, si qua excitari uideatur. Impossi-
bile tamen est, ut hi claram uocem elidant, citra usum
pharmacorum absq; acrimonia extergentium: qualia
sunt faba fresa elixa, ptisana, ac semē lini torrefactum.
His magis detergūt resina terebinthina, thusq;, ac de-
spumatū mel, & amygdalę amarę: quęadmodum
istis rursus fortiora sunt farina erui, semen hormini, ra-
dix iridis, panacisq;. Cæterum his omnibus uina mol-
lia, & passum Creticum, & Theræum, & Scybelites,
& sapa, & decoctum caricarum, conueniūt. Est autem
ab affectionis principio, usq; ad finem eiusdem, paula-
tim progrediendum à leuissimis tum cibis, tum me-
dicamentis, ad ea quę discutiant detergātq; uehemen-
tius. Igitur primi ordinis sunt tragacantha, gummi, sa-
mīus aster, amyllum, sorbitio ex alica & trago, lac, pa-
nes dulciarij, oua sorbilia, sesama, & nuces pinę,
quas strobilos uocant. Ab his autem deinceps est hu-

tyrum, & glycyrrhizæ decoctum : id quod præstiterit ad sapam ex musto, uel ad Cretitum passum miscere, rursusq; coquere. Hæc itaq; in affectionibus inflammatis circa arteriam atq; laryngem ortis commoda in principio sunt: donec moderata inflammatio fiat: ac præ omnibus à uini potu hoc tempore abstinendum est. Quum uerò moderatior facta inflammatio fuerit, uinum dulce Theræum, aut Scybelite bibere licet: quo tempore etiā butyrum est aptum, et sorbitio ex amygdalis, necnon ex lacte & melle diutius coctis, amyloq; iniecto, aut filigine. Qua sanè uictus ratione inflammatio quidem ipsa sedatur: relinquitur tamē humiditas multa, ob quam impossibile est claram uocem proferri. Quare transire tunc conuenit ab his eduliis, ad omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam elixam, & prisanam, & brasficam, & porrum probè coctum. Similiter etiam pharmacorū usus idoneus est, quo tempore inflammatio aut aspredo præcellunt, eorum quæ detinentur sub lingua: post hæc magis detergentia & resiccantia exhibemus: idq; gradatim facimus, donec ad ea quæ acredinis non nichil sortiuntur, perueniamus. Deinceps igitur ex arteriacis quæ à ueteribus prodita sunt, eligens præstantiora, huic methodo adiciam: quæ quidem nec discernere, nec ijs probè uti poterit, qui in commentariis simplicium medicamentorum accuratè non fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho scriptis.

T Huris, myrrhæ, croci, sing. drach. j. scillæ, drach. ij. passi Cretici, sextar ij. Scilla in passo coquitur, donec inspissetur passum: dein scilla abiecta, insperguntur reliqua: sitq; electon, hoc est delingibile pharmacum. Alia arteriaca confectio. Aloes sextantem: croci vnc. j. mastiches tantundem. Conficito. Soluit enim aluum, concoquitq; (croci ratione) ea, quorū gratia exhibetur. Alia leniens exasperata, conco-

Arteriaca, hoc est ad affectus organorum uocis & respirationis cōgruentia, pharmaca Andromachi.

Tabidis arteri-
aci optimū.

quensq; & extergens. Thuris, succi glycyrrhizæ, sing. vnc. j. tragacanthæ, drach. vj. nardi, drach. j. myrrhæ, amomi, croci, sing. drach. iij. mellis Attici quod sit satis. Conficito.

Hæmoptoicis
arteriaca con-
fectio.

Alia arteriaca, optima ad tabidos, & omnes inueteratos pulmonis & thoracis affectus, Cinamomi, thuris, utriusq; vnc. j. succi glycyrrhizæ, myrrhæ, tragacanthæ, nardi Indicæ, amomi, singul. drach. iij. croci drach. j. Melle Attico excipito.

Alia ad arteriam affectam, ulcera pulmonis, puris & sanguinis reiectiones, fluxionesq; in thoracem, & ad ea quæ ægrè educi possunt, uehementer efficax. Resinæ terebinthinæ, croci Cilicij, thuris, myrrhæ troglodyticæ, cinnamomi, amomi, nucis pinæ, glycyrrhizæ absq; medulla, asteris samij, chalbani, costi, singul. drach. iij. nardi Syriacæ, drach. ij. S. cassiæ nigræ, drach. ij. tragacanthæ, palmularum Syriacarum carnis, sing. drach. ij. Mellis Attici heminas. iij. Conficito. Hypoglottides, hoc est orbiculi sub lingua tenendi, ad aspredines gutturis, interceptam uocem, & sanguinem reiectantes. Tragacanthæ drach. vj. gummi drach. v. thuris, drach. j. obol. j. myrrhæ drach. j. obol. ij. croci tantundem: succi glycyrrhizæ, drach. j. obol. iij. aut rad. drach. ij. S. piperis albi, grana. xxv. palmularum pinguium carnis, drach. iij. Tragacantham passo maceratam & tritam reliquis tritis committito, singitoq; catapotia magnitudine fabæ.

Hydropi recte
ti optimū me-
dicamen.

Arteriace delingibilis, ad tabescētes, purulentos, adq; hydropas incipientes, & tussēs inueteratas congruens. Datur per diem & noctem cochlearij mensura. Succī scillæ, sext. iij. passi Cretici, sext. iij. Vini Falerni sext. viij. Mellis Attici sext. iij. myrrhæ trientem. croci, thuris, utriusq; sextantē. aristolochiæ oblongæ, minam. j. S. glycyrrhizæ, minam unam. radicis eryngij, sextantem. Cassiæ, nardi Celticæ, sing. vnc. j. xylobal sami, bessem. Lignosa illa contusa in uino macerato per

triduū

triduum, dein ad lētum ignem ad tertias coquito, atq; ita exprimito, & retrimētis abiectis, passum, mel, & scillæ succum coniſcito, & ad mellis crassitudinē coquito. Crocum uerò, thus, & myrrham, cum uino terito, atq; ubi optimè habuerit pharmacū, addito: postq; uerò fuerint modicè fusa, ab igne tollito, & reponito ad usum.

Alia arteriaca media medijs congruens arteriæ affectibus. Croci, uug. passæ exacinate, utriusq; drach. j. amygd. dul. drach. viij. myrrhæ, obol. iij. tragacanthæ, drach. iij. piperis albi ob. iij. melle cocto excipiantur.

Critonis Arteriaca, ad uocem interceptam. Ficum & eryngium probè coquito, & ad decoctum ipsorum gummi addito, ut melle durior confectio fiat: exhibetoq; ad noctem.

Alia eiusdem, faciens ad affectus arteriæ, & ulcera tum auriū, tum etiā pudendi. Thuris, ob. iij. myrrhæ drach. ij. passi cyathos. iij. Passum ad mellis spissitudinē coquito: dein myrrham & thus cum passo semicocto ablato, misceto. Facit etiam ad dysentericos & coeliacos. Rectissimè autem fecerit, qui artericas concoquentes atq; lenientes, in duplici uase coxerit, nempe uasculum quod coquendum pharmacum cōtinet, in aliud plenū aquæ feruentis imponens.

Confectio Critonis ex capitibus papaueris, diacodyō dicta, ad affectus organorum respirationis conducens. Capita papaueris agrestis octingenta. aquæ sextarios. lxxx. Coquito ad tertias, hoc est donec flaccida appareāt: atq; expressis addito mellis, lib. x. Si uerò uariā efficere uis, adde croci, myrrhæ, succi hypocisthidis, sing. drach. xij. thuris drach. vj. acaciæ drach. xij. Optima tamen est simplicissima.

De usu confectionis ex papaueris capitibus.

V Sus eius est in ijs qui somno opus habēt: quibus etiam ex opio confecta sæpe exhibere cogimur. Opus habēt maximè huiusmodi pharmacis ij, quibus

Voci interceptæ arteriaca Critonis.

Ulceribus auriū, pudendiq; medicamentū.

Coquenda est, se arteriaca lenientia in duplici uase, & quomodo. Diacodyō Critonis.

Diacodyō, hoc est ex capitibus papaueris, cōfectū medicamentū, quibus conueniat.

tenuis fluxus à capite ad asperam arteriā destillat, non permittens dormire ob consequentem tussim. In talibus ego etiā ex sapa, hoc est hepsenate, siue musto cocto, quod etiam siræon uocant, pharmaci compositionem parare soleo. Quin & per passum aut Thergium Creticū melius est q̄ per mel cocturā fieri, ubi fluxus ualde tenuis extiterit. Mel siquidem fugiendū tunc est, quum tenues fluxiones augeat, facultate tenuandi pre-
ditum. Admiscetur etiam huiuscemodi pharmaco glycyrrhiza, ita ut simul cum ipso coquatur. Si uerò in pulmone consistat copia humoris delapsi à capite, confectio ex melle est præstantior. Datur commodiora mensura duorum cochleariorum satis magnorum copia. Augebis autem & minues hanc copiam, respiciēs ad magnitudinem corporis cui exhibiturus es, necnon ætatem, anni tempus, atq; regionē. In omnibus enim his frigidioribus minimum dabis: calidioribus amplius.

Mellis usum fugiendum esse, ubi tenuis fluxus a capite ad asperam arteriā destillat, recipiendū autem crassus. Diacodyō medicamine utendi modus.

Arteriaca medicamenta ab Asclepiade relictā.

Arteriaca ab Asclepiade scripta. Brassicæ succum melie coctum lingendum exhibe. Alia. Cremoris eryngij, in aqua cocti, heminas. ij. Cremoris caricarum similiter coctarum, tantūdem. His adde gummi subtilissimē dissoluti, drach. vii. j. coquito diligenter ad arteriaca spissitudinem, & inde cubitum itur ad cyathi mensuram lingendum dato.

Alia. Chalbani drach. vj. piperis drach. j. nitri tantūdem. mellis Attici cyathos. vj. Chalbanum & mel coquito, defataq; adiūcito ceteris, utitorq;. Alia insignis. Croci, myrrhæ, succi glycyrrhizæ, thuris, casia, sing. drach. j. piperis grana. xxiiij. passi Cretici sext. iij. mellis Attici, cyathos. vj. utere.

Hypoglossis, hoc est medicamē sub lingua tenēdum Dioscoridæ.

Hypoglossis Dioscoridæ. Croci, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, sing. drach. j. nuces pineas repurgatas, contusasq; numero. lx. amygdalas mundas totidem. Excipiantur melle decocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua tenenda. Alia Mithridatis. Myrrhæ, croci, utriusq;

drach. iij. nardi Indicæ, terebinthine, utriusq; drach. ij. thuris, casti, cinnamomi, sing. drach. j. passi Cretici heminas. iij. Passum & terebinthinam ad perfectam compositionem coquito, & cum siccis committito: indeq; ad nuncis ponticæ magnitudinem sub lingua tenendum dato.

Hypoglottis
Minidatis.

Alia mirifice faciens ad affectiones thoracis. Farinæ fabaceæ tostæ, hem. j. iridis Illyricæ, quadrantem. nucum pinnerarum tostorum, sextantem. pulegii aridi contriti, sesquidrachmâ. seminis urticæ, drach. j. piperis, vnc. s. Mellis boni, sext. ij. Farinam cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini etiam tusti, tosti, & cribrati heminam unam in promptu habeto, cum ceterisq; adijcito.

Hypoglottides
uarie, multi.
q; usus.

Alia ad tussim & spiritus prolationem, ualde probè expurgans. Hyssopi, pulegii, utriusq; sextantem. iridis, sem. sinapis, nasturii, anisi, piperis, sing. vnc. j. tusa & cribrata melle cocto excipito. Datur cochlearis boni mensura. Confectio ex marrubio Platonis. Myrrhæ, styracis, opii, succi marrubii, chalbanii, croci, æquales partes. Vtere melle cocto exceptis. Pharmacum Harmonia dictum ad destillationes, insuperabilemque defluxum conducens. Styracis, castorii, piperis, cardamomi, sing. drach. iij. opii, myrrhæ, sem. hyoscyami albi, sing. drach. iij. passo excepta in catapotia reducito, datoque ciceris magnitudine ad somnum.

Marrubio con
flans medica
mentum.

Harmonia di
ctum medicame
tum, defluxui ad
pectus conferens.

Medicamen Andromachi, Ambrosia dictum, ad phthysicos & febres repetentes per circuitus. Nardi, croci, myrrhæ, costi, casti, cinnamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorii, chalbanii, terebinthinæ, styracis, succi papaueris, seminis hyoscyami, sing. drach. j. tragacathæ, drach. vj. anisi, sem. lini. sing. drach. j. mellis quod sit satis. vini Phalerni heminam. Tragacantham uino sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle committito. Datur febrientibus sesquidrachma ex aqua mulsa: febre carêntibus vncia dimidia cum melle & aceti cochleario uno, et uini Phalerni cyathis duo.

Ambrosia An
dromachi.

Febribus repe
tentibus p cir
cuitus Ambro
sia Androma
chi confect.

bus. Aliud ad omnem tusſim. Anifi drach. ij. coſti, obolos. iij. myrrhæ, caſtori, chalbanī, piperis albi, ſem. hyoſcyami, opij, ſucci glycyrrhizæ, ſing. drach. j. paſſo excipito, redigitoq; in cataportia, ciceris magnitudine. Aliud ad omnem tusſim, & fluxionem, & abſceſſus internos. Sagapeni, gentianæ, myrrhæ, opopanax, piperis albi, ſing. drach. ij. baccarū lauri mund. drach. iij. trita, & aqua excepta, exhibeto ad Græcæ magnitudinem fabæ: iſchiadicis tamen paulo plus, ex uini diluti cyathis tribus.

De reiectione ſanguinis.

**Hæmoptico-
næ curatio.**

IN reiectione ſanguinis primum periculū eſt, ne imoderata eius uacuatio fiat. Vbi uerò ſuppreſſus eſt, curatio eius quidem, quæ ex reſeratione oſculi alius uas contigit, per obturationem ſit oſculi dilatati: eius uerò quæ ex uas rupture, per conglutinationem eiſdem: quemadmodum eius quæ ex eroſione, per eroſorum renutritionem. Obturatur igitur oſculum reſeratum, per aſtringentia: cōglutinetur autem ruptum, per eadem, & quæcunq; ipſis in compoſitione miſcentur, citra mordacitatem reſiccantia, & glutinoſum quidam habentia, uelut eſt Lemnia terra, & Samius aſter.

**Obturatione uas
ferum a quibus
fiat.**

**Glutinatione rup-
torū uasorum a
quibus fiat.**

**Renutritio ero-
ſorū, a quibus
fiat.**

Renutrientur corroſa per cibos boni ſucci, & pharmaca carnem gignētia. Igitur iuxta primam rationem, ex talibus pharmaca componuntur congruentia ad curandam ſanguinis eiectionem: iuxta ſecundam uerò, in iſs qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge re-

**Distributionis
rōne miſceri
aſtringentibus
medicamenta
cōtraria diſpo-
ſitioni hæmo-
pticæ.**

iectionem ſanguinem, miſcentur prædictis congruenti mēſura calida & tenuium partium medicamenta, quæ inſeſtiſſima ſunt tribus illis affectionibus dictis: miſcentur inquam gratia distributionis, ut uidelicet aſtringentibus medicamentis præparent, ac ueluti ſternant uia. At quum ex locis circa ſtomachum, aut aluum, aut ali- quod inteſtinum, ſanguis educitur, huiusmodi pharmacorum miſtura non eſt opus: infeſtiſſimum tamen his

est id genus pharmacorum, q̄ in tantum refrigerat, ut affectuū stupefaciat: quāvis & hæc misceantur medicamētis ad sanguinis reiectiones congruentibus: quū altiore somnum cōcilient, & cōmodissima sūt ijs q̄ tussī lancinantur, sistētia nimirum sanguinem qui ad uas affectum defertur: atq; hoc per suam frigiditatem. Atq; hi sanē sunt compositionis scopi.

Quæ An- dromacho ad sanguinis reiectionem scripta sunt. Acaciæ drach. iij. rosarum siccarum, balaustrij, singul. drach. viij. gummi, drach. ij. tragacanthæ, drach. j. cum aqua pastillos facito, quorum singuli pendeant drach- mam unā. Dato ex aqua pluuiæ: habet enim uim astringendi.

Aliud sistens sanguinē. Croci Cilicij, myrrhæ, iridis, nardi Indicæ, thuris, acaciæ, sing. vnc. j. succi papaueris, costi, piperis, sing. vnc. s. rosarum siccarum trientem. Melle excipito. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudo. Aliud. Succī hypocisthidos, balaustrij, acaciæ, gallæ, cytinorum, sing. drach. xij. succi papaueris, drach. vj. croci tantūdem. Redigito in triobolares pastillos. Aliud egregium Balaustrij, acaciæ, opij, myrrhæ, sing. drach. ij. tragacanthæ, succi hypocisthidos, florum rosarum, seminis hyoscyami, sing. drach. iij. thuris drach. iij. excipito succo polygoni.

Aliud ad hæmoptoicos & dysentericos. Floris rosarū, opij, acaciæ, gummi, balaustrij, hypocisthidos, sing. quadrantem, gallæ vnc. j. seminis plantaginis, eiusdemq; succi, utriusq; sextantem. Lycij Indici, succi rosarum, utriusq; vnc. j. redigito in pastillos drachmales.

Quæ Asclepiades ad sanguis reiectiones scripserit. Radicis polygonij manipulum: rad. symphyti tantūdem. rhois rubri, acetabulum. aquæ sextarios. iij. coq- to ad tertias, & expressi liquoris cyathum unum dato, cum gummi tenuissimè triti & dissoluti drachma una.

Aliud. Mororum rubrorum nondum maturorum lib. xvj. aquæ pluuiæ sextarios. xvj. coquito ad tertias

Stupefacientia
medicamenta
qua rōne phar-
macis cōgruē-
tibus ad san-
guinis reiecta-
tiōes, misceant
Hæmoptoicis
remedia ab An-
dromacho scri-
pta.
Sanguinis reie-
ctioni reme-
dia.

Dysentericæ re-
medium.

Hæmoptoicis
remedia ab As-
clepiade scri-
pta.

& expressum liquorem reponito. Idem licebit facere etiam de corni fructu. Aliud. Balauſtij, terre Sa-

miæ, corticis thuris, gummi, singulorum æquale pondus. Trita & cribrata exhibe cochlearis mensura in aquæ frigidæ cyatho uno.

Aliud. Succi hypocisthidos, succi acaciæ, succi rhois syriaci, balauſtij, opij, gummi, sing. drach. iij. Vini myrtitis, quod satis est.

Pastillorum ex succino Confectio, & utitor. Pastillus ex succino, hæmoptoicis, diurnæ & recentis tussi, phthisicis, sanguinenti reijcientibus, purulentis, coeliacis, dysentericis, et inflatis conferens. Psyllij mundi, drach. xl. v. iridis Illyricæ, mastiches, ramentorum succini, croci, sing. drach. xxx. opij, drach. xv. Psyllium in aquam calidam coniectum macerari finito. Vbi uero suo glutine & mucilagine ipsam aquam infecerit, liquorem exprimito, & cum eo pharmacum in pastillos cogito. Ex quibus obolos. iij. ad somnum dato. Sint autem aquæ sextarij terni.

Confectio, & utitor. Pastillus ex succino, hæmoptoicis, diurnæ & recentis tussi, phthisicis, sanguinenti reijcientibus, purulentis, coeliacis, dysentericis, et inflatis conferens. Psyllij mundi, drach. xl. v. iridis Illyricæ, mastiches, ramentorum succini, croci, sing. drach. xxx. opij, drach. xv. Psyllium in aquam calidam coniectum macerari finito. Vbi uero suo glutine & mucilagine ipsam aquam infecerit, liquorem exprimito, & cum eo pharmacum in pastillos cogito. Ex quibus obolos. iij. ad somnum dato. Sint autem aquæ sextarij terni.

Pastillus ex corallio.

Pastillus ex corallio. Corallij, terræ Samiæ, utriusque drach. viij. Balauſtiorum, amyli, terræ Lemniæ, sing. drach. iij. sem hyoscyami albi, opij, hypocisthidos, sing. drach. ij. Excipe succo arnoglossæ, cogeque in pastillos, & exhibe.

Confectiones sedantes dolorem, tabescentibus & sanguinem reiectantibus, internorumque affectibus, commoda, ab Andromacho scriptæ.

Anodyna Andromachi, ad affectus organorum respiratorum, aliasque internas dispositiones, congruentia.

Radiciis panicis, seminis dauci, castorii, sem. hyoscyami, opij, sing. drach. iij. Mellis quod sit satis. Dantur oboli quatuor, cum aquæ cyathis tribus.

Alia sedans dolorem, ualens ad tormina, & dysenterias. Sem. apij, drach. ij. anisi drach. j. piperis albi, tantundem. myrrhæ castorii, utriusque obolos. iij. opij, croci, sing. obolos. iij. gentianæ drach. ij. Pastillos triobolares conficito, uarieque utitor.

Alia iucunda appellata. Iridis Illyricæ, succini, croci, mastiches Chiæ, sing. drach. xxx. psyllij, drach. xl. v. succi papaueris drach. xv. cum aqua pluuia

pastillos, quorum singuli pendeant drach. j. S. conficito, & exhibeto. Psyllium tñ per diem ac noctē aqua pluuiali macerato: dein coquito, & exprimito, cremoremq; cum aliis misceto.

Alia dolorem sedās, ad omnes internos affectus & sanguinis reiectiones, undecunq; erumpant. Facit & ad nephriticos & hepaticos. Hanc ne prius dederis, q̃ mercedem accipias.

Cinnamomi, castie, utriusq; drach. ij. myrrhæ, piperis utriusq; chalbani, sing. drach. j. opii drach. ij. Trita cū melle pauco, in catapotia redigito, partim magnitudine sabæ, partim quantitate araci. Dato iuxta cuiusq; vires cum aqua, aut pro iudicio tuo.

Alia ad eadē, Mysterium dicta. Croci, costi, castorii, asari, sem. hyoscyami, opii, styracis, sing. drach. j. Excipito melle utrorq;.

Anodyn a ad easdem affectiones ab Asclepiade scripta. Seminis cucumeris hortensis decorticati, drach. viij. amyli, drach. iiij. sem. lini, sem. papæ. alb. utriusq; drach. ij. Tusa & cribrata excipe tragacanthæ cremore, & i drachmales pastillos redige. Dant oboli. iiij. nō febriētibus qdē, ex uino: febriētibus uerò, ex succo rhois. Faciūt ad fluxiōes thoracis.

Cōfectio Panchrestus dicta, hoc est multi usus, ad tussim antiquam, purulētos, orthopnoicos, tabescētes, ad oēsq; inflatiōes. Pellit secūdas & menses, medeturq; uelicę affectibus.

Terebinthinæ, drach. viij. styracis drach. vj. myrrhæ, drach. v. croci, iridis, chalbani, sing. drach. iiij. Seminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanacis, singul. drach. ij. piperis, spumæ nitri, utriusq; drach. j. passo excipito.

Antidotus Aristarchi admiranda, conferens ad affectiones prædictas, renitensq; uenenis, exterminansq; febres repetētes per circuitus, una hora ante exacerbationem exhibita. Cinnamomi, costi, chalbani, castorii, succi papaueris piperis nigri & longi, styracis, sing. vnc. j. mellis sextariū unū.

Arida teruntur & cribrantur. Chalbanum coquitur cū

Anodyna ad
internos affe-
ctus ab Ascle-
piade scripta.

Panchrestos
Asclepiadis,
multi usus ad
uarios interno-
rum affectus.

Antidotus Ari-
starchi admi-
randa.

melle: excolatis uerò reliqua adduntur, reponunturq; in uitream pyxidem, argenteam'ue. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum aquæ mulsæ cyathis duobus, instillatis digito guttis aceti nouem.

De orthopnoea.

*Asthmatici cur
sic dicantur.*

*Orthopnoici
cur sic dicant.*

*Orthopnoæ
causa.*

Purulenti.

*Peripneumo-
nici.*

*Respirationis
organorum an-
gustia quæ effi-
cere possint.*

*Potum esse de-
bere modicum
iis quibus or-
gana respirati-
onis ab aliquo
tumore angu-
stantur, contra
multum illis, quibus
bronchia
a crassis & ui-
scidis succis ob-
struuntur.*

Qui citra febrem dense respirant, ob symptoma id dicuntur Asthmatici, hoc est anhelosi. Eisdem etiam ob symptoma aliud orthopnoicos appellant, quod thorace recto spirare cogantur, metu suffocationis. Minus est autem quod hi inspirant, quam pro usu respirationis, etiam si thorax ipsis plurimum dilateetur. Ex quo manifestum sit, internam capacitatem coarctatam ipsis esse preter naturam, id quod ægri etiam haud obscuro sensu perceptant. Fit etenim & purulentis locorum coarctatio, ob collectum inter thoracem & pulmones humorem. Fit etiam peripneumonici, ob pulmonis inflammationem. Restant autem adhuc affectiones duæ quæ angustiam locorum faciunt in uicis per quas aer inspiratur: quum aut humorum crassorum & uiscidorum multitudo pulmonis bronchiis fuerit impacta: aut tumor abscessui similis in ipso constiterit. Cæterum curatio ambarum affectionum aliquid commune habet: aliquid priuatum, & alteri tantum proprium. Commune quidem utrisque est, ut absumatur redundantia humoris affectiones gignentis: proprium, affectioni quidem uiscidorum humorum, ut per attenuantia & extergentia pharmaca dissipentur: ei uerò quæ propter tumorem accidit, ut per attenuantia & exiccantia eadem communi sumptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in profundo abscessibus communis existit. Vini itaque potus ambarum competit. Omnis autem potus modicus sit in iis qui alicubi abscessum habent: multus contra, in illis, quibus uiscidis & crassis succis sunt obturata bronchia. Quippe pharmaca eiusmodi repurgantia humores, tussis necessario excitant: non uerò facile per sputum reijciuntur, quod expurgatum est, nimirum ob crassitudinem.

Quapropter humectatione multa opus habet quo effe-
ratur facilè.

Quæ scripserit Asclepiades ad dys-
pnoicos. Scillæ crudę succum exprimito, eiq; parem
Attici mellis mensuram addito, & ad prunas admo-
tas coquito. Dato inde & ante & post cibum mystri
mensuram.

Aliud. Origani drach. viij. comæ thy-
mi, iridis Illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi
torrefacti, sing. tantundem. Cribrata melle cocto ex-
cipito. Dato rucis ponticæ magnitudinem.

Aliud. Vuæ passæ rhodiæ, exacinatæ, acetabulum. foenigræ-
ci loti tantundem. aquæ pluuiæ sextarium. j. Coquito
donec dissoluantur, & liquorem excolatum reponito.
Ex hoc præbeto assiduè, & iuxta singulas irritationes,
cyathi mensuram calfactam.

Aliud. Anisi, sulfuris
uiui, utriusq; quadrantem. ammoniaci thymiamatis,
castorij, melanthij, sing. drach. iij. aqua diluta in cata-
potia cogito, unumq; in aceti mulsi cyathis tribus pro-
pinato. Hæc omnia sunt ab Asclepiade scripta illis, qui
bus pulmonis bronchia crassis & uiscidis humoribus
sunt referta. At uerò abscessus qui attenuatibus & re-
siccantibus opus habent, maximè gaudēt aromatum
facultatibus, quæ & tenuium partium sunt, & resicca-
torix, præter hoc quod calfaciunt. Porro ijs qui pro-
priè orthopnoici & asthmatici nominantur, pharma-
ca conueniunt secantia citra calfactionem: ob idq; iu-
uantur maximè ab scillitico aceto: necnon ab scilla, &

ab aceto mulso eodemq; scillitico. Quemadmodum
autem in hac affectione uehementer cauendum est, ne
calfaciamus, propterea qd uiscidi & crassi succi nō mo-
dò non iuantur, sed offenduntur etiam usu calfacien-
tium: eodem modo quæ ualde refrigerant sunt omni-
no uitanda.

Quæ pharmaca scripserit ad eiusmo-
di affectiones Andromachus. Ad dyspnoeam,
Sulfuris uiui drach. j. Sem. rutæ syluestris, tantundem;
aristolochiæ, absynthij, ammoniaci thymiamatis, ab-

Dyspnoæ re-
media ab As-
clepiade scri-
pta.

Scillinum ace-
tum orthopnoi-
cis asthmati-
cisq; maxime
opituitur.

Dyspnoæ re-
media Andro-
machi.

rotoni, sing. drach. iij. trita cum aceto in catapotia fabarum instar redigito. Dato mane tria, & uespi totidem.

Aliud. Ammoniacy thymiamatis, abrotoni, singu. drach. ij. sulfuris uiui, drach. j. formato cum aqua pastillos, & cum aquæ mulsæ cyathis tribus præbeto.

Aliud. Scillæ, sulfuris uiui, bituminis, sing. partē unam. Dantur obol. iij. in aceto mulso.

G A L E N I P E R G A

MENI, DE COMPOSITIO.
NE MEDICAMENTORVM SE-
cundum partes, Liber. VIII.

De pharmacis congruentibus ori uentriculi.

Infirmēta duo nobis fuisse data a natura necessaria ad uitæ actiones, experientiā nempe, & rōnem: quorum semper ad perfectā disciplinam alterum indiget altero.



ORRO' DIFFICILLIMUM est, ad ueritatem eos reuocare, qui sese alicui secūg seruiliter addixerunt. At qui prudentes sunt, ueritatis q; ardenti desyderio tenētur, ij (ut spero) custodient ea quæ a natura nobis ueluti iudicandi instrumenta con-

cessa sunt, ad actionum uitæ cognitionem, Experientiam nempe & Rationem: quorum semper alterum, ad perfectam disciplinam, altero indiget. Etenim falsæ opiniones animos hominum præoccupantes, non solum surdos, sed adeo etiam cæcos efficiunt, ut uidere nequeant, quæ ab alijs conspicuè cernuntur. Proinde fit, ut complures Empirici, nec pauci etiam ex ijs qui sese Methodicos iactant, per pharmaca relaxantia curantes inflammationes oris uentriculi & hepatis (quæ miscellam astringentium desyderant) ægros omneis ad unum occidant, atq; in exitium adigant. Quippe nisi facultatem quæ firmitudinem addat, in illarū par-

Inflammationes oris uentriculi et hepatis, cum relaxantibus miscellam astringentium pharmacorum desyderant.

tium affectibus ad relaxantia permisceas, uita in discrimen uocatur. Igitur astringentia omnia quæ ad illarum partium affectus, partim emplastris atq; ceratis mista adhibentur extrinsecus; partim intus uorantur: impresentiarum ea ipse indicabo, auspicatus ab ijs quæ conueniunt inflammationibus: q̃p maximè in ipsis agri periclitentur. CERATVM ergo quo assidue utor, ex aloë, mastiche, cera pontica, & unguento nardino constat. Cæterum ad unciam unam mensuralem nardino olei, hyeme quidem. viij. æstate autem. viij. ceræ ptes induntur. Liquatis igitur in duplici uase, refrigeratisq; & derasis, addes aloes & mastiches, reductorum in pollinem, utriusq; drachmam. j. & quandoq; plus: sic tamen ut ad sesquidrachmam non progrediaris. Quod si ampliori opus sit astrictione, nimirum tanta imbecillitate existente, ut uenter retinere cibos nō possit, addes drachmam unam omphacij: id quod primo iniici debet in cerati præparatione. Similiter licebit absynthij succum miscere; quandoq; etiam ambo: sicuti & tertium hypocisthidis: & quartum oenanthæ. Quin & rhois succum non raro admiscui. Cerati tamen augenda est copia, iuxta proportionem numeri aliorum pharmacorum. At inueteratis atq; induratis inflammationibus, magis uaria conueniunt pharmaca, & quæ ex aromatis quippiam habeant, non nihilq; etiam emollientium atq; digerentium sortiantur: cuiusmodi est quod ex meliloto conficitur, congruè omnibus iuxta præcordia inflammatis. Porro os uentriculi, nonnulli hodie communiter stomachum nominant: quam partem olim frequentius cardiam, hoc est cor, appellabant: unde uox cardialgia est deducta, quæ minimè quidem cordis, sed oris uentriculi dolorem & mordicationē significat. Fiunt quippe in ipso tū morsus, tum inexplibilis fames, ut interdū etiam nauseosæ dispositiones: in quibus omnibus communis qui-

Ceratum Galeni ad inflammationes oris uentriculi & hepatis maxime congruum.

Os uentriculi, quod olim cor noīabant, nonnulli hodie stomachū uocant. Cardialgia significat morsum oris uentriculi.

Affectus inter-
ni ut cognoscatur
opus est cō-
iecturis.

Intemperantię
particulare sūt
cōto, quas per
contrarias qua-
litates reduce-
re ad medicri-
tatem oportet.

dam astringentium pharmacorum usus inventus est :
admista autem sunt plerisque ipsorum calfaciētia simul
& resiccātia. Verūm affectus in profundo sitos, ut co-
gnoscamus, maximis utamur cōiecturis est opus: ob
idq; utilissima Medicę artis pars est, quę cognitio-
nem ipsorum indicat. Quum igitur octo sint in singu-
lis partibus intēperantię corporis: atq; hæ omnes aut
secundum solas nudas qualitates gignantur: aut acce-
dente alicuius humoris complexu: certē earum singu-
læ per contrarias qualitates sunt reducendæ ad me-
diocritatem. Quia uerò plurimæ intemperaturæ ho-
minibus ex redūdantia humorum, magis q̃ ex inopia
fiunt, pharmaca resiccantia plerisque magis iuvant.
Quum autem resiccantia ipsa, partim quidem astring-
gant, cogendo astringendoq; substantiam eorum que
contingunt: partim uerò discutiant, & in hoc substan-
tiam eorum dissoluant: ob hoc ipsum sanē plures sunt
qui astringentibus indigent. Verūm si humida intem-
peries coeat cum frigiditate, læduntur qui per sola
astringentia curantur, quæ frigidæ facultatis existunt.
Quare merito plurima pharmaca per experiētiā in-
uenta, ex miscellanea materia constituuntur, astringēte
uidelicet atq; calfaciente: quorum omnium differen-
tiam cognosces, si simplicium pharmacorum faculta-
tes memoria teneris.

Confectiones stomachicæ Andromachi.

Stomachicę cō-
fectiones An-
dromachi.

Hieræ picre ua-
rię compositio-
nes.

Aloes lotæ &
illotę facultates.

Hiera ad stomachicos. Floris iunci odorati, xylo-
balsami, mastiches, croci, nardi Indicę, asari, cin-
namomi, sing. drach. vj. aloes lotæ, drach. C. Simul
trita repone, præbeq; ieiunis cochlearia. ij. Sunt tamen
qui ad aloes drach. C. singulorum aliorum, octo dra-
chmas adijciunt. Non desunt qui absq; flore iunci odo-
rati conficiant. Porro ad uentris subductionem illora
aloe est aptior: eloria autem multum de medicamen-
tosa ui amittit: quam etiam febricitantibus dare aliqs

possit, si febris sit ualde mitis. Infestissima autem est aloë, uel lota, ijs qui citra uitiosos succos in temperie affliguntur calida & sicca. Proximam ab his cladē percipiunt, qui siccam intemperiem habent, uel frigiditatem etiam implicitam: & in uniuersum, qui ex sola qualitate particulam aliquā affectam ac læsam possident. Etenim intemperantiæ in humoribus consistentes, pharmacis ipsas euacuantibus egent: quæ uerò absque his infestant, penitus commigrant in tabem, ob pharmacum huius ex aloë constantis exhibitionem. At ubi uitiosa humiditas perrigat uentriculi tunicas, hiera ex aloë est utilis. Omnino autē sic affectis plus aut minus adfunt nausæ quædam symptomata. Iam uerò purgatio quam aloë molitur, imbecillior est, quā ut uniuersum corpus purgare queat. Additur illi mastiche, ut uires eius refringat, uentriculo existens etiam grata, & odorata. Cinnamomum uerò, quum ob easdem causas, tum etiam ut partium suarum tenuitate aperire uentris meatus possit, extergereque atque attenuare si quid uiscosum aut crassum in humoribus insit. Crassos quippe succos ob purgatoriæ facultatis imbecillitatē aloë trahere non potest. Quapropter biliosarum uentris dispositionum optimum pharmacum est. Adhæc cinnamomum uim obtinet alteratricem uitiosorum humorum, in id quod naturæ modo respondet. Scire itaque licet, eas dispositiones quæ à prauis succis circa uentrē stomachumque oboriuntur, maximè per medicamenta ex aloë iuari: mirum autem in modum lædi, ab eduljjs, potionibus, & pharmacis astringentibus. Contra uerò, ubi humores non qualitate sed copia os uentriculi affluerint, utilissimus astringētium est usus, nimirum languida tunc existente ipsa particula affecta, instar laxatorum articulorum, quorum etiam per astringentia affectio corrigitur. Porro polychresta, siue multi usus medicamenta apparantur, quum unum habere uiginti

Aloë est infestissima ijs, qui citra uitiosos succos intemperie affliguntur calida & sicca.

Aloës usus, laborantes intemperie citra redundantiā humorum, delucit in tabem.

Hiera picra quibus utilis.

Hiera ex aloë est infirmior, quā ut totum corpus purgare possit.

Mastiche uentriculo grata.

Cinnamomi facultas.

Aloë biliosarum dispositionum uentris optimū est medicamentum.

Astringentia esculenta potulentaque maxime lædunt dispositiones uentriculi a prauis succis obortas: iuuant autē eas, quæ a multis, non prauis trahunt ortum.

Polychrestā,
hoc ē multi ut
medicamentā,
relinqui, ab iis
quæ ad singu-
las affectiones
pauantur.

Hiera Antipa-
tri faciens ad
stomachicos.
Stomachica
Galli,

Ventriculi tu-
moris humores
crassi altius im-
bibiti, qualia
medicamentā
desyderent.

Ventriculi fri-
gidam affectio-
nem significat,
prorsus nihil si-
tire.

Stomachica
ab Asclepiade
scripta.

Confectio ex
fructib⁹ Ascle-
piadis, subuer-
sioni ventricu-
li, cœliacis &
dysentericis fa-
ciens.

affectionibus cōgruum malumus, q̄ tot numero alia:
quā tamen ad singulas affectiones unum aliquod de-
stinatum eo quod ad plures paratum est, melius exi-
stat.

Ad stomatichos hiera Antipatri. Aloes ele-
ctæ, drach. iij. mastiches, drach. ij. asari drach. iij. rosa-
rum siccarum, iunci odorati, mei, phu, castiæ, sing. se-
munciam. Tritis utitor:

Stomachica Galli, affe-
ctionibus quæ calferi & siccari postulant, utilis.

Corricis radicis fœniculi, lib. S. aceti acris, sextarium
unum. S. aloes quadrantem. Mellis Attici, lib. j. Ra-
dices lotas ad triduum aceto macerato: deinde coqui
to, atq; ubi coctæ fuerint expressas proficito, & affuso
ad acetum melle, simul coquito. Dein aloem inspergi-
to, & cochlearia. iij. cum aqua dato. Etenim ubi per
profundum ventriculi, hoc est altius, copiosa, sed non
praua, fuerit defixa humiditas crassa simul & niscida,
opus est mistura pharmaci attenuatorij, perrosuiq;,
quale est tum acetum, tum oxy meli. Si uerò nec talis
sit humiditas, nec altius imbibita, sola ad curationem
astringētia suffecerint. Est autem sufficiens signū fri-
gidæ affectionis uētriculi, si æger se nō sitire p̄cipiat.

Asclepiadis stomachica, ad roborandum uen-
triculum, exprimendasq; illius aduen-
titias humiditates congruentia.

AD stomachi subuersiones. Nucleorum mali pu-
nici tusorum succi, sextarios. iij. succi mentæ, se-
xtar. j. mellis Attici rāundē. Coquito in fictili uase,
assiduè agitando, & ubi densata fuerint, ab igne ab-
lata reponito: porrigitoq; mystrum unum, aut. ij. an-
te cibum.

Confectio ex fructibus, ad stomachi
subuersionem, cœliacos, & dysentericos faciens. Ma-
la cotonea numero. x. sorba numero. L. mespila toti-
dem. Rhoeis rubri sextarium unū. Aquæ congios. viij.
fructus tusos & in aquā coniectos, diligenter coqui-
to: & ubi dissoluti fuerint, liquorē exprimito, ac rur-

sus coquito. Quum uerò tertia pars liquoris superfuerit, addito mellis Attici, lib. iij. & ad prunas assidue agitando coquito, ac spissata reponito.

Catapota ad subuersionem uentriculi. Rosarum recentium defectis unguibus, drach. viij. sem. papaueris albi, drach. iij. sem. hyoscyami, drach. ij. aloes, obolos. iij. asari tantundem. Cum aqua diluta in pilulas redigito, præbetoq; ciceris magnitudinem.

Ad ardorem stomachi catapotium restinguens sitim. Seminis fatiui cucumeris drach. viij. sem. portulacæ tantundem. Tragacanthæ, drach. iij. Tragacantham ouorum crudorum. recentium candido dissolutam, probè tritis reliquis addito, & ex eis mistis fingito catapotia, quorum assiccatorum in umbra, sub lingua unum tenendum dato. Hæc Asclepiades. In uniuersum autem fugienda ea pharmaca sunt in uentriculi affectibus, quæ chalcanthon, mandragoram uel, aut alia id genus recipiunt.

Ad uoluulosas stomachi subuersiones pastillus Amazonum ab Asclepiade scriptus. Seminis apiij, & anisi, utriusq; drach. vj. absynthij drach. iij. piperis, myrrhæ, opij, castoreij, sing. drach. ij. cinnamomi drach. vj. cum aqua pastillos fingito, & summum drachmam unam dato, stomachicis cum protropi diluti cyathis. iij. cholericis & uomētibus cibum, cum frigida: coeliacis & dysentericis cum baccarum myrti decocto: spleneticis, cum hydromelitos cyathis tribus. Ego uerò quòd myrrha aliquid medicamentosum cōtineat, sine illa maioris securitatis gratia hoc pharmacum præparare consueui, piperis quātitatem adaugens.

Porrò pereiusmodi uoluulosas dispositiones, aliquando stercus per uomitum redditur: ubi uidelicet particulæ affectæ, à serosis medicatisq; humoribus affliguntur magnopere. Quòd si etiam imbecilliores sint, geminatur malum. Erit itaq; in his curationis scopus, ut ad affectas partes odorata, admo-

Catapota ad subuersionē uētriculi.

Catapota ad ardorem uentriculi cōferentia, si sub lingua teneantur.

Ventriculo affecto fugienda eē ea pharmaca, quæ chalcāthon, mandragoramue recipiunt.

Pastilli Amazonum, ad uoluulosas uentriculi dispositiones.

Myrrhæ usum nō esse admodum tutum.

Voluulosas uētis dispositiones esse pōdorata curandas.

Graueolentia
subuertunt sto-
machum.
Absynthii fa-
cultas.

Cinamomi fa-
cultas.

Cassia licet uti
pro cinnamo-
mo.

Pharmacum
unū multis af-
fectibus opti-
mum, reperiri
non posse.
Convulsio fit
ob repletionē
simul & inani-
tionem.
Singultus a q̄-
bus fiat causis.

Singultui que
medeantur.

ueamus, cuiusmodi sunt anisum, apium, daucus, cu-
minum, & seseli. Nam quemadmodum graueolentia
omnia stomachum subuere solent, sic odorata cor-
roborare. At absynthium miscetur in prescripto phar-
maco, q̄ habeat uim extergendi, repurgandi, & subdu-
cendi uitiosos stomachi humores: quodq; cōstringat,
& denset, roburq; affectæ particlæ addat. Cinnamo-
mum autem foetidis omnibus, putrilaginosissq; humo-
ribus aduersatur. Cæterum si cinnamomum nō ad-
sit, licebit cassiam pro illo assumere. Alia Stoma-
chica Asclepiadis compositio, utilis ardorem sentien-
tibus, & ad intensos singultus, & stomachi uoluulo-
sas dispositiones. Costi, spicæ nardi, chrysobalano-
rum, rosarum uiridiū, mastiches, sing. drach. iij. aloes,
asari, utriusq; drach. ij. opij, drach. j. succo psyllij exci-
pito, atq; ad pastillorum formam reducito: obolosq;
tres exhibeto. Dictum mihi tamen iam est, impos-
sibile esse ut inueniamus phatmacum, ad affectiones
multas optimum: multoq; præstantius esse, quod sin-
gulis earum destinatur. Porro Hippocrates fieri con-
uulsionem prodidit ex repletionē simul & euacuatio-
ne: quemadmodum etiam singultum. Quanquam
hic aliquando excitari citra plenitudinem aut inani-
tionem solet, ubi uenterculus ab acribus, serosis, me-
dicamētosisq; humoribus mordicatur: quos ubi quis
uomitū eiecerit, singultu subitō liberat. Multi etiam,
deurato pharmaco dia trion pepereon, si uinum insu-
per bibant, omnino singultiunt. Similiter ex cibo in-
mordacem qualitatem corrupto, nonnulli singultiunt,
confestimq; à uomitū liberantur: ut alij ex rigore oris
uentriculi, corripuntur singultu. Verūm pueros ma-
ximè singultire contingit, tum ob alimenti corruptio-
nem in uentre: tum ob partis frigiditatem. In uniuersum
autem, uomitus est sufficiens medela eorum, qui
ob copiam, aut mordicationem singultiunt: ut calidi-
tas, eorum

tas, eorum qui ob frigiditatem. Ex medicamentis quæ
pharmacum illud constituunt, opium, rosæ, & psyllij
succus refrigerant. Spica nardi & chrysobalanus, di-
gerunt & corroborant. Asarum, per urinas deducit ui-
tiosos succos. Aloe prauos humores purgat. Crocus
concoquit & partes corroborat. Costus calfacit abun-
dē, astringitq; mediocriter. Stupefacientibus miscen-
tur calfacientia, ut eorum malignitatem corrigant,
eisq; sint instar uehiculi. Quippe uiuentium corpora
mortificationi simile quid perpetiuntur ab eorū me-
dicaminum usu, quæ ex opio, hyoscyamo, & man-
dragora constant: ita ut infestantes causas non sen-
tiant. Quare multi qui talibus assiduè utuntur, par-
ticulas ad immedicabilem frigiditatem perducunt.

Descripsit etiam Asclepiades Hieræ compositio-
nem, in hoc ab Andromacho dissidens, q̄ ille q̄dem
aloes drac. C. ac reliquorum sing. indiderit drac. vj.
hic autem octo drachmas scripserit: floremq; iunci
odorati omiserit, quem alijs miscuit Andromachus:
quodq; nō xylobalfamo (ut Andromachus) sed pro
illo sit carpobalsamo usus. Confert autem huiusce
modi pharmacū ijs qui ob uitiosos humores, & præ-
cipuè biliosos, tardè concoquunt. Siquidem quibus
bilis altius tunicas uentriculi infestat, q̄ præstantius
pharmacum non inuenient. Cuius moderata exhibi-
tio ad quatuor usq; drachmas extenditur. Similiter
auxiliatur uiscerum iam concoctis inflammationi-
bus. Rectè autem hoc pharmacum tardè cōcoquen-
tibus, aut bilē uomentibus propinatur ex aquæ cya-
this quaternis: ut ex aqua mulsa, ad uiscerum incli-
nantes inflāmationes: ac deniq; ex uino mulso, dum
aut urinas ciere, aut promouere menses est animus.
Aduerte autem nos appellare drachmam, quod Ro-
mani uocant denarium. Stomachicum dictum

Aster inexpugnabile, ab Asclepiade proditū, sedans

Crocus conco-
quit, & partes
corroborat.

Stupefacienti-
bus misceri cal-
facientia ut eo-
rum malignita-
tem corrigant,
eorumq; uires
deducant.

Hiera quibus
conueniat.

Hieræ modera-
ta exhibitio
ad q̄tuor dra-
chmas extendi-
tur.

Drachma &
denarius Ro-
manus est idē.
Stomachicum
Asclepiadis di-
ctum Aster in-
expugnabile

dolorem, inducens somnum, ac uarios affectus sanans. Myrrhæ, styracis, nardi Indicæ, calicis fistulæ, terræ Lemniæ, corticis mandragoræ, piperis, singul. drach. iij. Croci, succi papaueris, sing. drach. vj. seminis dauci Cretici, anisi, fœfelis, seminis apij, sing. drachmas. viij. Myrrha, styrax, & opiū, uino dissoluntur odorato, & teruntur: arida uerò cribrata miscentur, subigunturq; atq; in pastillos coguntur, quorum singuli drachmam dimidiam pendeant.

Quæ scripserit Archigenes ad affectus uentriculi.

Ventriculi affectib⁹ cōgruentia medicamentis ab Archigene prodita.

VBi ructus acidus editur, coriandrum cochlearij mensura edendum ante reliquum cibum dato: insuperq; merum bibendum. Ad exolutum uentriculum absq; febris, mentæ ramulum contritum bibendum dato. Aut œnanthen similiter tritā cum nardo Indica bibendam dato. Aut marrubij succum cum melle: & ubi paululum quieuerint, uinum cū polenta exhibeto. Aut Chiæ mastiches cochlearium ex aqua frigida dato. Aut glaciē ieiunis quotidie porrigito. Dolores oris uentriculi lenit, ac maxime ijs quibus tristitia aut desperatio accedunt, lac asininum, aut muliebre, aut bubulum, silicibus incoctis, potatum. Si unā cum humectatione uentriculi etiam inflammatio adsit, œnanthen cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato rosaceo, parum resinæ ustæ habente, imponito. Quibus autem ob atram bilem, quam gignūt, stomachus inflatione tentatur, spongas aceto acerrimo calido imbutas ad stomachum ipsum imponito. Quod si tensio adhuc perseueret, alumen liquidum cum atramento sutorio trito, melle exceptum imponas. Aut hæc & aloë pari portione mista, & myrteo cerato excepta. Aut artemisariæ bouis stercus aridum uino incoctum. Aut polij fasciculum coquito, & bibendū dato. Aut calaminthæ decoctū per noctem sub dio expositum,

modico melle & piperis drachma admistis, porrigito. Soluit autem dolores cuminum apiumq; tosta, si modica portione, cum aqua bibantur. Aut aloes obolos.ij cum uino mulso, aut uino, aut aqua, bibendos dato. Aut abrotoni & thymi, utriusq; obolos duos, ex uino prebe bibendos. Ligaturas in super extremorum fortiter adhibe, & circa ipsum sto machum cucurbitulis & somētis uarijs utere. Quod si uehemens sit distentio, etiā uenæ sectio efficax erit auxilium, & alui solutio per glandem suppositiciam.

Porro eos qui ex ingenti fame linquuntur animo reuocabimus odoramentis aceti aut pulegij, aut malis, aut piris. Excitantur etiam ad carnem suillam asfatam, & ad omnia quæ multum alunt, præsertim ea quæ nidorosum odorem exhibent. Instaurabis autem ipsos ijs quæ confertim uires reficere possunt: cuiusmodi sunt oua sorbilia, bulbi, cochleæ.

At singultientibus rutam cum uino dato, aut nitrum in aqua malsa, aut opium, aut castoriū, aut abrotonum, aut aristolochiam.

Medicamen ex cydoniorum succo, sanans mediocres oris uentriculi affectus.

Succi cydoniorum malorū, Sextarios.ij. Mellis Attici, tantundem. aceti sesquiseptarium: uel sextarium unum. Zingiberis quadrantem. piperis albi, vnc.j. Arida insperges, ubi malorum succus cum melle & aceto coctus ad mellis crassitudinem fuerit.

Quæ pharmaca Asclepiades scripserit ad affectus oris uentriculi.

EMplastrum ad subuersiones oris uentriculi, doloresq; atq; etiam inflammationes. Oenanthes, drach.vj. croci, myrrhæ, floris rosarum, meliloti, mastiches, aloes, corticis mandragoræ, singul. drach. iij. Carnis palmularum, quadrantem. Omnia cerato ex rosaceo confecto excipito, admouetoq;.

Aliud Nicerati, cœliacis, dysentericisq; admodum genero-

Cucurbitulas admoendas esse dolenti uentriculo monet Archigenes.

Deliquium animi patientes ex fame insigni, quomodo sint reuocandi.

Singultientibus quæ opitulentur.

Dia cydoniorum medicamen.

Oris uentriculi affectib⁹ pharmaca ab Asclepiade scripta.

sum. Oenāthes vuc. ij. rosarum siccarum, mastiches, aloes, gallarum omphacitidum, aluminis rotūdi, acaciæ, sing. vnc. j. ceræ lib. j. picis brutiæ quadrantem. olei myrtei, lib. j. Arida committito liquidis.

Aliud ad eadem insigne. Oenanthes, omphacij, galle omphacitidis, aluminis scissi, acaciæ, cytinorum mali punici, balauſtij, mastiches, sing. vnc. j. Vini myrtitis, quantum satis est his subigendis. Carnis phœnicobalanorum, sexuncem, exceptis lentiscino cerato utitor.

Stomachica
medicamenta
debent habere
aſtictoria uim
præpollentem,
Hepatica me-
dicamenta mi-
ſta eſſe debent
ex aſtringenti-
bus & relaxan-
tibus.

Malagma diſ-
ſoluens hepati-
ſtis & duri-
ties.

Nili crocerum.

Malagma Hie-
raticon ex m-
liloto, uifcerum
doloribus ac-
comodatam.

Malagma po-
lyarchion.

Etenim in his, q̄ ſint ſtomachica, meritò aſtictoria uis dominatur. At in medicamentis hepaticis relaxantia miſceri aſtringentibus debent: quemadmodum ſit in his quæ iam ſubdam, etiam ab Aſclepiade prodita.

Malagma Nilo inſcriptum, faciens ad præcordiorum dolores, diſſoluensq; omnē durtiem, ſpleneticis atq; hepaticis maximè ſalutare. Ceræ, ammoniaci thymiamatis, olei cyprini, ſing. lib. j. croci ſemunciam. aceti quod ſit ſatis. Ammoniacum diſſoluito; deinde arida adijcito.

Aliud Nili crocerum prædictis affectionibus accommodatum, faciens etiam ad eryſipelata.

Ammoniaci thymiamatis, ceræ, roſacei, ſing. lib. j. croci, vnc. j. aceti quod ſit ſatis. Conſcito.

Malagma ex meliloto, Hieraticon dictum, ad uifcerum dolores accommodatum.

Nardi Celticæ, cyperi, myrrhæ, ſing. drach. x. cardamomi drach. viij. meliloti drach. xl. croci, amomi, utriuſq; drach. viij. cypheos ſacriſiculorum, drac. xvj. ammoniaci thymiamatis, drach. xl. reſinæ terebinthinæ, drach. viij. ceræ minam unam. olei Cyprini, drac. cxx. Vini odorati Italici, heminam. j. præpara, & utere.

Malagma Polyarchiō, peripneumonicis, ſtomachicis, lienofis, hydropicisq; maximè ex uſu, faciens etiam ad affectiones circa ueſicam aut uterum, ad omnemq; neruorum per conſenſum affectionem Cere, terebinthing, bdellij, ammoniaci thymiamatis, carda-

momī, cyperi, sing. minam unam. meliloti, a momī, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinamomī, sing. drach. xxv. olei cyprini heminam. j. Vini Italici quod sit satis. Conficito & utitor. **Malagma An-**
dromachi ex meliloto. Nardi Celticæ, cyperi, iridis Illyricæ, myrrhæ, sing. drach. viij. croci drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis drach. L. terebinthinæ tantundem. ceræ drach. C. Cyprini heminæ dimidium. Aceti quod sit satis.

Malagma An-
dromachi ex
 meliloto.

De hepatis affectibus & facultatibus.

PLeriq; Idiotæ quemadmodū stomachicas, sic hepaticas affectiones, uocant complures dispositiones iecinoris, tametsi maximè inter se contrarias: hoc est sub eodem genere plurimum inter se distantes. Non peccauerit autem quispiā dicens, propemodum omnia contraria eidem esse generi subdita. Cæterū contrariorum notio contingit, ubi plurimum inter se distant. Atqui plurimum in quoq; genere utrinq; distant à medijs extrema. Porro ipsius imbecillitatis iecinoris licebit nobis unicā assignare dispōnem, ceu causam: nēpe intemperie: quæ quidem quum in octo intēperātijs distribuatur, rursus non malè dixerō, intemperiem ipsam non unā, sed octo dispositiones existere. Adhæc iuxta aliam sectionem duæ intemperierum differentiæ fiunt: ac iuxta aliam tres: dum uidelicet aut secundum qualitates tantū alterantur partes affectæ: aut accedente etiā humorum affluxu, qui aut spatia tantū occupent in particulis affectis contenta: aut etiam substantiam ipsarum imbuant. Igitur circa uentrem & intestina quidem, una in singulis cavitates est, quæ possit uitiosam humiditatem suscipere: circa hepar autem, tot numero sunt, quot habentur arteriæ & uenæ. Etenim quum hæ omnes oscula angusta possideant, qua parte huius uisceris sima, cum gibbis coeūt, obstructions ab illis uitiosis suc-

Contraria esse
 quæ sub eodē
 genere plurimum
 inter se
 dissident.

Extrema plurimū
 utrinq; distant
 a medijs
 in quoq; genere.

Hepatis imbecillitatis
 intemperies est causa.

Intemperies est
 octuplex.

Hepatis obstructions
 fieri quæ
 parte eius sima
 cū gibbis coeunt.

cis aliquando oboriuntur, breui in frigidis intemperaturis: ut temporis progressu in calidis: ad quas tandem obturationes putrefactio cōsequitur. Quum autem hoc uiscus tot facultates fortiaſ, quot actionum species, contingit sæpe unam ipsarum præcipuè lædi, sæpe duas & tres, atq; omnes quatuor simul. Est itaq; actio ipsius una quidem, ad se cibū & alimentum attrahere: altera uerò, ambire, cōtinereq; donec alterās ipsum, suūpsius illud partem efficiat. Atq; hæc sanè dicitur alteratrix facultas, inter alias principalissima existens, & cui ferè primæ debentur partes.

Hepatis facultates.

Alteratrix facultas hepatis est inter alias principalissima.

Facultates quatuor naturales inesse cunctis, q̄ diu uiuunt, corporis partibus.

Hepatis lāgūde ab intestinis trahentis symptomata.

Quæ uerò iuxta hanc alterationem remanent excrementa, ea per excretricem facultatem exterminantur. Ostensum autem est has quatuor facultates, uniuersis, quādiu uiuunt, inesse corporis partibus. Vocatur autem alteratio ipsa, donec alimentum parti quæ nutritur assimiletur, concoctio. Vbi uerò iam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex uentre & intestinis alimentum trahere non potest, liquida per sedem, & nondum exquisitè excucata excernuntur: simulq; cruda, si etiam cum hoc uiscere uentriculus imbecillus existat. Si uerò traxerit quidem alimentum hepar ex uentre simul & intestinis: in sanguinem autem ipsum nequeat conuertere, ob facultatis languorem: quemadmodum in uentre multiformis corruptio contingit, eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepar. Est enim peior transmutatio in peregrinam qualitatem, iuxta cruditatem facta: moderatior uerò, in qua alimentum diu propriam naturam retinet, nullam dum alterationem indeptum. Atqui & tertia præter has, species frustratæ concoctionis existit, ubi semiconcoctum alimentum relinquitur. Ac per hanc sanè dispositionem, quæ ab hepate dericiuntur, referunt prorsus aquam, in qua uictimæ recens mactatæ carnes ablutæ fuerint. Au-

Mutationē ciborum per cruditates in peregrinam qualitatem, esse aliarum omnium deterrimam.

Hepate imperfecte mutante chylum in sanguinem, qualia excrementa excernantur.

cto autem affectu, nihil tale amplius excernitur, sed multiformes aliæ qualitates, consistētēq; expurgantur, ueluti à uentre dum cruditate laborat. Calida igitur intēperies si uiscus affligat, colliquationes accidunt, primū quidem, humorum: dein carnis ipsius hepatis: deſciturq; bilis crassa, graueolens, atq; admodum colorata, quemadmodum contingit in pestilentibus febribus. Si uerò frigida intemperies præpoleat, neq; assidue excretionēs, neq; multæ fiunt: durat tamen affectus diutius, & per aliquos dies profuit ipsis uenter confertim magis: neq; fœtor excrementorum similis est ijs quæ ex calore sunt liquefacta: neq; color aut consistentia similis: uerū minus graueolentia ab his excernuntur, speciem putrefacti sanguinis, non colliquatae carnis, habentia. Aliquando uerò id quod deſcitur, nigrum sanguinem refert: diligenter tamen cōsyderanti, nec sanguis niger est, nec grumus, sed ueluti limus quidam sanguinis crassus, qui propè ad atram bilem accedat: in summa, plures, ægrēq; iudicabiles colores circa huiusmodi affectionem cernuntur in alui excrementis.

Hepatis intemperie calidam quæ sequantur symptomata,

Hepatis frigidae intemperie signa & symptomata,

SCOPVS igitur curationis in huiusmodi affectibus, communis quidem sit iuxta contrarietatem intemperantiæ: peculiaris autem unicuiq; per cuiusq; contrarietatem. In uniuersum autem, affectio hepatica peculiariter appellata, ueluti etiam coeliaca, stomachicaq; citra tumoris præter naturam circa ipsas partes ortum, contingit. Si quidem quum citra manifestum aliquod in uiscere malum, in actionibus proprijs languescit hepar, tunc ægrum uocāt hepaticum.

Hepatis intemperantias, per contrarias sanandas esse.

Hepatici proprie dicuntur, quibus citra malum insigne, hepar in functionibus proprijs languescit.

Quæ pharmaca ad hepaticos ab Andromacho sint conscripta.

Antidotus cyphoides, ad hepaticos et omnia thoracis uitia. Vux passæ carnis, drach. xxv. croci drach. j. calami drach. ij. S. bdelli, tantundem, cassiæ

Hepaticis remedia cōgruentia ab Andromacho scripta,

Putrefactiones
que corrigant.

Vux passæ fa-
cultates.

Viscerū intem-
perantiis ea ef-
se optia phar-
maca, quæ nō
modo intēpe-
riem corrigūt,
sed etiam ali-
mētum largiuntur.

Vini facultas.

Mellis facul-
tas.

Bdellium.

Terebinthinæ
wires.

Hepaticū phar-
macū nullum
esse debet ue-
hementer refri-
gerans.

sesquidrachmam, cinnamomi obolos. iij. spicæ nardi drach. iij. floris iunci odorati, drach. ij. S. myrrhæ, terebinthinæ, sing. drach. iij. ramētorum aspalathi, drac. ij. mellis drach. xvj. uini quod sit satis. Conficito. Et enim cinnamomum omnes putrilaginosas, uirulentasq; corrigit facultates: quæadmodum cassia, & post hanc omne aromatum genus. Crocus astringens & cōcoctorium pharmacum, etiam putrefactiones corrigit. Vux passa astringit quidem quantum requirit affectum uiscus: habetq; uim aliquam concoquēdi crudos humores, & coercendi maligna, existens etiam secundum totam substantiam iecori familiaris.

Quippe ad intemperantias uiscerum ea pharmaca optima sunt, quæ præter quàm quòd intemperiem corrigunt, etiam alimentum largiuntur.

Quo nomine uinum conuenientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut intēperiem calidam, laborantibus. Nam & nutrit, & concoquit, & roborat, & putrefactioni aduersatur, & si in temperies ab humiditate & frigidityte proficiscatur, eam citra omnem molestiam, atq; tutò, persanat. Eadem est & mellis facultas, præter q̃ quòd non condensat substantiā contacti corporis: sed pro hoc uim extergendi, & aperiendi, & pueros reddendi meatus, urinamq; ciendi, nō parua sanè auxilia, possidet. At bdellium sufficienter emollit, concoquitq; necnon moderatè discutit. Consimilem fermè uim terebinthina sortitur, supra hoc quòd angustos meatus extergit, expurgatq; quibus auxiliis uiscus curandum indiget. Siquidem obstructio meatuum solet putrefactiones efficere. Nōnulli autem huiuscemodi pharmacis opium, aut hyoscyamum, aut aliud quippiam refrigerantium miscendo, ad calidas intemperies uilia medicamēta efficiunt: quanq̃ ex hepaticis pharmacis nullū esse debet uehementer refrigerans. Alia ad hepaticos &

Ictericos. Amygdalarum amarantharum, drach. ij. anisi, absynthii, cumini, seminis apii, sing. drach. j. cornu cerui, obolos. iij. Trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eis q; unū mane ac uesperī, cum uino mulso dato.

Hepatica Athanasia, ad nephriticos & ictericos, copiose sudorem promouens. Croci, drach. ij. nardi tantundem. cinnamomi, cassiæ myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. j. Melle Attico excipito: datur fabæ ægyptiæ magnitudine: febricitantibus ex aqua mulsa.

Potio ad hepaticos, spleneticos, nephriticos, hydropicos, stomachicos q;. Auxiliatur etiā molestiis ex partu, & cōuulsis. Prodest & cōualescentibus: nec non ad humores uitiosos, ictericos, tusientes, pleuriticos, nec non ad letalia uenena, & ferarum ictus. Nardi Indicæ, costi, utriusq; drach. ij. cassiæ, croci, utriusq; drach. j. piperis albi, obol. v. seminis apii, drach. j. obolos. iij. iridis Illyricæ, tantundem. acori drach. j. obo. j. opobalsami, drach. j. succi ari masculi, drach. iij. uuæ passæ exacinatæ, drach. vj. Terito cum passo: aut melle excipito: ac drachmam unam cum uino dulci dato, aut cum aquæ mulsæ cyathis. iij. Nullum tamen horū medicamentorū calidis intemperaturis cōuenit, sed aut humidis, aut frigidis, aut ex utrisq; compositis.

Confectiones hepaticæ ab Asclepiade prodiit. Succus cichorii cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus, & mellis Attici cochleari uno, porrigito.

Aut filicis, aut seridis succi cyathum unū cum aquæ mulsæ cyathis tribus dato. Porrò cichorium & seris ex genere cibariorum existunt. Facultas autem ipsorū subfrigida & subamara est, moderate q; astringēs: quarum qualitarum ratione, calidis hepatis intemperatiis summè conueniunt. Nam ultra hoc q; moderatè refrigerant, uisceri firmitudinem addunt. Sed nec frigidas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum que frigidam humiditatem absq; astrictione aut amaritu-

Ictericis opti-
mū medicamē

Athanasia he-
patica, nephri-
ticis ictericisq;
conueniens, co-
piose sudorē p-
mouens.

Potio hydro-
pi, aliisq; inte-
rancorum affe-
ctibus summe
utilis.

Hepaticæ com-
positiones ab
Asclepiade scri-
ptæ.

Cichorium.
Seris.

dine possident, facere solēt. Iam, ob miscellam mellis, humores per urinas eliciunt. Quare si siccata & tusa quis potioni inspergat, itidem iuuant. Ad uisceris autē expurgationem, apertionemq; meatuum, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, filix optimum pharmacum est, amaram qualitatem habēs prædominantem.

Hepaticum catapotion.

Catapotion hepatices. Radicis chamæpityos, drach. viij. rad. cichorii, drach. iiij. contunde, & excipe melle cocto, præbeq; nucis ponticæ magnitudinem: & aquæ calidæ cyathos. iiij. insuper bibendos dato.

Hepaticus pastillus.

Pastillus hepaticus. Anisi, sem. apii, asari, amygd. amar. mund. absynthii, sing. drach. iiij. macerata ex aqua in pastillos redigito: exhibetoq; drachmā. j. cum uini diluti cyathis. iiij. febrientibus tamen cum hydromelite.

Hepaticum eclegma.

Eclegma hepaticum Paulini: auxiliatur confestim. Chamæpityos siccæ, lib. j. myrhæ, vnc. j. passi protropi, sextarios. iiij. Chamæpityn & uinum dulce coquito ad tertias. Postea liquorem exprimito, eiq; mellis Attici libram dimidiā adicito, ac rursus coquito. Dein uerò myrrham addito assidue agitando: quæ ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mystrum propinato.

Adhæc cochlearum trium carnem probè tritam, & cum tribus uini nigri cyathis calfactam porrigito. Hæc enim iuxta totam substantiam sunt efficacia: non secundum unam aut alteram qualitatem. Similiter & lupini hepatis drachma una læuigata cum uino aliquo dulci, exhibitaq; manifestè hepaticis auxiliatur.

Hepar lupi auxiliatur hepaticis.

Diureticum medicamen.

Confectio ciens urinas. Facit ad induratas hepatis affectiones, ad spleneticos, & ægrè se à morbo recuperantes: nec non ad hydropicos. In uniuersum, probum colorē cōciliat. Croci, nardi, cassiæ, sing. drach. ij. costi, floris iunci odorati, cinnamomi, myrrhæ stactæ, sing. drac. j. mellis cocti, drach. xxvj. datur fabæ Ægyptiæ magnitudine, cum uini mulsi cyathis. iiij. Alia, eadem

commoda præstans, ad aliasq; internas affectiones, citra tusim, conducens. Rad. gentiane, chamæpityos, marrubii, seminis petroselini, fellis ursi, sinapis, sem. cucumeris, scolopendrii, panacis, rubrici sinopice, rubig, seminis brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spice nardi, costi, sem. eruce, eryngii, baccarū iuniperi, sem. fraxini, chamædryos, dictamni Cretici, seminis cestri, sem. dauci, sing. vnc. j. mellis Attici quod sit satis. Confito. Datur nucis ponticæ magnitudo, ex passi Cretici cyathis duobus.

Hæc Asclepiades ad indurata viscera. Miscenda tñ in hisce affectibus sunt cum discutientibus etiam mollientia pharmaca, quæ præparent indurata corpora, aptaq; prædictis medicamentis excipiendis efficiant. Siquidem citra præmollitionem diffunduntur quodammodo ea ipsa corpora, & euestigio manifestam imminutionem habent: sed quod reliquum ex affectu est, ubi exiccatum improbè fuerit, immedicabile permanet. Ceterum quum hepatis corpus sit consistentia humidū, moderatis emollientibus eget.

Quæ Archigenes scripserit ad hepaticos.

Vnguenti nardini cochlearia. iij. quotidie bibenda dato, & maximè in induratis. Aut aristolochiæ obolos. iij. ex aqua quidem, febrientibus; febre autem carentibus, ex uino porrigito. Aut fel ursinum in uase leniter feruefacito, & in sole assicato, atq; ex eo hepaticis cochleare unum dato.

In magna duritia abrotoni succum q̄ crassissimum da bibendum. Aut acori obolum unum: panacis tantundem, propinato ex aqua.

Aut spice nardi decoctum assiduè exhibeto. Cataplasma hepaticū fit ex malis cotoneis cum farina hordeacea, & fœnogræco concoctis. Aut ex semine lini trito cum polenta uino incocta. Aut ex capparis radice in aceto mulso percocta. Aut ex farina hordeacea cum ficibus. Aut ex palmularum carne tusa, mistaq; pari rosacei cerati portione. Malagma

Discutientibus medicamentis quæ ad indurata viscera propinantur, cur miscēda emollientia.

Hepatis corp⁹ moderatis emollientibus eget.

Hepatica medicamenta ab Archigene scripta.

Hepatica cataplasmata ex quibus conficitur.

Hepatica ma-
lagmata.

Andromachi ad hepaticos. Ammoniacy thymiamatis drach. cxliiij. bdellii drach. xxiiij. aceti heminas. iij. Cyprini heminam. j. Conficito. Malagma Apolophanis. Cere drach. lxxx. ammoniaci thymiamatis, tantundem. Terebinthine drach. xl. manne thuris, tantundem. Cum irino contundito.

G A L E N I P E R G A
M E N I D E C O M P O S I T I O N E
M E D I C A M E N T O R V M S E C V N
dum Loca, Liber Nonus.

De Ictericis.

Ictericæ per
morborum iu-
dicationes or-
ta, curatio.



I V N T etiam icterici, ratione optimæ iudicationis in febribus, prouente nimirum ad cutem bilioso humore: ac faciliè sanè hi curantur balneis potabilium aquarum, & olei discussorii affrictu, omniumq; rarefacientium cutè: quale est anethinum oleum, chamæmelinum, atq; cicinum. Post hæc etiam unguenta faciunt, gleucinum, & comaginum: dein irinum atq; amaracinum. Verùm alias confectiones priuatim ictericas appellatas, ne putes ad huiusmodi ictericos cõuenire, sed ad eos, qui uasorum iuxta hepar obstructio ne laborant: nec non ad illos qui ex inflammatione icterici fiunt. Cæterùm qui in regium morbum ex obstructione inciderunt, absq; febre permanēt. Qui uerò ex inflammatione, omnino febricitant. Quæcunq; igitur admodum medicamentosa existunt, iidemq; facultate calida, febrientes magnopere lædunt. Talia sunt gētiana, struthion, helenium, costus, aristolochia, poliū, centaurea. Conueniunt autem ictericis ex inflamma

Ictericia ex ob-
structione orta
absq; febre p-
manet, quod
non contingit
illiquæ ab in-
flammatione du-
cit originem.

to hepate, quæcunq; sanant inflammationes: quemadmodum etiam iis qui ex obturatione, omnia quæ strenuè extergent, etiam si medicamentosam substantiâ, calidamq; facultatem sortiantur. Si uerò obstructio si- mul & inflammatio coeant, laxantibus simulq; extergentibus opus erit.

Ad ictericos absq; feбри, medicamen Andromachi. In colocynthidis calicem uinum fundito, calfacitoq; & bibendum dato. Subducit enim aluum. Aliud Adianti obolos. iij. nardi obolos. ij. absynthii drach. j. myrrhe obolos. iiii. Passo excipito, instarq; auellane nucis ex aqua cyathis duobus porrigito.

Asclepiadis remedia ad Ictericos. Cichorii succi cyathos. vi. Febrientibus per se dato: febre uerò carentibus, cum uini cyathis tribus.

Aliud. Anchuse tenuissimè tritæ cochlearia. ij. cum aqua potabili exhibe.

Aliud Nicerati urinam ciens. Cicerum siccorum sextarium. j. roris marini, manipulum. aquæ sextarios. vi. feniculi manipulum. j. rad. asparagorum palustrium, manipulum. j. Decoctum excolatum porrigito assiduè, febrientibus quidem, simpliciter: feбри autem carētibus, ex uino diluto.

Aliud. Asari, absynthii, utriusq; drach. viii. seminis anisi, feniculi, apii, amygdalarum amararum repurgatarum, sing. drach. iij. Aqua subigito, atq; pastillos formato: ex quibus drachmam. j. cum uini mulsi cyathis tribus non febrientibus exhibeto.

Errhinon trahens bilem per nares. Nasturtii & roris marini uiridium succum, aut elaterium cum lacte muliebri tritum, infundito naribus, atq; attrahere iubeto.

Archigenis remedia ad ictericos. Chelidoniæ herbæ succum cū uino aut aqua mulsa propina. Vel adianti, uel rubiæ radicis obolos. iij. cum aqua mulsa exhibe. Aut felis ursini cyathum bibendum dato. Aut stercoris canini albi sextantem, cum mellis quadrâte ad triduum bibendum dato.

Aut adianti, & mentæ, & rubiæ

Ictericis quæ medicamenta conueniant.

Ictericorum remedia varia, a diuersis conscripta.

Errhinon trahens bilem per nares.

parem mensuram in aqua feruefacito, & heminā inde bibendam exhibeto, diutius ad solem insolato, sitienti; & anheloso, quo post acceptum potum exudet. Quippe statim transmutat colorem.

De splenis affectibus.

Partes singulas familiare sit i alimentum trahere.

Lienem ali a sanguinis sedimento.

Lien cur induretur facile.

Lieni affectio qualia conueniant medicamenta.

QUum autem omnes corporis partes familiarē sibi ipsis ex uenis humorem trahant, lien certē id quod ueluti fex sanguinis est, ex qua gignitur atra bilis, ad sui alimoniam asciscit: unde hoc uiscus minimo negotio contrahere sibi scirrhum est natum, sanguine nimirum in uenis ipsius obturato, et ob crassitudinem nec excerni, nec discuti facilē potente. Attenuatibus igitur opus habet pharmacis, citra manifestam caliditatem, ne impactus in ipso succus impingatur uehementius. Quo uerō actiones ipsius cōseruentur, ex austeris aliquid eis admiscetur: quale etiam astringentium genus existit. Porro quum uniuersæ particulæ, propriæ incolumitatis gratia, certas quasdam facultates possideant, attractricem uidelicet familiarium, ac tum aliorum expultricem, tum assimilatricem eorū quæ sibi attraxerunt, aliquibus ipsarum insuper inest, ut ex accidenti sint uniuerso corpori ex usu. Ex horum itaq; est genere lien, qui ex hepate ad se ueluti limum sanguinis trahit, quē admodum fellis uesica bilem: atq; renes urinam. Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinem ad se attrahere sit minimē potens, per uniuersum corpus uitiosus humor dispergitur. Ob id itaq; naturalē ipsius firmitudinem custodire oportet, quo conueniēs sibi alimentum alliciat, per quam actionē uniuerso corpori ad humorum bonitatem conducit, & excrementa genita in ipso demittere in uentrem potest, ut unā cū excrementis alui excernantur. Igitur hac ratione ipsi ualde amara medicamēta exhibemus: quibus miscemus etiam ex austeris nonnulla: sicuti & alia quædam, ceu materiam congruentem ad unguentorum & cataplas-

Liene trahēte languide, fæculentus sanguis p̄ uniuersum corpus dispergitur.

Lieni cur amara, qbus astringentia sint mista, medicamēta conueniant.

matum cōpositionem; cuiusmodi sunt cēra, resina, pīx,
& bitumen. Nam primaria ratione acetū & oxymeli,
uisceri cōmoda existūt, utpote secare et attenuare cras-
sos humores ualentia, citra calfactionem. Deinceps
itaq; eorum pharmacorum mentionem faciam, quę lie-
ni indurato auxiliantur.

Pharmaca potabilia ab
Andromacho ad spleneticos cōscripta. Potio Antipa-
tri. Carnis myrobalani, drach. iiii. scolopēdre, drach. vi.
cort. rad. cap. costi, sing. drach. iiii. chamēdryos, drach.
vi. polii drach. ii. rad. cotyledonis, drach. η. corymbo-
rum hederæ nigræ, grana. xxv. ammoniaci thymiamatis,
drach. iiii. sem. hyperici drach. η. chalbanū tantū dē.
sem. periclymeni drach. j. aut rad. drach. iiii. cardamo-
mi nigri sesquidrach. succi scillæ, drach. xvi. Dantur
oboli duo in aceto mulso.

Aliud stomachicum;
splenicumq;. Myrrhæ, nardi Indicę, cort. rad. cap-
paris, radicis panacis, rad. peucedani, dictamni, cort.
rad. periclymeni, sing. drach. iiii. costi, drach. v. polii
drach. η. rubiæ drach. iiii. S. ammoniaci thymiamatis,
drach. iiii. S. iridis tantū dē. Excipito aceto mulso, da-
toq; obolos duos cum oxymelite.

Pharmaca po-
tabilia ab Asclepiade ad splenem cōscripta. Cyno-
glossi manipulum cum uini cyathis. iiii. terito, & expres-
sum liquorem ante cibum bibendū dato. Colligere ta-
men opriet herbam sinistra manu ante solis exortum.

Aliud. Trixaginis manipulū cum uini sextario uno
coquito, & expressum liquorē reponito; atq; ex eo cya-
thos. η. ante cibum dato.

Catapotium splenicū.
Myricæ fructum tusum & cribratum chalbano exci-
pe, in catapotiāq; redige, quæ exhibebis pro uiribus.

Pastillus splenicus. Fructus ericæ drach. iiii. pi-
peris albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis,
sing. drach. η. arida tunduntur & cribrantur. Ammo-
niacum dissoluitur aceto scillitico, & aridis additum in
pastillos cogitur, quorum singuli pendeāt drachmam.

Lieni congru-
entia pharma-
ca, Androma-
cho scripta.

Lieni pharma-
ca ab Asclepiā
de scripta.

Daturq; drach. j. ex oxymelitis cyathis. iiii.

Lieni epithemata, cataplasmataq; ab Asclepiade scripta.

Epithemata & emplastrata eiusdem Asclepiadæ. Foliolorum tenerrimorū sabuci arboris, lib. iiii. aloes, lib. j. cum aceto subigito, & linteolo infarcta admoueto.

Vel. Cera, resinæ pinus, & frictæ, sing. lib. ij. arsenici, aluminis scissi, calcis uiuæ, sing. sextantem. aceti, olei, utriusq; cyathos. viii. conficito & admoueto.

Malagma Antiochidis, ad spleneticos, hydropicos, ischiadicos, arthritricosq; conueniens. Cere lib. iiii. resinæ terebinthinæ, tantundem. retrimentorū ab expressa myrobalano reliquorum, spumæ nitri, floris lapidis Asij, ammoniaci thymiamatis, sing. lib. j. olei Cypri, lib. iiii. Aceti quod sit satis ad ammoniacum dissoluendum.

Malagma aurei coloris. Auripigmenti, vnc. j. aluminis scissi, calcis uiuæ, sing. sextantem. Cera, resinæ frictæ, & pinus, sing. lib. ij. myrrhæ sextantē. Arida increta, leuigataq; per affusionem aceti cyathorum. viii. liquidis excipiuntur. Pharmaca ad spleneticos ab Archigene scripta. Potus sit aqua quæ ferum candens extinxerit: sola quidem, febrientibus: uino autem immista, iis qui febre carent.

Lieni pharmaca optima ab Archigene scripta.

Aut corticis radicis periclymeni, & seminis eius, quantum tribus digitis apprehendi possit, in uino albo meraco calido, ieiunis curriculo xl. dierum bibendum dato.

Aut uulpis hepatis siccum ex oxymelite propinato.

Lienosis eadē cataplasmata opitulanti, quæ hepaticis.

Aut folia capparis arida & trita exhibeto. Cataplasmata autem eadem splenicis quæ hepaticis admouebis: ampliusq; cinerem ex ferraria officina cum aceto.

Aut nasturtium & scœnum græcum, & calcem uiuā, & nitrum, cum melle emollita imponito.

Lieni, si malū sit pertinax, cucurbitulas effigendas esse, cū scarificatu.

Aut fecem acris aceti, aut capparis radicem cum aceto imponito.

Perseuerante malo cucurbitas cum scarificatione affigito. Aut uenā retro sinistram aurem secato, & detracto sanguine confricato affectum lienē.

Remedia ad hydropem ab Asclepiade scripta.

Malagma

M Alagma Ipoterium, resorbens humiditates ab alto, simulq; duritias discutiens. Ceræ, picis aridæ, utriusq; lib¹. liquidî, sulfuris uiui, mannæ, nitri rubri, sing. lib. j. resinæ frictæ, lib. iiii. olei ueteris, heminam. j. Arida liquidis permisceto. Malagma ex baccis lauri ad eadem. Ceræ, resinæ pinus, picis brutæ, baccarum lauri siccarum, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini subacti, sing. lib. j. Liquefcebilia liquentur, & frigefacta misceantur aridis redactis in tenuissimum pollinem. Emplastrum tōsorîs, ad splenicos & hydropicos, quo etiam ischiadicos liberauit. Picis aridæ lib. iiii. ceræ, resinæ pinus, ammoniaci thymiamatis, nitri rubri, baccarum lauri aridarum, sing. lib. ij. adipis taurini lib. j. iridos lib. ij. canchryos, vnc. xviii. farinæ fœnigræci, polinis, radicis chamæleonis nigræ, tenuissimè trite, singul. sextarium unum. cumini tenuissimè triti, sesquiseptarium. passi sextar. j. Conficito & utitor.

Cleophanti cataplasma ad hydropicos. Ceræ, resinæ, spumæ nitri, sing. drach. C. chalbanî, propolis, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. S. cyprini, cyathos. ij. aceti tantundem. ꝑficito cataplasma. Archigenis remedia ad hydropicos. Stercus bouis armentariæ tritum, coctumq; in posca, inspersaq; sulfuris uiui quarta portione, redigito in cataplasma, idq; toti uentri admoueto.

Aut elaterii, staphidis syluestris, hyssopi, fellis taurini, æquales omnium partes sicubus contulis excipiens, mulsaq; læuigans, similiter applicato.

Aut ueratrum nigrum, fel taurinum, nitrum, piperq; ex æquo mista, melleq; excepta, per semihoræ rempusculum uentri imposito. Per omne autem curationis tempus, Cotyledonis, scillæ aridæ, sing. drach. j. in uino mulso diluto quotidie exhibe.

Aut corticis rad. ari, similiter drach. j. Aut radicem calaminthæ coctam propina. Ad hæc hydropicos diutius ad solē, sed

Hydropicis cōgruētia malagmata ab Asclepiade scripta.

Hydropicis remedia ab Archigene scripta.

Hydropicos esse sub ardenti sole fricandos oleo falfugino fo, perfundendosq; muria: necnon talos illis scarificandos.

contecto capite inungito ex oleo, cui multum salis admistum sit: ex multaq; perfundito falfugine calida. Inflatos uerò maximè locos, uesticis magnis probè inflatis quotidie continenter pulsato. Incisis item, aut scarifcatis ipsorū talis, & uulnusculis impactis, in ferculo ipsos aut lectica circumuehito. Summè etiam faciunt Theriacæ omnes urinam cientes, insuperq; potiones aquam ducentes.

De pharmacis dolorem sedantibus, anodynis & colicis appellatis.

Anodynis uti quibus de causis solcamus,

Huiuscemodi pharmacis, ob dolores ingentes, aut uigilias, aut ne per uiolentam tusim lancinemur, uti consueuimus. Ad quas quidem affectiones, si modicæ sint, confectiones ex seminibus, priuatim tus siculares dictæ, sufficiunt: quæ & ipsæ aliquid ex soporiferis seminibus possident, uerùm modicum inter multa adeò semina, quæ odorata, & tenuiū partiū, ac urinam mouētia existūt. Cuiusmodi sunt cuminū, daucum, selsi, apiumq; & anisum.

Philonis antidotus ad graues interaneorum cruciatus conferens.

Philonis Antidotus, ad omnes graues dolores uiscerum, ad aliaq; multa conueniens. Croci, drach. v. pyrethri, euphorbi, spicæ nardi, sing. drach. j. piperis albi & hyoscyami, utriusq; drach. xx. opii drach. x. Melle Attico excipito. Etenim opium ualidissimum est inter ea quæ sensum stupefaciunt, atq; soporem conciliant. Operatur autem hæc, etiam solum sapa dilutum, tomentoq; exceptum, ac sedi inditum, necnon illitum fronti & naribus. Si uerò

Opii uires.

Opio miscēda qualia esse debeant medicamenta.

Compositiōis medicamento-
rū opio cōstan-
tiū optimū sco-
pum tria sibi
proponere.

cum alio quopiam uim ipsius moderante misceat, moderatius hæc facit. Verùm quæ admiscentur ipsi, aut concoquant, aut mitigent dolorificam affectionē oportet, aut humores affectionem gignentes discutiant, aut dissecant, aut attenuent, aut iuxta totam substantiam alterent. Quum igitur optimus cōpositionis scopus, tria sibi proponat: nimirum ut & sensus stupefiat, & nullū in posterum circa particulam inde detrimentum rema-

neat, ampliusq; ut affectio ipsa inde iuuetur: ad hæc omnia respiciens Philo, prædictum composuisse uidetur pharmacum: ex opii quidem, hyoscyamiq; mistura soporem, sensutricisq; facultatis stuporem inducere uolens. Quo uerò hæc citius distribuerentur, & totâ affectionum partium penetrarent profunditatem, calfacientia admiscuit, pyrethrum, euphorbiū, & piper, quæ nocentes humores discutere possunt, extergere uiscidos, incidere crassos, ac deniq; flatulentos attenuare & dissolvere. Est aut, non modica concoctoria uis omnium frigidarum affectionum in nardo sita: quæ aut Indica, aut Celtica iniicienda est. At crocus humorum crudorum est concoctorium, atq; item affectionum uirulentarum.

Nardi facultas.
Crocifacultas

Colica medicamina Andromachi.

Colica medicamina Andromachi. Anisi drach. vi. seminis apii, drach. xij. nardi, drach. iiii. castorii, drach. iiii. petroselini drach. iiii. piperis albi & longi, utriusq; drach. v. myrrhæ drach. vi. iunci odorati, drach. iiii. succi papaueris drach. vi. croci drach. iiii. Melle excipito. Datur ad summum nucis regię paruæ magnitudo ex aquæ calidę cyathis. iiii. minimū nucis ponticę magnitudo. Aliud admirabile colicū ad uoluulosos, & sterces per os reddentes. Piperis albi, sem. hyoscyami, utriusq; drach. xl. opii drach. xx. croci drach. x. spice nardi, euphorbi, pyrethri, sing. drach. ij. Excipe melle cocto. Datur magnitudine fabæ in aquæ frigidæ cyathis iiii. aut. iiii.

Colica Isotheos dicta, ad stomachicos, oculorum dolores, uteriq; labores, ex aqua mulsa, ubi ruta fuerit incocta. Croci sesquidrachmam. nardi drach. ij. myrrhæ drach. viii. costi, piperis albi & longi, chalbani, sing. drach. j. opobalsami, drach. iiii. cinnamomi, succi mandragoræ, castorii, sing. drach. ij. seminis dauci drach. iiii. S. sagapeni drach. iiii. cassiæ drach. iiii. excipe melle Attico.

Alia non minus admirabilis. Succu centaureæ, castorii, scille assatæ, piperis albi & longi, myrrhæ, rutæ hortensis, hyssopi, abrotoni,

riidis Illyricæ, sing. drach. ij. croci, ammoniaci thymiamatis, rad. acori, phu pontici, zingiberis, ueratri albi, sing. drach. j. oxymelite excipito. Datur etiam drachma. j. ex aceto mulso. Chariclis, ad coli inflationes, remedium. Cumini Æthiopici, drach. vi. sem. apii, drach. v. seminis dauci Cretici, drach. ij. piperis albi, drach. j. Tusa & cribrata reponito. Datur cochlearia duo, cum aquæ mulsæ cyathis tribus. Confectio Lingonis colica, quæ data ex frigida, statim soluit dolores. Sem. hyoscyami albi, drach. xx. opii, seminis dauci Cretici, utriusq; drach. x. petroselini, drach. vi. croci, spicæ nardi, pyrethri, sing. drach. iiii. euphorbii, opobalsami, cinnamomi, sing. drach. ij. Excipito melle cocto, ac fabæ Ægyptiæ magnitudinem exhibero, cum aquæ tepidæ aut frigidæ cyathis. iij. in irritationibus.

De dysentericis.

Dysenterici ueri sunt, quibus est aliquod intestinum exulceratum,

Dysentericis remedia scripta ab Andromacho,

DEinceps medicamenta scribemus, quæ uerè dysentericis auxiliantur, quos nulla alia infestat affectio, præter ulcus intestinorum, aut nudum, aut cum putredine obortum, quam nomen appellant.

Quæ ab Andromacho ad dysenteriam scripta sunt. Potio ad dysentericos & hæmoptoicos. Florum rosarum, opii, acaciæ, gummi, sing. drach. iiii. balauſtii tantundem. succi hypocisthidos tantundem. gallarum, seminis plātaginis, succi eius, sing. drach. ij. lycii Indici, succi rosarum, sing. drach. j. Cōſice pastillos drachmales, & uariè utere. Ad dysentericos & coeliacos confectio ex fructibus. Mala punica integra, xx. cydonia totidem. erui sextarium. j. prunorum syluestrium, sextarios. ij. Sorborum Ephesinorum, tātūdem. Rhoeis Syriaci, sextar. iij. pira Terentiana. xx. Cestiana. xxx; siliquas xl. baccarum myrti nigrarum, sextar. iij. musti aminæi ad tertias decocti sextar. xlviij. Coquito simul ad mellis spissitudinem, & in figulino reponito. Alia. Nardi, croci, utriusq; drach. viii. aloes, thuris,

ſing. drach. ij. acaciæ, myrrhæ, ſucci hypocithidis, roſarum ſiccarum, lycii Indici, tragacanthæ, opii, ſing. drach. iij. piperis drach. ij. Aqua excipito: paſtillos q; duarum drachmarum facito, et cum uino myrteo exhibeto. Ad dyſentericos, cœliacos, & hæmopticos, ex Cornelio medico. Myrrhæ, thuris, aloes, croci, opii, rhois Syriacæ & coriariæ, lycii Indici, acaciæ, malicorii, ſucci hypocithidis, gallæ, balauſtiorū, ſing. par pondus in paſtillos cogito, & ad noctem febre carentibus ex uino: febrientibus uerò ex frigida propinato.

Hæmopticis
medicamē Cor
nellii.

Potio Apollonii ad fluxum muliebrem ſiſtendum. Corallii, balauſtii, utriuſq; obol. iij. gummi obol. j. Excipe oui crudi candido: & dimidium totius cum aquæ cyathis quatuor propina. Infuſa Dyſentericis cōmoda. Infuſum Athenæi ad recti inteſtini ulcera.

Fluxui mulie
bri ſiſtendo po
tio Apollonii.
Clyſmi dyſen
tericis apti.

Omphacii, aluminis ſciſſilis, calcis uiuæ, ſquamæ gris, ſing. drach. vi. auripigmenti drach. viij. ſandarachæ, drach. iij. chartæ uſtæ drach. xv. cum uino myrteo paſtillos drach. iij. aut trium, formato. Infunde autem cū uini duluri cyathis. iij. & aquæ tepidæ cyathis duobus.

Infuſum Heræ. Chartæ uſtæ, cadmiæ, auripigmenti, ſing. vnc. j. calcis uiuæ extinctæ ſucco plantaginis, vnc. S. Omnia redigito in pollinem, & cochlearia. ij. cum decocto baccarum myrti, aut uino myrteo, infundito.

Infuſum Nicoſtrati. Calcis uiuæ drach. j. gypſi, drach. viij. acaciæ drach. ij. omphacii, drach. j. ſtibi drach. iij. thuris drach. j. gallæ drach. iij. tragacanthæ, drach. ij. cum uino myrteo in paſtillos redigito.

Aſclepiadis ad dyſentericos remedia. Rhois Syriacæ, farinæ polentæ, uuæ paſſæ, ſing. drach. ij. malicorii ruſi & cribrati, drach. j. Excipito melle cocto, atq; myſtrum unum ante cibum porrigito, Aliud probatum. Gallarum redactarum in pollinē, cochleare unū. piperis albi, rhois rubri, malicorii tenuiſſimè triti, ſingul. tantundem. Omnia oui luteo excipito, & in uacuā

Dyſentericis
remedia ab Aſ
clepiade ſcri
pta.

mali punici testam coniicito, atq; obturato cum farina osculo ipsius, ad prunas torre: depurgata mali punici testa, cochlearium unum edendum dato. Pastillus Philippi ad dysentericos inueteratos, dolorem sedans, qui bibiturq; & infunditur Balauſtii, acaciæ, succi hypocisthidis, rhois, apii, thuris, myrrhæ, baccarum myrti nigrarum, croci, gallarum, lycii, aloes, rhei pontici, malicorii, sing. drach. iij. Excipito uino Italico, cogitoq; pastillos pondere obol. iij. ac porrigito non febrientibus quidem, ex uino: febrientibus uerò ex mulsa.

Dysentericis
epithema com
modum.

Epithema coeliacis, dysentericisq;. Sem. hyoscyami albi, apii, utriusq; trientem. anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis, balauſtii, rhois Syriaci, sing. sextantem. succi papaueris, croci, utriusq; vnc. j. Singula cum uino myrteo terito: dein mista in pastillos redigito, quos in umbra assiccato. Inde uerò quantum sufficit tundens & cribrans, palmulis passis excipito, ac tandē linteolo imposita, uentri admohero.

De affectibus sedis.

Sedis viscera
cur ægre cura-
tionē recipiā,
& qualia phar-
maca postulet.

Sedis uitia, ob ipsius partis sensum exquisitissimū, & ob crebrum per ipsam excrementorum decursum, ægrè curationem recipiūt. Aptissima autem ipsis pharmaca sunt, quæ absq; aspredine astringunt: qualia maximè sunt, quæ ex metallicis neq; acria, neq; acerbata existunt. Hæc siquidem lota, citra mordacitatem (id quod requiritur) operantur.

Sedis medica-
menta ab An-
dromacho scri-
pta.

Medicamenta sedis ab Andromacho scripta. Cerussæ, lithargyri utriusq; drach. v. thuris, aluminis scissi, utriusq; drach. iij. croci obolos. iij. Vini & rosacei quod sit satis. Conficito. Aliud. Butyri, cere, utriusq; fescunciam medullæ ceruinæ, cæsyti, thuris, sing. vnc. j. aluminis scissi quadrātem. Lycii, sextantem. vini & rosacei, quod sit satis. misceto. Aliud. Adipis anserini curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, florum rosarū, pompholygis, cadmiæ, plumbi loti, sing. drach. iij. cerussæ drach. viij. cerebri

gruis drach.ij. succi papaueris sesquidrachmam. œsy-
pi drach.v. succi seridis heminam. j. rosacei heminā. S.
confundito.

Pinguis compositio ad achoras & Pforis utilis
pforas. Spumæ argenti, cerussæ, utriusq; drach. xxxij. compositio.

atramenti futorii, drach. xvj. sulfuris uiui, drach. viij.

Olei myrtei & aceti quod sit satis: misceto.

Ad prolabentem sedem. Recrementi plumbi, drach. Sedis prolapsus
viij. Rhois Syriaci, tantundem. floris rosarū drach. iij. remedium.

myrrhæ Minnææ drach. ij. Insperge siccū, ubi prælu-
ris uino austero, aut uini decocto.

Aliud. Gallæ
omphacitidis, rhois coriarii, sing. drach. ij. plumbi usti,
drach. iij. spumæ argenti, drach. viij. trita inspergito.

Hæmorrhoidibus extrahendis pharmaca ab As- Hæmorrhoidi-
clepiade scripta. Piperis, nitri, utriusq; drach. j. terli- bus ab Ascle-
to admouetoq; Aliud. Spumæ nitri, fellis tauri, sta- piade scripta
phidis syluestris, sing. drach. j. Trita, exceptaq; modi- remedia.

co melle, adhibeto. Postea uerò q̃ eminentes fue-
rint, atq; in propatulo, accipe cerussæ vnc. j. spumæ ar-
genti quincuncē, pompholygis vnc. j. olei myrtei bes-
sem. Vini boni tantū dē, butyri vnc. j. Confunditoq;,
& applicato. Cæterū ad ardentes sedis dolores, ouī
affati uitellum uino albo terito, & cerato myrteo exce-
prum, illinito. Ad pudendorum affectus.

E Xulcerati pudendi cognitio, ex manifesto circa ip-
sum dolore paratur: unā cum hoc, q̃ etiam circa Pudendorū vl-
mictiones excernitur quid ex corpusculis ulceri ipsi in- cera dignoscē-
sidentibus. Discernuntur autem hæc ab ijs quæ ex ue- di ratio.

sica ferunt, q̃ statim ī ipso primo loci exitu appareāt:

q̃ uerò à uesica excernunt, deferant cū urinis p̃mixta.

Cæterū ulcera pudendorum, & circa sedē citra inflā- Pudendorū vl-
mationem consistentia, resiccantibus ualde indigent cera valde re-
pharmacis, qualia sunt, quod ex charta combusta con- siccatib; phar-
stat, & anethum ustum, & cucurbita usta. Verū sic- macis indigēt.

cis & recentibus ulceribus, etiam aloe bonum est me- Pudendorum
dicamē. Omnium autem maximè dolorem sedat, nec vlcibus quæ
pharmaca opī
tulentur.

Vicera vesicæ
uteriq; iisdem
quibus puden-
di vicera medi-
camentis indi-
gent.
Metrenchyte.
Catheteres

Pudendo tume-
facti remedia

Pudendi fissu-
ras, tubercula
q; quæ sanent.

Pudendorū in
flāmationibus
quæ opitulent.

Priapismus est
auctio celis p-
manens, in lati-
tudinē, longitu-
dinemq; citra
rei venereę ap-
petentiam.
Priapismi cu-
ratio.

ullo minus efficax est pompholyx. Si uerò humectio-
ra sint ulcera, pinus cortex per se, & lapis hematites: ut
si profunda, manna etiam prædictis addatur. Porro
quæ circa uterum aut uesicam consistunt ulcera, eisdē
medicamentis indigent, sed instrumētis insuper opus
habent, quæ ipsa intromittant, ut sunt metrenchyte, &
catheteres uocati. Aptiora itaq; sunt arida, qualis est
crocus, pompholyx, & aloë, quæ faciliē plantaginis, aut
alteri tali succo miscentur. Ad scroti & pudendi do-
lores. Butyri & resinæ pari mensura utere. Aut se-
men lini cum aqua coquito, & admista myrrhæ fermē
decima parte, & resinæ tantundem, imponito. Ad
pudendum intumescens. Foliorum uitis tenerorū dra-
ch. j. cerussæ drach. v. trita cataplasmatismis uice impone.
Aut lenticulā in aqua coquito, & cum mali punici cor-
tice tritam imponito. Si uerò ē sudoribus ulcera in
scroto fiant, gallam tritam cum alumine inspergito.
Ad tubercula in pudendis nascentia, piri semen insper-
gito, & fel hircinum oblinito. Fissuras & rimas iuuat
rosaceum, amyllum, & thus, paribus portionibus mi-
sta. Aut foliorum hederę aridorum ustorūq; cinis,
cum oleo in plumbeo mortario triti. Ad pudendorū
inflammationes, farinam hordeaceam hydromelite in
coquito, & uitis folia tenera cum polēta terito, simulq;
omnia imponito. Excrecentem testiculorum car-
nem cinis sarmenticius cum nitri & aqua subactus sa-
nat, cataplasmatismis uice impositus.

De Priapismo.

Priapismus est auctio colis permanens, in longitu-
dinem atq; orbem tumefacti, citra rei Venereę ap-
petentiam. Cuius affectionis est causa flatulentus spi-
ritus ex humoribus crassis & uiscidis genitus per mo-
deratam caliditatem. Debent igitur refrigerari leniter
partes per ceratum rosaceū in aqua maceratum, itēq;
per chamæmelinum ceratum, tum pudendo ipsi, tum

lumbis impositum. Victus & pharmaca esse debent attenuatoria, citra manifestam calfactionem. Præterea nymphæa in potu est danda, & uiticis semē: nec non ruta uiridis obsonijs misceatur, post aliorum tenuantium usum. Quod si euacuatione uti libeat, administretur per uomitum. Ad eos qui se in somno permingunt, uesicam caprillam, aut ouillam ustam, ex posca bibendam dato: & ad uesperam siticulosos inire somnum iubeto. Facit & testiculus leporis in uino odorato feruēfactus, atq; ita potus. Aut calamintham & myrrham in uino ante-cœnam bibendam dato. Oblinant autem pudendum cimolia terra cum perdicij succo.

Ad uteri affectus.

In uteri suffocatione contingit sensus ac motus priuatio, & pulsus obscurus, & paruus, & penitus interceptus. In aliquibus uerò tum sensus, tum motus adest, ratioq; cōstat, cæterum uix respirant. Aliquibus etiam uox intercipitur. Alijs contrahuntur artus. Fiunt igit̃ uiduis sensus, & motus, & respirationis interceptiones, ob frigiditatem: perspirantibus ipsis tunc per arterias totius corporis, neq; utētib; illa, quæ per os fit respiratione. Etenim quum prius probè repurgarentur, conciperent, atq; coirent uiris, uerisimile est, postea quum omnibus his priuantur, humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad uulux itaq; strangulatus conuenit agarici drach. j. in potu accepta cum uino: & plantaginis semē & succus cum uino: nec non acetum scillinum absorptum. Olfactu excitant strangulatas, bitumen, castorium, chalbanum, pix liquida, cedria, pili usti, ruta, allium, cepa. Eandem in rem & cornu cerui suffitur: & ruta cum melle lana excepta in anum inditur.

Mingentibus inter dormiendum remedia.

Vteri suffocationes quæ sequantur symptomata.

Vteri suffocatione assilgente, per arterias tantū fieri perspirationes. Vteri suffocationis causa. Vteri suffocationis remedia.

GALENI PERGA- MENI, DE COMPOSITIO- NE MEDICAMENTORVM SE-

cundum locos, Liber. X.

Nephriticorū
medicaminum
differentiæ.



Renum inflam-
mationib⁹ qua
lia medicamē-
ta conueniant.

Calculosis con-
grua medica-
menta, omnia
fere esse ama-
ra.

Vesicæ ulceri,
& urinæ diffi-
cultati reme-
dium.

Sanguinē e ue-
fica fluentē re-
medium sup-
primens.

Calculos frangens medica-
mentum.

X Nephriticis Antidotis, hoc est renali-
bus, quædam enim calculosos renes iu-
uant: quædam uerò inflāmatos & ulcera-
tos, quæ etiā ad uesicam affectam conue-
niunt. Maximè autē contrarię inter se sunt,

predictorū pharmacorū facultates. Siqdem quę ad in-
flāmatas et exulceratas affectiones cōponunt, mitiga-
torijs medicamētis indigēt. Ceterū quū impossibile
sit hæc cito penetrare ad regionē renum, ob id ipsis mi-
scemus diuretica. At quæ calculosis opitulātur, unicam
facultatem postulant, quæ secare & extergere est nata,
cū conspicua caliditate. Sunt autem talia ferè oia ama-
ra.

Confectiones Andromachi ad renum
& uesicæ affectiones. Potio ad uesicā exulceratam
& urinæ emittendæ difficultatem. Seminis lini, sem.
papaueris albi, sem. cucumeris, tragacantæ, sing. drach.
ij. amyli drach. iij. Cum aqua in pastillos redigito: ex-
hibetoq;.

Alia ad eadem, & uesicæ dolores. Cro-
ci, seminis rutæ syluestris, seminis maluæ syluestris,
sing. drach. vj. sem. hyoscyami, drach. xij. opij drach. vj.
sem. apij, drach. xij. nuces auellanas. xij. amygdalas. xx.
sem. cucumeris drach. xij. mellis Attici, quod sit satis.
Datur magnitudo ponticæ nucis cum uini multi cya-
this. iij.

Alia ad profluuia sanguinis ex uesica.
Aluminis drach. j. tragacanthæ drach. ij. gummi obo-
lum. j. Dato ex passo quandoq; obolum. j. quandoq;
duos.

Alia calculos frangens, ita ut non renascan-
tur. Cassiæ, piperis albi, sem. pastinacæ, anisi, sem.
papaueris albi, spicæ nardi, sem. smyrnij, cyperi, sing.
drach. ij. seminis apij, thuris, styracis, iridis Illyricæ,
amygd. amar. asari, sing. drach. iij. myrrhæ minnæ,

drach.iiij. Mellis Attici quod sit satis. Conficito & quotidie exhibeto nucis pōticæ magnitudinē ex aquæ cyathis tribus; idq; ieiuno, stomacho.

NEPHRITICAE cōpositiones ab Asclepiade, con- Nephriticæ cō
positiones ex
Asclepiade.
scriptæ. Seminis fatiui cucumeris tosti, drach.iiij. se-
minis maluæ, drach. v. nucum pinearum drach. vj. se-
min. apij drach. vij. seminis lini drach. j amyg. amara-
rum mund. drach. ix Excipe passo, & exhibe nucis pon-
ticæ magnitudinem cum protropi cyatho. j. & aquæ ca-
lidæ cyathis duobus. Alia. Maluæ syluestris & ru-
tæ syluestris, & apij montani radices in uino coquito,
& expressi liquoris cyathos. ij. cum pari aquæ portio-
ne exhibeto. Alia. Seminis balsami, lapidis qui
spongijs inest, pulegij aridi, feminis maluæ syluestris,
ocymi aridi, sing pares portiones tundito, incernitoq;
& reponito. Propinato autem cochleare unum cum ui-
ni diluti cyathis duobus. Pastillus ciens urinas,
atq; expellens lapillos. Asari, petroselini, phu-
Mei, singul. drach. iiij. acori, sem anisi, sem. dauci, apij
montani, carpobalsami, tragacanthæ, sing. drac. ij. Tra-
gacantham passo dissolutam aridis adiucito, & pastil-
los formato: indeq; obolos. iiij. cum passi diluti cya-
this. ij. exhibeto.

De ischiade, podagra, & arthritide.

EX genere arthritidis est tum ischias, tum podagra. Arthritis.
Ischias.
Podagra.
Quod enim in omnibus articulis est arthritis, hoc
in uno iuxta coxedicem quidem, ischiada, iuxta pedem
uerò, appellant podagram. Incipit igitur plerunq; po-
dagræ generatio ex uno articulo, temporeq; in omnes
progreditur. Communem habēt hi tres affectus re-
dundantiam humoris. Cæterum aliquādo irruens hu-
mor sanguineus est: ut plurimū autem pituitosus: aut
ex pituitoso & bilioso mistus: quibus etiam interdum
miscetur sanguis. Porro ubi pituitosus humor, qui
propriè appellatur crudus, in articulis delituerit diu-
tius, crassior atq; uiscosior efficit, tosisq; aut callis di-

Articulatium
morborū com-
munes causæ.

Teseorum gene-
ratio fit a pitui-
toso hūore im-
passo in articu-
lis: ob idq; sunt
incurabiles

Articulares do-
lores a quibus
gignan ur hu-
moribus, quæ
notæ indicen-
tur.

Articularis
morbi curatio.

Repellentibus
quidem uten-
dum esse, si hu-
mores fluât ad
articulos: redû
aut manuû: mi-
nime autem, si
in coxendicem
irruant.

Ischiadi: quæ
lia remedia in
principio con-
ueniant.

Ischias raro ori-
tur a sanguine:
facillimeq; cu-
ratur tunc po-
plitis uenis aut
malleolorum
incisus.

Ischiade urgẽ-
te acerbis me-
dicamentis non
est utendû, ante
totius corporis
euacuationem.
Ischiadicis con-
fert uena secta
in cubito, uo-
mitusq;.

ctis præbet generationem. Qui quidem postq̃ pro-
ducti fuerint, non est q̃ speres illos posse exactè dis-
solui. Differentia affligentium humorum facillè ex co-
lore dignoscitur. Præterea biliosus sanguis multæ ca-
liditatis sensum exhibet ægrotanti, à calorificisq; reme-
dijs exacerbatur: quæadmodum remittitur rursus à fri-
gidis. Curatio autem ipsa exordiẽda est ab euacuatione
affligentis humoris: si quidem ex æquo humoribus re-
dundarit corpus, uenæ sectione primo omnium admi-
nistrata: dein purgatione, quibus accedat pharmaco-
rum dicendorum conueniẽs atq; opportunus usus: ita
ut in manibus pedibusq; pharmacis repellẽtibus flu-
xionem utamur: iuxta coxendicẽ uerò, ea minimè ad-
ministremus. Quum enim iunctura ea in profundo sit
sita, sanguis ex uicinis & ambientibus uasis à muscu-
lis ad illã truditur. Mitigatorijs igitur in principio me-
dicamentis utendum est ad dolores coxendicũ, & quæ
nec refrigerent multum, nec fortiter calfaciant. Exacer-
bantur enim per ipsa fluxiones, caliditate nimirũ plus
attrahente ipsas, q̃ impediente. Rarò itaq; fit coxendi-
cum dolor ex sanguinis multitudine, citissimeq; cura-
tur, uenis circa poplitẽ aut malleolos pertusis. Quem-
admodum autem sola sæpe sanguinis euacuatio suffi-
ciens auxilium existit, sic cõtra in omni dolore coxen-
dicũ, & præsertim eo, qui ex humorum copia est exor-
tus, si quis ante euacuationem totius corporis acerbis
pharmacis circa affectam partem utatur, affectũ ægrẽ
curabilem reddet, copia uidelicet indissolubiliter ibi-
dem condensata. Ob idq; ab euacuatione incipiẽdum
est, nõ solum à cruribus, sed à cubito etiam sanguinis
detractione facta. Auxiliantur etiam uomitus ipsis is-
chiadicis, magis utiq; q̃ euacuationes per uentrem: ut
qui reuellant humorem repentem deorsum. Mouen-
di itaq; sunt uomitus in principio ab accepto cibo: po-
stea uerò, etiam per uomitoria medicamenta, initio à
mediocribus facto. In quibus autem uehemens hu-

morum densatio, quæ ægrè dissolui possit, à medicis intempestiuè utentibus acribus pharmacis facta est, ijs maximè cucurbita affixa auxiliatur, & purgatio per clysmos efficaciores, qualis est qui ex colocynthide constat.

COMPOSITIONES ab Andromacho scriptæ ad ischiadicos. Emplastrum è profundo extrahens humores affligentes coxendicem. Seminis rutæ sylvestris, silphij, spumæ nitri, baccarum lauri, abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi, animij, singul. drach. iij. rutæ uiridis, minæ octauam partem. Quidam horum singulorum drach. xx. accipiunt: necnon picis, adipis taurini, terebinthinæ, myrræ, ceræ, sing. tantundem. chalbani, ammoniaci thymiamatis, utriusq; drach. vj. opopanacis, sulfuris uiui, sing. drach. iij. Conficito, & admoueto.

Aliud ad coxendicum, capitisq; dolores, atq; ad alios omnes antiquos. Ceræ drach. xxiiij. ammoniaci thymiamatis drach. vij. terebinthinæ tantundem. succi thapsiæ, drach. viij. olei cyathum unum. Aliud. Ceræ drach. C. uisci quercini, drach. xvj. myrrhæ drach. vj. terebinthinæ drach. xxv. chalbani drach. vi. iridis Illyricæ tantundem, ceræ heminam. S. Cyprini tantundem.

ASCLEPIADIS Malagmata ad ischiadicos.

Myrrhæ factæ, bdellij onychis, medullæ ceruinæ, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sing. lib. ij. opopanacis, chalbani, styracis, mastiches, floris lapidis Asij, succi sycomororum, canchryos, piperis albi, sing. lib. j. ceræ, terebinthinæ, utriusq; lib. v. Tundendum est pharmacum ita, ut qui tundit, facit unguenti irini adhibeat, quo mollius reddatur. Aliud mirè iuuans ischiadicos, discutiensq; omnem duritiem. Ceræ, uisci quercini, terebinthinæ, iridis siccæ, myrrhæ, chalbani, sing. drach. xlviij. Olei cyprini, aut unguenti Aegyptiaci, quod sit satis. Conficito. Aliud. Picis liquidæ brutæ, lib. iij. facis aridæ ustæ, lib. ij. nitri rubri, lib. j. S. resine pini, ceræ, staphidis sylvestris, sulfu-

Ischiadicis malagmata ab Asclepiade scripta.

ris uiui, sing. lib. j. pyrethri, lib. S. cardamomi sext. j. Picem, ceram, atq; resinam, soluito: arida tundito, cribratoq; & liquefactis committito. Porro DAMOCRATES, Archigenesq; plurimum ad ischiadicos commendant malagma ex Iberide herba (quam nasturtium syluestre uocant) cum adipe porcino tusa confectum: quod sanè imponi iubent ad horas tres, indeq; ad balneum accedere.

De podagricis & arthriticis affectionibus.

SCopus in hisce affectibus est, si quidem adhuc fluant humores, ipsos per astringentia repellere: si uerò amplius non influant, discutere qui sunt iam impacti.

Arthriticis cō-
gruētia epithe-
mata ab Ascle-
piade scripta.

EPITHEMA ASCLEPIADIS, ad arthricos, mirè dolorem sedans. Succi papaueris, drach. iiii. croci drac. j. cum lacte bubulo, caprillo ue, & panis medulla contundito, lœuigatoq; ac deniq; ex rosaceo emolliens, conficito cataplasma. Aliud. Styracis drach. ij. opij drach. j. Confice, utereq;. Aliud tofos & duritias discutiens. Farinæ fœnigræci, floris lapidis Asi, lomenti fabæ nigræ, farinæ lupinorum, sing. sextar. j. Omnia mixta & aqua subacta calida, imponito. Pastillus podagricus. Aloes lib. j. succi centauri sexuncem. Thuris masculi trientē. myrræ tantundem. floris lapidis Asi, opij, succi mandragoræ, aluminis scissi, sing. sextantem: passo excepta in pastillos redigito. Vsu expetete, lacte dissolutos cum penna illine, & supra illitionem linteolum passo imbutum impone. Aliud, quod auxiliatur confestim. Visci, terebinthinæ utriusq; lib. j. adipis taurini, floris lapidis Asi, calcis uiuæ, mannæ, sing. quadrātem. cyprini lib. j. Conficito, utitorq;.



FINIS.



Ex industria omisimus libellum de facilibus paratu remedijs, q̃ omnia quæ in illo habentur, reperiantur in hisce commentariis longè cumulatiora.

ILLVSTRI ADMODVM, ATQVE

Ornatissimo Viro, D. D. Ario Gonz=

zalo, Comiti Pugni in Rostro: An=

dreas Lacuna, Secobiensis,

Doctor Medicus, Mi=

les . S. Petri.

Salutem.



ALENI COMMENTA=

rios de Theriaca & de antido=

tis hoc nomine dicare tuæ Digna

tioni statui, Vir citra controuer

siam Splendidissime, ut genero=

sum istum animum tuum, ex tam

longa lite & controuersia defa=

tigatum, uaria eorum lectione, dulcissimaq; , oblecta=

rem: contra iudiciariasq; molestias, atq; ingentes dif=

ficultates (quæ optimorum ingeniorum ueluti delete=

ria & exitialia uenena existunt) salutaris alexiphar=

maco communirem, atq; corroborarem. Quanquam

hercle adeò inuicta, insuperabilisq; tua ista est animi

magnitudo, ut nullis tormentis succussa possit unquam

euerti, aut quoquomodo labefactari. Nam tametsi ua=

rij fortunæ fluctus, acerbissimaq; procellæ, & quæ

uel fortissimum quenq; prosternere minimo negotio po=

tuisent, iam ante multos annos in te maximum im=

petum fecerint, adeò tamen fortiter sustinuisti omnes

eius insultus: tam heroicè restitisti afflictionibus undiq;

tua moenia circūuallantibus, ut ob nullam tempesta=

tem ingruentem, uultum unquam, aut colorem, muta-
ueris. Quam sanè tam insignem constantiam, animiq;
raram serenitatem, non aliunde q̃ à philosophia com-
paraſti: cuius nimirum amator longè indulgentissi-
mus es. Siquidem præter alias uirtutes quibus te exor-
nauit Deus Optim. Max. etiam inſeuit tibi ardentis-
ſimum quendam omnium disciplinarum amorem, quo
accensus, adeò illis perpetuò indulges, ut ab ipsis re-
uocari non possis. Id quod ipse exploratum habens,
non posse me Dignaioni tuæ rem ulla gratiorem
facere existimaui, q̃ si ad eam mitterem hosce com-
mentariolos Galeni, ut mole exiguos, sic plenos eru-
ditione, uarijsq; naturæ misterijs auctos. Tuum

igitur fuerit, Vir Clarissime, hoc nostrum
quantulumcunq; munusculum, illius fe-

ruentissimi amoris, quo Optimus

pater meus proſequebatur

olim totam familiam

ueſtram, offi =

cijq; mei

in

Tuam Amplitudinem, futurum

ueluti monumentum quod =

dam perenne, æqui bo

niq; conſulere.

Vale.

Venetijs. Calen. April. M. D. XLVIII.

Galenì

GALENI PERGAMENI, DE THERIACA ad Pisonem, Liber vnus.



EDICAMENTVM Ex uiperis meritò est apud homines inter alia omnia celebratissimum, Optime Piso, & q̃ uim habeat efficacissimam, & q̃ neminem promissis frustratur. Si quidem nullū à feris commorsum, hac statim epota antidoto, perussisse, memorie proditum est. Nullus etiam, eadem præsumpta, uel si paulo post impeteretur morsu, interijt: id quod indies experiuntur prætores, in hominibus capitali supplicio damnatis. Cæterum, si epota theriaca non purgetur qui hausit medicamentum purgans, id tibi erit indicium, antidoton præstantissimam esse, quæ sæpissimè solet adulterari. Porro Diuus Marcus Aurelius, qui legitimè aliquando gesit habenas imperij, affatim & uelut alimento quodam hoc utebatur medicamento: primusq̃ fuit, qui ipsius existimationem, fidemq̃ auxit. Verùm illius quidem principis tempore, ad familiarium tantum notitiam, theriaces perueniebat opus: sub hisce autem monarchis maximis, usus eius prodijt in publicum. Siquidem nobis omnibus licet eorum bonis probè uti, liberaliterq̃ alijs mederi, alio ab alio medicamentum capiente: quum non solum hoc nomine cæteris omnibus antecellat, q̃ imperium à Dijs sint adepti, sed q̃ etiam uniuersa bona cunctis libenter impartiant, ac non secus q̃ Dij ipsi, tantum ex æquo gaudij concipiant, * quantum illi qui ab ipsis seruantur: quum nimirum censeant maximam regni esse partē, com-

Theriaces commendatio.

Theriaca perfecta purgantium pharmacorum operationem supprimit.
Marcus Aurelius Imp. auxit fidem Theriaces.
Seuerū & Lucium eiusdem imperij moderatores, collegasq̃, magnifice commendat Galenus.

Regni maximū esse partē, communem omnium salutem.

munem omnium salutem . Quo sanè regio candore præditi, adeò exquisitè & diligenter theriacem præparant, ut ipsi quidem nihil prorsus omittant: antidotus autem, admiranda opera exhibeat . Igitur morbi cuiusq; natura comperta, differentiaq; simplicium pharmacorum penes temperamentum, cognita, singulis morbis quod congruum sit, medicamen compositum præparabimus . At simplicium medicaminum vires sensu & experientia cognoscimus, quibus postea rationem iungentes, eamq; ceu ducè sequentes, hallucinari non possumus . Etenim quum cernamus liquidò, scammoniam bilem flauam educere: epithymum, atram bilem: ac deniq; coctū gnidium, pituitam: nec credamus medicamenta ipsa purgantia, in suam naturam humores trāsmutare & conuvertere (id quod Asclepiades somniauit) sanè persuasum habemus, quemedmodum magnes trahit ferrum, sic medicamēta singula, sua insita facultate, conuenientem sibi succum attrahere: nimirum id ratione comprehendentes, quod proprietatem facultatis naturæ cuiusq; pharmaci uerè *testari atq; exprimere potest. Medicamentorū itaq; alia per totas substantias agūt: alia in substantia sua miscellaneā facultatem sortiuntur: adeò ut sæpe in corpore effectus maximè contrarios producant. Siquidem lapathi folia comesta subducunt aluum, quam sumptum eius semen astringit. Similiter & succus brassicæ, & uetulorum gallorum ius, & cochlearum marinarum cremores, uentrē commouent: olus autem ipsum, atq; illarum carnes comestæ, eundem comprimunt. Aloe, squamaq; æris, excrescentes ulcerum carnes astringunt: assumpta uerò per os, uniuersum corpus expurgant. Lac ubi à nobis diuiditur, contrarias facultates ostendit. Nam serum ipsius bibitum, uētre remouit. Caseus ingestus, ipsum cohibet exactè. Trifolium herba, decocta, ini-

Simplicium uires cognoscitur sensu, experientiaq; quibus adiuncta sit ratio. Scammoniū trahit flauam bilem.

Epithymū atram bilem expurgat.

Cocculus gnidium soluit pituitam.

Medicamenta singula propriū sibi succum attrahere.

Medicamenta plura, secundū diuersas sui ipsorum partes, uarios effectus producere.

Lactis substantiæ diuersæ.

Trifolium afflu-

posita; ferarum moribus auxiliatur: quæ si sanæ pui affricetur, non secus q̃ ferarum morsus eam affligit.

Cicuta sturnos quidem, alit: nos autem è medio ollit. Veratrum coturnicibus cibus, homines malè perimit. Nonnulla præterea partes quasdã certas corporis uitiant. Nam lepus marinus, pulmonem exulcerat. Cantharis uesicam peculiariter afficit.

Econtrario, affecto iecinori sæpe fuit herba eupatoria ex usu. Myrobalanus lienem adiuuat. Sarxiphagon, & Betonica, renes optimè afficiunt. Quum igitur ueteres illi Medici reputarent secum, ineuitabiles esse noxiarum ferarum morsus: necnon deleteriorum pharmacorum symptomata esse omnino letalia: quumq; etiam perpenderent, hominum naturas differre inter se plurimum, aliudq; aliq̃ medicamentum idoneum esse, meritò ipsius theriacis accuratã, exquisitam, & uariam, sunt moliti preparationem, ut hoc nomine ipsa in omnibus suũ finem assequeretur, & ob usus necessitatem magno studio eam mortales omnes expeterent. Nihil siquidem inter uitæ incommoda difficilius mihi uidetur deleterijs medicamentis, ac feris noxijs. Primum autem qui antidoto contra ferarum morsus immiscuit feras, fuisse perhibetur Andromachus, Vir me hercules memorabilis, nec multo ante nos natus: q̃ppe qui Neroni (cuius affecula fuit) ipsius uires atq; compositionem dicarit. Summa autem descriptionis habet in hunc modum.

Andromachi senioris, Neronis Archiatri, Theriace ex uiperis, cui nomen est Galene, maximè salutaris ad serpentium atq; omnium ferarum icũs, pharmaca deleteria, affectiones uentriculi, anhelationes, dolores colicos, morbum arcuatum, hydropa, phthisin, omnimodam conuulsionem, pleuritidem, uesicæ ulcera, suppressiones urinæ, cruciatus renum, pestiferos morbos, ac deniq; canis rabidi morsus, si pondere fabæ Aegyptiæ

git sanas particulas:

Cicuta sturnos

alit: nos pimit.

Veratrum alit

coturnices: homines enecat.

Lep^s marinus

pulmonẽ exulcerat.

Cantharis uesicam afficit.

Difficilius in uita nihil reperi posse deleterijs medicamentis, ferisq; uirus eiacularibus.

Andromachi commendatio,

Theriace quibus conueniat affectibus.

sumatur, cū ternis aquæ calidæ cyathis. Igitur captas uere ineunte uiperas, ceruices illis atq; caudas præcilito, quantum arcta pygmæi manus extenditur: nam utraq; parte uenenum gerūt. Postea uerò excoriatas, euisceratasq; ab ipsisq; omni adipe amoto, in fictile uas conijcito, affundēs aquæ quod satis esse uideatur, addensq; germen anethi, ac pauxillum salis recentis, & finito coqui, donec facilè à carne ipsæ spinæ amoueantur. Tunc itaq; carnes ipsas exemptas, cum sufficienti ad pastillos fingēdos medulla panis purissimi, contundito & læuigato, affusoq; iusculi quod satis esse uideatur, manibus opobalsamo intinctis, conficito orbiculos, eosq; in umbra reponito ad totius antidoti compositionem. Dein fermento illine scillam recentem, non admodum magnam, eamq; in furno uel in patina coque, ut torreātur omnes eius partes ex æquo. Id ubi factum fuerit, partes eius internæ & tenerrime cum pari portione optimæ farinæ eruinæ contundantur & læuigentur, atq; in orbiculos digerantur. Verūm Andromachus duplicem portionem eruinæ farinæ adijciendam censet: quum tamen æqualis modus fingendis pastillis sit optimus. Hæc ubi facta fuerint, accipies pastilloꝝ Theriacorum drac. xxiiiij. pastillorum scillinorū, drach. xlviij. piperis longi, succi papaueris, magmatis, hedyochroi, sing. drach. xxiiiij. rosæ siccarū, iris Illyricæ, glycyrrhizæ, seminis napi syluestris, quem buniada appellant, scordij, opobalsami, cinnamomi, agarici, sing. drach. xij. myrrhæ, costi, croci, cassiæ, nardi, schoeni, idest iunci odorati, floris, thuris, piperis albi, & nigri, dictamni, prasilij, rheu, stœcados, petroselinij Macedonici, calaminthæ, terebinthinæ, zingiberis, quinque folij radices, sing. drach. vj. polij, chamæpityos, styracis, amomi uuæ, meu, nardi Gallicæ, Lēnæ sphragidis, phu pontici, chamædryos Creticæ, foliorum malabathri, chalcitidis tostæ, Gētiang, anisi,

**Artisconū the-
riacorum præ-
paratio.**

**Pastillorū scil-
linorum præpa-
ratio.**

**Theriaces anti-
doti secundum
Andromachū
compositio.**

hypocisthidis succi, carpobalsami, gummi, marathri
 seminis, cardamomi, seselis, acaciæ, thlaspi, hyperici,
 sagapeni, ameos, sing. drach. iij. Castorij, aristolochiæ
 tenuis, dauci seminis, bituminis Iudaici, opopanacis,
 centaurij tenuis, chalbani, sing. drach. ij. mellis lib. x.
 Vini falerni quod sit satis. Conueniebat tamen prius
 hedychroum unguetum describere, cuius apud Ma-
 gnum talis est præparatio. Aspalathi radiculæ cor-
 ticis, calami aromatici, schœni floris, phu, costi, asari,
 xylobalsami, sing. drach. vj. cinnamomi drach. xxiiij.
 amomi tantundem. amaraci drach. xx. nardi Indicæ
 drach. xvj. foliorum malabathri, drach. vj. myrrhæ
 drach. xxiiij. mastiches drach. vj. Croci drach. xix. Ex-
 ciipiuntur uino falerno, manibusq; opobalsamo intin-
 ctis, in pastillos coguntur, & assiccantur. Elegit por-
 rō Andromachus ex alijs feris solas uiperas ad huius
 præparationem antidoti, q̄ hæ minus alijs tabificam
 uim obtineant. Nam basiliscus, belua sufflaua, & tripli-
 ci frontis apice munita, uel si cernatur tantum, aut si
 bilus eius audiatur, actutū hominem perimit. Quod
 si ex cæteris animalibus aliquod attigerit animal à ba-
 silisco extinctum, subito etiam exanimatur. Dryinus
 serpens, tam esse perniciosus proditur, ut si qui ipsum
 per imprudentiam calcarint, eis pedum plantæ exco-
 rientur, totaq; crura intumescant, pericliteturq; etiam
 illorum manus, qui ipsis auxilium tulerint. Hæmor-
 rhus, & hæmorrhōis, adeo inimici sunt homini, ut qui
 ab ipsis percussus fuerit, sanguine per os & nares, ac
 per uniuersum corpus effuso, uita fungatur. Cōmorfi à
 dipsade, conficiuntur causonide. Nam & inexpugna-
 bili siti, & æstu uehementi cruciati, interdum & disru-
 pti, diem obeunt. Acontias serpens, ubi se multū ex-
 tenderit, ceu iaculum quoddam insiliens corporibus,
 ita perimit. Inter aspides nominata Ptyas, ceruicem
 exporrigens, longitudinemq; interualli metita, uene-

Hedychroum
 guenti præpa-
 ratio.

Viperas alijs
 feris minus ob-
 tinere tabificæ
 facultatis: ob-
 idq; ad antido-
 tum ab Andro-
 macho electas.
 Basiliscus con-
 spectus, audis-
 tus ue hominē
 perimit.
 Dryinus ser-
 pens.

Hæmorrhū,
 Hæmorrhōis.

Dipsas sitim in-
 fert iexpugna-
 bilem.
 Acontias ser-
 pens ut pimat.

Ptyas uenenū
 corporibus in-
 spuit.

Aspidum tres species.

Cleopatra post uictum Antonium, ne uiuaderetur Romanam a Cesare, aspide sibi mortem conscivit.

num corporibus inspuit. Etenim harum ferarum una (tres quippe aspidū sunt species, hæc uidelicet, & chersæa, necnon chelidonia) perhibēt reginā Cleopatram, quum uellet latere custodes, citra suspicionē sibi mortem subito consciuisse. Nam quum Augustus deuictō Antonio eam capere incolumen uellet, ac uiuere, studiosiusq; (sicut par erat) seruare, ut Romanis tam insignem mulierem in triumpho ostenderet, hæc, re intellecta, optauit regina adhuc ex humanis potius decedere, q̃ priuata Romanis cōspici. Quo cōsilio duas mulieres fidissimas, Naeram nēpe et Carmionē, quas ad pulchritudinem corporis mundo subministrādo habebat, ad se uocauit: eisq; iussit ut ferā uuis ficubusq; tectam importarēt quo (ut dixi) custodes falleret, prius factura periculum in ipsis mulieribus, an subito perimere posset. Quæ quidem quum actutum periissent, ferunt ipsam postea sibi exitium pariter conciliaſſe: fuisseq; tandē inuentam, manu dextra capiti admota, & diadema, sicut est consentaneum, tenente, ut uel eo usq; spectātoribus uideretur esse regina: quemadmodum Polyxenā scribit Tragicus, quæ & ipsa moriēs, accuratē tamē dedit operam, ut cum decore caderet. Qua ex re Augustum uehementer fuisse attonitū memorāt: partim ob ancillarum erga reginam amorem, ut cum ea mori non dubitarint: partim, q̃ illa generosam potius mortē maluerit oppetere, q̃ uiuere in seruitute. Recitauī hanc historiam, ut ex ipsa intelligeremus, q̃ subitam id genus feræ nobis perniciē concilient. Cæterū uipera inter reliquas omnes feras caput habet ad inferendum exitium, promptius. Aiunt autem ipsam os aperire ad excipiendam genituram à mare: qua excepta, illius caput abscindere: atq; hunc ipsis esse prauī complexus modum: deinde prolem ex semine genitam, matris uētre erodere, forasq; erumpere, ac sic iniuriæ paternæ uindices, propriā matrem

Polyxenā dedisse operā, ut cū decore iam moribunda caderet.

Viperā ore excipere genituram a mare, ei⁹ q̃ caput abscindere post semen exceptū. Viperā prolem iniuriæ paternæ uindicē, matris uētre perscindere, atq; sic nasci.

perimere. Mirum autem esse nō debet, si capiribus & caudis præcisīs, reliquæ uiperarum partes, efficacius medicamentum reddant: præcipuè carnes ipsarū, quibus ad seruandum facultas quædam est insita: quum reliquorum animalium etiam pleræq; partes, multis morbis opitulentur. Nonnullis quippe murium capita usta, ex melleq; illita, alopeciam sanare possunt. Milui quoq; caput absq; plumis combustum, si quis ex eo quantū tribus digitis comprehendi potest, bibat, aīūt podagræ opitulari. Cameli cerebrum arefactum, potumq; ex aceto, comitialibus morbis medetur: & mustelæ similiter. Hirundinis cerebrum ex melle, ad suffusiones oculorum conducit: ut ouillum, ad dentitiones infantium. Taurini cornu rasura cum aqua pota, sanguinis eruptionem cohibet: femoraq; combusta, etiam sanguinem supprimunt, ut sæpenumero aluum solutam. Ceruini cornu ramentum adustū, & cum uino tritum, circumlitumq; uacillantes dentes cōfirmat: id quod bouis talus etiā facere perhibetur: qui etiam ex lacte potus, educit rotundos lumbricos, ex oximelite lienem consurnit, & leucas tollit illitus, mediocriterq; uenereus existit. Testiculi castoris poti, conuulsionibus auxiliantur. Stercus bubulum, aridū, combustumq;, trium cochlearium mensura iuuat hydropicos. Muscerda ex aceto trita, alopecias persanat: in potu autem sumpta, lapides uesicæ comminuit. Adeps anserinus inflammationibus cum rosaceo medetur. Cerui medulla mitissimum medicamen existit. Vacchini lactis potus dysentericos adiuuat. Fel hyænx, uisum exacuit. Hippopotami cutis usta, & læuigata ex aqua, illitaq;, digerit phymata: quemadmodum pelli- cula uiperæ redacta in pollinem, alopecijsq; imposita, mirè pilos regenerat. Exuuium aspidis ex melle tritum, illitumq;, acutissimum uisum conciliat. Cancer fluuiatilis tritus, illitusq;, spicula & surculos extrahit.

Murium capita.

Milui caput.

Podagra

melleum.

Cameli cere-
brum.Hirundinis ce-
rebrum.

Cornu taurinū.

Cornu cerui-
num.Castorium.
Stercus bubu-
lum.

Muscerda.

Lac uaccinum
dysentericos
sanat.Viperæ pelli-
cula mire pilos
regenerat.Cancer fluui-
lis.

Cantharis.

Cantharis similiter lœuigata, cum bryoniæ radice posita, educit uermes. Scorpius assus, atq; ex pane comestus, uesicæ lapides conterit. Terræ intestinum ex uino assumptum, idem molitur. Tritum & ex melicrato bibitum, arcuatum morbum explodit. Ex rosaceo cerato impositum, podagricis inflammationibus conuenit. Accipiter in fusino unguento decoctus, hebetudini oculorum medetur. Scarabæus in oleo frictus, auriq; instillatus, doloribus ipsius auxiliatur.

Terræ intestinum.**Alauda.**

Stellio uisus ab scorpionibus, eos perimit.

Amphisbena.

Viperæ solæ morfib ab ipsismet factis capitulantur.

Helenii succo infectas sagittas et letales.

Muris aranei puluis sanat ab ipso emorsos.

Alauda uita si edatur, mirificè colicos iuuat. Multa etiam, uel conspecta duntaxat, uim suam ostendunt. Stellio quippe uisus ab scorpionibus, susstringit ipsos & perimit. Amphisbenam si quæ mulier grauida supergrediatur, facit abortum. Itaq; non est mirabile, si uiperarum corpora, amputatis partibus illis, auxiliandi etiam robur obtineant: imò nec si morfib ab ipsismet factis, solæ uiperæ succurrere possint, uel si nobis inimicissimæ sint. Traditur siquidem nonnulla animalia, si sanguinem quidem humanum ex uulnere manantem contingant, commorsos occidere: si uerò uorètur, nec sanguinè degustarint, uulneratos seruare incolumes posse: quæadmodum & de Helenio etiam proditum est: quo nimirum Dacas, Dalmatasq; aiunt cuspides telorum imbuere: quidelicet postquam sanguinem uulneratorum attigerit, ipsa occidere possit: quum ab ipsis tamen citra ullam noxam edatur, ceruiq; à sagittarijs per contactum eius eneati, tutò etiam comedi possint.

Iam uerò à crocodilo oblectis, ipsius adipem uulneri impositum, summo esse præsidio nouimus: murisq; aranei morsus equè letales, ab ipso redacti in puluerem, superpositoq; citra dolorem iuari. Similiter qui à uipera sunt percussi, effugiunt periculum, si trita ipsarum corpora uulneribus imponantur. Etenim si quid ueneri in uiperea carne est relictum, id multiplex ea præparatio delet: plurimum autem illi facultatis auxiliatricis

largitur. Cantharis nāq; sola exhibita, uescicam exulcerat, & inimicum est ipsi medicamentum, sæpenumeroq; sua facultate uehementi, hominem iugulat: mista uerò quibusdam alijs, salutaris uescicæ reddit, urināq; uehementer prouocat. Succus etiam papaueris, q̄ potus per se, admodum perniciosus existat, latere neminem arbitror: sin autem cum nonnullis alijs sit præparatus, ægros ita subinde iuuat, ut maximè salutiferum esse ipsis medicamentum uideatur. Itaq; phreniticorum deliria sæpe generosè curauit: destitutosq; robore, ob diurnas uigilias, concilians illis somnum, manifestè restituit. Quin etiam ab araneis cōmorfos, ipsi aranei triti, & cum uino poti, malo liberant. Si igitur solū uinum feris mistum, à periculo reddit securos, nimirū theriaca maximè salutare medicamē existet, utpote ex tot talibusq; confecta pharmacis, quorum qualitates totæ per totas miscentur, & alterantur, conspirantesq; in unam eādemq; naturalem temperiem, communem quandam facultatem atq; naturā adquirunt, ab ea diuersam, quæ antea singulis inerat. Eligenda tamē sunt, explorandaq; singula medicamenta, prius q̄ antidoto indantur: solent quippe à fraudulentis hominibus q̄ creberrimè adulterari. Vnius autem cuiuspiam uitium, subinde uniuerfa contaminat. Porro quum uarij uariè hanc antidotum præparent, nos compositione Andromachi, ceu omnium præstantissima uiuimur: in regiosq; usus eam præparamus. Venari autem oportet uiperas initio ueris, quū latebris relictis, foras in apri- cum prodeunt, & non adhuc uirus tam exitiale retinent. Intus nanq; delitescentes, quum nulla ex parte diffsentur, magis sunt perniciosæ. At egressæ, exuium, crassum tegumentum, solent deponere. Quare non statim ipsas capere oportet, sed permittere, ut aere aliquandiu fruantur, consuetōq; uescantur cibo, hoc est herbis, buprestibus, cantharidibus, & pi-

Cantharis per se, uescicā exulcerat, alijs autē admista salutare illius redditur medicamē. Papaueris succi facultas

Aranei triti potius ex uino, morfos ab ipsis, afferunt, Theriacem cōstituentiū pharmacorū qualitates, totas per totas misceri, conspirareq; in naturalem quandā cōmuniq; omnium temperiem.

Theriace Andromachi præfertur cæteris. Vipere qū uenandæ.

Viperæ quales sine deligendæ tyocampis. Eligendæ autē sunt colore sufflauxæ, * exi-
 mia quadam agilitate mobiles, ceruices admodū extē-
 sas habentes, oculos q̄; tum inflammatos, tum impu-
 dentes, atq; adeò intuentes ferinum. Sint etiam latiore
 capite, corpore autem atq; uentre crassiori, meatum q̄;
 habeant magis ad extremum caudæ locatum: quæ nō
 inuoluta, sed potius conuersa esse debet: ac deniq; tran-
 quillum incedant: qua sanè re à masculo distinguit fœ-
 mina: q̄ q̄; caninos dentes habeat plures duobus. Iam
 uerò si caudis capitibus q̄; amputatis, exanguia protin-
 us, imobilia q̄; ac prorsus mortua, ipsa animalia cer-
 nantur, ad medicaminis compositionē non conferunt.
 At si motum, sanguinem q̄; cōseruare aliquandiu pos-
 sint, tunc eas, ceu præstantissimas coques ad conficien-
 dos trochiscos, quatenus dictum est. Porro medicamē-
 ta reliqua, contundere, cribro q̄; incernere q̄; subtilissi-
 mo oportet: nam leuia insigniter admodum mihi iua-
 re uidentur, q̄; facilius apponantur corporibus. Quæ
 conspergenda iæuiganda q̄; sunt, ea uino Phalerno læ-
 uigentur & conspergantur. Deinde omnibus in hunc
 modum contritis, Hymettii mellis mediocriter cocti,
 libras denas adijcies. At resinam chalbanum q̄; seor-
 sum prius eliquata, in mortario postea ipsi medicamē-
 to immiscebis: omnia q̄; tandem manibus modicè opo-
 balsamo intinctis, simul atq; accuratè confundes; atq;
 itaq; antidotum in uitreis aut argenteis uasis repones.
 Non autem uehementer ipsa replebis, sed relicto quo-
 dam spatio, quo medicamentum perspiret. Quare fre-
 quenter operculum detrahes, ut & liberius exhalet, &
 maturior tibi ipsius usus contingat. Quippe haud mo-
 dico tempore ad concoctionē indiget, ut quando usus
 postulet, antidotus probè sit cocta. Concoquitur autē
 plurimum duodecim annorum spatio. Cæterum qui
 uigentiore ipsa uti uolūt, etiam quinto anno, septimo q̄;
 eam exhibent: præsertim ijs qui à uirulentis bestijs

**Viperæ fœmi-
 næ masculiq;
 discrimina.**

**Theriaces con-
 ficiundæ ratio.**

**Theriacē repo-
 nendi ratio.**

**Theriacē duo-
 decim annis
 ad perfectionē
 cōcoqui effectq;
 validam vsq;**

& à cane rabido sunt commorſi: nec non in medicamē-
tis letalibus. Eſt autem potens medicamentum aduſq;
triginta annos. Nam in alijs affectibus, ubi tanta noxę
cauſa nō eſt, ſufficere uidetur, quum uſus exigit, etiam
ſexagenarium. Etenim ubi huius antidoti facultas eſt
ualida, ſi ſumatur poſt pharmacum purgans, eius ope-
rationem ſupprimi: ſi uerò imbecilla, minimè purga-
tionem impedit. Juxta differentias autem affectuum,
ipſius medicamenti quantitatem metimur, congruumq;
miſturę modum adminiſtramus. Siquidē præter affe-
ctus dictos, capitis diuturnos dolores atq; uertigines
ſanat, auditusq; difficultatem, & oculorum hebetudi-
nem corrigit. Comitialibus etiam opitulatur, reiſcien-
tesq; ſanguinem plurimum iuuat, ſi quis ipſam cum
ſymphyto decoctam, dilutamq; ex aqua exhibuerit. In-
ſuper inteſtinorū uermes exterminat, hepaticos & lie-
noſos reſtituit, dyſenterias, lienterias, uoluulosq; præ-
ſertim quum inteſtina uacant inflāmate, perſanat.
Præterea quum corpus multis & copioſis ſudoribus
diffluit, ipſiusq; robur eſt exolutum, nec morbus uini
potionem admittit, theriace epota ſudorē ſiſtit, & col-
lapſas uireis corroborat. Tam uerò in mulieribus etiā
menſes educi, & uteri ſedisq; ſuppreſſas hæmorrhoi-
das ſubinde aperit. Nam quum uaria miſtaq; facul-
tate ſit prædita, ideo alia diſfundens, extenuansq;, co-
git ut excernantur; alia ob uirtutis imbecillitatem præ-
ter modum fluentia, ſolet, uires inſtaurans, cohibere.
Quinetiam uniuerſis articularibus morbis auxilio eſt,
quum præterierit augmenti tēpus, uigorisq; ſtatus ac-
ceſſerit. Tunc nāq; ſomentis dolorem leniens, antido-
tum ꝑꝑinabis: quæ ſanè fluxiones inſarctas diſcutiet,
& irruētes arcebit. Prodeſt theriace & ſanis, ſi crebro
ipſam aſſumant. Hoc auxilio uſi ſæpe ſuccurrimus ele-
phlāticis. Nec uerò corporis tantum, ſed animi quoq;
affectibus auxiliatur. Quippe melancholicis uitijſ, ſi

ad annos. trigi-
ta, iuuareq; ēē
ſexagenariam

Theriace præ-
bandę ratio.

Theriace qui-
bus opituletur
affectibus.

Theriace cor-
poris & animi
affectibus au-
xiliatur

Quartanæ febris curatio.

sæpe exhibeatur, medetur, ipsam atram bilem exhauriens: quare pulchrè ad febrem etiam quartanam conuenit, quâdoquidem ab atra bile trahit ortum. Ego igitur multos laborantes quartana, hoc præsidio facile liberavi. Nam uomitu prius secundum cibum ipsos euacuans: deinde in sequenti die succû absynthij exhibēs, ita horis duabus ante accessionem ppino antidotum, protinusq; æger frequenter liberatur ab accessione.

Aquæ pauoris omniū morborū pessimi descriptio.

Aquæ etiam pauorem, omnium morborum pessimū, qui morfos à cane rabido sæpe inuadere solet, tollere hoc medicamen consuevit. Quo quidem morbo correpti, aquam timent, ac propter multam ariditatem, humidi desiderio tenentur: cæterum à potu abstinent, quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non considerant. Proinde fit, ut aquam fugientes, inarescât, & conuellantur; ob febrim qua intus uruntur: miserrimoq; tandem mortis genere intereant. Canem porrò

Canis rabidi notæ.

furentem & rabidum, ab eo qui nihil tale perpeffus sit facilè digno cære licet. Siquidem si audieris gracilem corpore, siccum, oculis inflāmat, cauda demissa, spumante ore, lingua exerta, eaq; bilis colore infecta, obuium quemq; insiliisse, citraq; rationem cucurrisse: deinde rursus subitò uolentem consistere, furore quodā infano percitum, momordisse non sibi antea præuisos:

Morsus a rabido cane contra cū curatio.

Morsum rabidi canis esse conseruandū. apertū, ut minimum quadraginta dies.

Theriacē etiā ad mortā vulnere, auxiliari canis rabidi mor sui.

hæc inquam si in eo sic habere intellexeris, statim rabidum esse canem intelliges. Quare uulnus ab ipso illatum longè uastius efficies, carne multo interuallo orbiculatim præcisa, ne facilè ad cicatricem perueniat: sed foramen diu, quadraginta ut minimum diebus, patefcat, ut per ipsum canis uirus emanet. Cauterij igitur, admodum candentibus locū solemus adurere, et alijs uti medicamentis, quæ extrahendi uim obtinent. Ego uerò antidotum ipsam rosaceo mistam aliquando in uulnus indidi, ut cucurbitule instar exugeret, ab altoq; uirus ipsum extraheret: ut quæ nō modò epota, sed etiā

admota extrinsecus rabidorum morfibus presentaneū
 remedium existat. Sed neq; ad pestilentem luem (quæ
 & ipsa ueluti fera quædam existens, ab aeris putredine
 exorta, per inspirationes insiliens, haud unum aut alte-
 rum hominem, sed plures quoq; ciuitates depascit, ua-
 stat, & populaſ) reperire est aliud efficacius remediū.
 Nam quemadmodum cōstat Diuum illum Hippocra-
 tem, per solam alterationem aeris, discusſiſſe olim ab
 Athenis pestilentem eius cōstitutionem, nimirum per
 rotam urbem ex aromaticis lignis, & suauissimis flori-
 bus, uarijs pyris extructis, ut aerem purum hoc modo
 redditum, inspirarent homines in mali subsidium: si-
 mili ratione theriace, ceu ipsa quoq; ignis quidam pur-
 gatorius existat, præsumentes quidem ipsam in pesti-
 lenti aeris statu, neutiq; malo corripī finit: correptis au-
 tem mederi potest, malitiam inspirati aeris inalterās,
 nec ipsam amplius grassari permittēs. Quare in pro-
 spera quoq; ualetudine, ut crebro utaris hac antidoto,
 consulo, sed præcipuè dum per horridam hyemē iter
 facturus es. Iam uerò antidotus hæc sensus omnes cō-
 firmat, acuit mentem, adeoq; ob uarietatem miscellæ,
 ab iniurijs corpus securum facit, ut ne à deletherijs quī-
 dem euinci possit: ut fertur de Mithridate, qui non the-
 riace (ut quæ nōdum erat) sed alia antidoto, quam Mi-
 thridation appellauit suo nomine, præmunitus, nō po-
 tuit ueneno interire. Quum enim à Pompeio uictus,
 in extremis cogeretur sibi fano per uenenum mortē
 conciscere, medicamento copioso epoto, ipse quidem
 ob presumptam antidotum, defungi uita non potuit: si-
 liæ autem, quæ ob eximium erga patrem amorem, op-
 petere cum eo mortem uolentes, idem medicamētum
 hauserunt, subito animam exhalauerunt. Quod Mithri-
 dates sentiens, Pyſto suo familiari iniūxit, ut ipsum iu-
 gularēt: qui pharmaci opus absoluens ferro, eum mo-
 ri uiolenter coegit. At uerò theriace utendum est post

Pestilentē luē
 esse ueluti fe-
 ram quādam,
 ab aeris putre-
 dine exortam,
 eiq; nihil effi-
 caciū theriace
 Pestilentia ab
 Athenis abe-
 git Hippocra-
 tes, per totā vr-
 bē varias py-
 ras ex materia
 aromatica ex-
 truens.

Theriaca, ceu
 ignis purgato-
 rius existit

Mithridates præ-
 munitus anti-
 doto, uinci a
 ueneno nō po-
 tuit, ac proin-
 de opus medi-
 camenti perfe-
 cit ferro.

*Theriace vten
dum esse post
absolutam co-
ctionem,*

*Theriaces pro
pinandæ quan-
titas.*

*Theriaces v-
sus qbus ætati-
bus & tpiibus
congruat, et q-
bus minime.*

*Theriace cor-
pora puerorū
dissoluit.*

absolutam coctionem, interdum quidem instar Aegyptiæ fabæ, cum binis aquæ cyathis, ubi exiguum ad coctionem ipsius interuallum erit; interim uerò auelanæ nucis magnitudine, ex tribus aquæ cyathis, quū plus temporis ad pharmaci distributionem es habiturus. Cæterum per æstatem neutiq̃ id pharmacum capere consuluerim. Similiter ætate florentibus, calidis si misq; naturis, nec multum, nec sæpe id exhibendum censeo: ijs uerò qui iam inclinant, & plurimum, & crebro, non ex aqua, sed ex uino, ut propinetur, suadeo. In pueris omnino uitandum id medicamen est: ut quod facile corpora eorum dissoluat. Memini siquidem aliquando puellum ex intempestiuo usu antidoti dissolutum fuisse.

De salibus theriacis.

S Ales theriaci ad prædictos etiam affectus faciunt, modicè tamen ac longo tempore. Neq; enim euanescit ipsorum facultas, tametsi ex cōbustis uiperis cōficiantur. Multa siquidem euadunt ignis commercio meliora: aut latentem naturam edunt. Aurum quippe iudicamus per ignem: adulteratumq; igne coarguitur: ac flamma exacte purgatum, esse probū apparet. Ferrum igne mollescit, flexūq; nobis ad multos uitæ usus est aptum. Nunquid etiam plurima quæ ingeruntur in corpus, nutriendis nobis ignis beneficio idonea redduntur? Etenim (ut alia præteream) uinum statim ab uuis præssum, est crudum: a Solis autem igne concoctum, suauissimū & maximè potabile reddit. Chalcitis etiā, cruda quidem corpora exurit: cocta uerò cicatricem inducit corporibus. Lapis phrygius crudus, acerrimus est: ignitus & cum alijs quibusdam tritus, fit oculorū præsentaneum remedium. Spongiæ combustæ cinis, sanguinis fluxionem potenter inhibet. Viperae itaq; simul omnes integræq; combustæ, insitam prauitatem deponunt: ab igneq; salutes redduntur. Peculiariter

*Aurum iudica-
ri per ignem.*

*Ferrum igne
mollescere.*

*Viperas cōbu-
stas, salutes
ab igne reddi.*

THER. AD PIOSONEM 463

autem sales medentur maximè affectibus per summā cutem obortis, leucis enim dico, lepræ, atq; agresti im petigini: abiguntq; pedunculos, propriè ex corruptione enascentes. Præterea dentes optimè abstergunt, erodiq; ipsos nō permittunt, ac flaccidas gingiuas con densant, earumq; fluorem atq; putrilaginē reprimunt.

Sales Theriaci quibus auxiliē rur affectibus.

Præparatio autem eorum est talis. Viperæ prædi ctis similes, & eodem tēpore captæ, numero quatuor, non biduo post uenationem sumuntur. Præstiterit ta men si eodem die quo sunt captæ, ijs utaris. Dein salis ammoniaci, uel cōmunis, colore albi, & leniter splen dentis, modius Italicus. Cum quo tunduntur minuta tim, Gentianæ Creticæ, lib. .j. S. aristolochiæ rotundæ, tantundem. Centaurij tenuis comæ, lib. .ij. cardamomi, Armeniaci prasi, sing. vnc. .vj. Scordij mōtani, selini, chamædryos Creticæ sing. lib. .j. rutæ fatiuræ seminis, tantundem. Melle Attico hæc uniuntur: & selibra ip sorum in ollam fictilē uacuam coniicitur. Postea qua tuor serpentes uiuæ: mox scillæ teneræ, admodumq; recentes, quinq; numero, conciduntur minutim: ita re liqua aliorum pars dimidia adijcitur: atq; ubi coope rueris ollam, lutoq; diligenter obliueres, quatuor fora minibus ipsam pertundes, ut per eam uapor coctionis mensuram indicet. Nam primūm fumus copiosus, ob scurus, turbidusq; expirare uidebitur, notans ignem iam inuasisse bestias: quē quidem ne inspiret ipse, tibi summè cauendū est. Postea ubi uapor cessauerit, et te nuem quandam flammam per foramina exhibere con spexeris, tunc ipsa exquisitè esse cocta censeto: atq; ita ollam ab igne tollito, tota eam die ac nocte refrigerās. Deinde exemptos carbones, diligenter eos tundito, & cum his quæ subdam, incernito. Rutæ agrestis semi nis, hyssopi Cretici, sing. vnc. .ix. agrestis fœniculi se minis, nardi Celticæ, stachyos Scythicæ, sing. vnc. .vj. petroselini Macedonici, vnc. .iiij. amomi uux, vnc.

Sales Theria cos præparādi ratio.

iij. origani heracliotici summitatum, vnc. ix. hormini se-
 minis torrefacti, vnc. iij. thymi Attici summitatū, vnc.
 ix. Malabathri Indici fol. vnc. iij. baccarum iuniperi
 Laconici carnis, lib. ij. coriandri satiui sem. vnc. vj. pi-
 peris albi & nigri, sing. vnc. ij. silphij rad. vnc. x. zingi-
 beris, lib. ij. satyrj sem. uel rad. pulegij montani, seselis
 Massaliotici rufi, tortili montani seminis, mēthē, sing.
 vnc. vj. calix optimæ vnc. ij. cinnamomi vnc. j. Rur-
 sus omnia contundito, concernito; & reponito in ui-
 treis uasis; neq; utaris ipsis nisi post dies ferè denos.
 Porro ego sales ipsos aliàs preparauī, non uiperas, sed
 earum loco, tantundem theriacorum pastillorum, unā
 cum alijs medicamentis comburens: qua industria ip-
 sos longè præstantissimos feci.



FINIS.



Quæ habentur in libello de theriaca ad
 Pamphilianum, ea omnia huic qui
 ad Pisonē inscribitur insunt
 lōge cumulatiora. Qua
 illum ex industria
 reliquimus.

Galenj

GALENI PERGAS

MENI DE ANTIDOTIS

LIBER PRIMVS.



EDICAMENTA quæ nō extrinsecus corpi imposita, sed intra ipsum assumpta, affectibus auxiliantur, antidotos Medici appellant. Tres autem in uniuersum differentiæ ipsarū existunt. Nonnullæ siquidem letaliū

Antidoti quæ dicantur.

Antidotorum tres differentiæ.

Theriace, Mithridatium ab usu expulit.

medicamentorum gratia offeruntur: quædam contra uirulentas feras opitulatur: aliæ affectibus ex praua uictus ratione obortis succurrunt. Sunt quæ tres hosce polliceantur usus, ut theriace ab Andrcmacho præparata, quæ Mithridation dictam ab usu hominum relegauit. Siquidem quum theriace haud exiguam uiperarum carnem contineat, hoc nomine ad uiperarum morsus præstantior quæ Mithridation existit. Ad alia uerò Mithridation nihilo minus ualet: imò est etiam in quibus præstantius se exhibeat. At non easdem uires

Antidotos dū post uenenum dantur, libera, lius esse exhibēdas, quæ si præsumerentur.

obtinent ipsæ antidoti, & post noxia medicamenta, & ante eadem assumptæ. Nam quæ ipsarum quantitas, quum præsumuntur, sufficit ut hominem illesum cuius odia, ea quadruplo, aut quincuplo aucta, quum post uenenū datur, auxilio est: id quod non semel quotidie, sed bis. Quod si quis etiam singulis diebus, quemadmodum nostro sæculo Imperator Aurelius Antoninus, uel ut ipse Mithridates, medicamentum capiat, omnino à deleterijs uenenis erit securus: ut Mithridatem ferunt, quum exitiali hausto medicamento, potius mortem oppetere, quæ subijci Romano Imperio, elegisset, nihil reperisse, quod perimere ipsum potuerit. Porro Antoninus summo studio, singulis diebus ex ipsa theriace, instar fabæ Aegyptiæ, deglutiebat citra ullum liquorem: à qua postea,

Mithridates cōmunitus antidoto, perimere se ueneno non potuit.

Antonin⁹ Imp. singulis diebus utebatur theriace, instar Aegyptiæ fabæ.

Antidoti vetu-
stiores, papau-
ris lachrymam
longe mitiore
possident.

Galenū medi-
camentorū cō-
quirendorū gra-
tia, varias plu-
strasse regiōes
Medicamenta
explorandi rō,
Mel optimum
quale nam es-
se debeat.

Vina, quæ ce-
lesterrime oīum
inueterentur.

Veterascentiū
vinorum quali-
tas est acrimo-
nia cū perspi-
cuo calore, cui
postea succedit
amaritudo.

Vina reponen-
di ratio.

Tepidus locus
vina in aco-
re vertit.

quum in quotidianis actionibus premeretur sopore,
detraxit papaueris succum. Rursus autem quum cru-
ciaretur uigilijs, coactus fuit ex Theriace inueterata, ce-
terum ex opio confecta, aliquantulum addere. Quippe
eiusmodi medicamenta, si uetustiora sint, ipsam papa-
ueris lachrymam longè mitiorem obtinent. Danda au-
tem maximè opera est, ut medicamenta ex quibus hu-
iuscemodi antidoti præparantur, quæ exploratissima sint:
quãdoquidem passim solent adulterari. Quæ quidem
ut exquisitissima haberem, ipse inuisi aliàs tum Cy-
prum, tum Palestinam Syriæ nauigauit; in Lemnum.
Porro in quo singula medicamenta alijs gustu aut odo-
re præstant, in illo sanè, id quod ualidum est, principè
inter similia specie, sibi uendicat locum. Sic enim mel
dicimus præstantissimum esse, quod dulcissimum &
acerrimum inter omnia alia fuerit: quodq; colore palli-
dum, media sit consistētia, defluensq; sensim, suam cō-
tinuitatem tueatur. Danda autem opera est, ut quod ui-
num hisce medicamentis miscetur, ualidum atq; firmis-
simum sit, ita ut non immutetur amplius. Etenim im-
becillima & aquatissima uina, aut uehementer auste-
ra, maximèq; omnium uinorum acescentia (hæc enim
sunt alba & tenuia) ubi præuenerint primis annis ace-
scere, reliquo tēpore permanēt. Hæc autē ut caput mi-
nimè feriunt, sic nec corpus manifestè calfaciunt, nec
concoctioni in uentriculo & uenis quicquid perspicuè
conferunt, nec alendo corpori subministrant: quãuis
inter omnia uina celerrimè inueterentur: hoc est, prom-
ptè in ueterascentium qualitatem mutantur: quæ qua-
litas, acrimonia est cum perspicuo calore: postea ue-
rò, amaror, in quem acrimonia mutatur. Cæterum ut
uina ipsa uel acorem, uel amaritudinem contrahant,
locus in quo asseruantur reposita, confert. Qui quidem
optimus initio est frigidus: postea uerò calidus, aut ecō-
trario, calidus p̄ initia. Nam tepidus, facillè ipsa in aco-

rem uertit. Nonnulla autē sunt adeo imbecilla & aquosa, ut ne initio quidem frigus tolerant. Ac talium custodia, ut ne initio quidem frigus tolerant. Ac talium custodia gratia, Pater meus stœbe copiosa calidaq; in calidissimam domum coniecta, uasa repleta occultabat: qua industria usus, nunq̃ habuit acidum uinum, sed celerrimè omnia ueterascentia. Quo autem nunq̃ ab scopo aberraret, uasis infundebat uinum non nouis, sed ex quibus aliquod iam uetus uacuasset: curabatq; ut furni, fociq; in propinquo ipsi thecæ uinariæ essent: qua ratione etiam in multis Italiæ locis uinum calfieri intellexi. Verum quæ in hunc modum parantur uina, ut firma durabiliaq; sunt, sic capitis dolorem conciliant, propter fumi qualitatem quam contraxerunt. Itaq; eiusmodi omnia uina in medicamentis componendis, quæ intra corpus sumenda sunt, euitabis. In emplastris uerò, & alijs quæ extrinsecus imponuntur medicamentis, etiam talibus uti, si meliora desint, nihil prohibet. Ad antidotos ergo Phalernum uinum, quod nondum præ uetustate amaricer, optimum est. Præstat autē ad theriacem deligere id quod dulcius fuerit, gratia gustus gratioris: cuius sollicitudo in medicamentis quæ deglutiuntur, habenda est. Iam uerò mel omne uetustum, redditur ex coctione amarum: neq; id mirum est, quum uel citra cocturam, tēpore amarius ex dulciori reddatur. Quare quod fuerit inueteratum, suffragandum ad antidotos est. In uniuersum autem, Medicum debere esse peritum omnium stirpium, aut plurimarū, oportet. Siquidē compositorū medicaminū uirtus uires simplicium sequit̃: exigua quadā, in ipsa compositionis ratione differentia obueniente. Differentiæ autem stirpium sunt, arbores, frutices, herbe, sping, uirgulta. Porro theriaces compositio quam descripsit carmine Andromachus, habet in hunc modum.

Stœben cōducere ad celere concoctionem uinorum.

Vina quæ maturuerunt præsidio ignis, capitis dolorem conciliant.

Vina antidotis emplastrisq; commoda, qualia esse debeant.

Mel uetustum ex coctione amaricatur, id quod tēpore uel citra cocturam perpetitur.

Compositorū uirtus, uires simplicium sequitur.

Stirpiū differentiæ quæ sunt.

Hinc recitat Galenus carmina Andromachi, ac de

inceps rationem conficiendæ Theriaces explicat, quæ omnia cōsultò reliquimus, q̃ sint prorsus eadem quæ habentur in cōmētario ad Pisonē. Itaq; ea tantū anno tabimus impræsentiarum, quorū in illo non meminit.

Galenus.

Viperas venā
diratio.

Quod pertinet ad uiperarū capturas, neq; iuxta marina loca, aut aquas saluginosas uenandæ sunt. Quippe antidotum ex huiusmodi compositum uiperis, sitim conciliat. A foetis etiam est abstineñdum. Iam uerò, dum coquuntur, salis inq̃ci debet, si quidem conuenienti tempore uiperas cœperis, modicum; sin

Artificos The-
riacos conficiē
di ratio.

autem æstate, nihil. Panis ad conficiendos artificos so-
leo miscere ipse uipereis carnibus quartam, aut quin-
tam partem. Qui nisi probè sit tostus, uerèdum est, ne
pharmacum ipsum acescat. Satius autem est ut multo
citius siccentur, aridum panem cum ipsis carnibus ac-
curatissimè læuigare, ac sic tenues orbiculos fingere:

Vasa vitrea
vel aurea nul-
lum dolum ad
mittere, stānea
aut adulterari
plūbi mixtura
ac p̃inde able-
ganda ab an-
tidotis.

q̃ si etiam brodium uiperarum affundas. Reponi autē
debent ubi assicati fuerint, in uase stanneo, uitreo'ue,
aut aureo. Cæterū uitreum quidem & aureum, nul-
lum dolum admittit: stanneū uerò, adulteratur plum-
bi mixtura. Tale igitur uitare conuenit in uniuersis an-
tidotis: ueluti & quod argento non purgato cōfectum
est. Celerrimè nāq; & huic ærugo oboritur. Durat ui-
gor ipsorum orbiculorum, si curiosè sint resiccati, & re-
positi, tribus & quatuor annis. At scillini trochisci,
ex tribus scillæ optimè tostę p̃tribus, & duabus tenuis-
simę farinæ erui, similiter conficiuntur.

Scillonorum
confectio.

Post hæc subdidit Gale. descriptionem magmatis
Hedychroi, quam habes in commentario de theriaca
ad Pisonem.

Galenus.

Piper longum
adulteratū affu-
sa aqua soluit.

EX medicamentis quæ theriacem constituunt, lon-
gū piper solet adulterari. Cæterū adulteratum

quidem, affusa aqua soluitur: quod uerò adulterio caret, insolubile permanet. Contra autem, uerum sagapenum, statim aqua rigatum soluitur: quod non tale est, eliquescit minimè. Sciendum autem est, chalbanipartem, in sagapenum degenerare. Similiter etiā optima cassia in cinnamomum transit. Nec secus in optima myrrha opocalpason reperitur, ab ipsa myrrha diuersum. At opocalpason est letale: multisq; ob inscitiam myrrhæ, quæ opocalpason continebat, conciliauit exitium. Nam de industria nonnulli antidotum præparatum, ipsam ut laudatissimam iniecerunt: quod collyrijs inditam, optimum esse medicamentum uiderent. Quemadmodum igitur in pueris gemellis inuicem similibus, qui quidem nō eis assueuerunt, alterū ab altero nequeunt discernere: ijs autem qui unā uixerunt, facillima est ipsorum dignotio: ita qui inter singula medicamenta est uersatus, facilè uel minimas eorum differentias cognoscit, quæ latent illos, qui ipsa semel tantum, aut bis, conspexerint. Rosæ ad theriacem eligendæ sunt alijs omnibus rubentiores, atq; odoratæ magis. Vnumquodq; siquidem præstantissimū est, quod proprium generis sui odorem ualentissimū possidet. Præstant etiam in quolibet genere, nō rugosa, neq; exilia, sed quæ probè nutritam, solidamq; consistentiam fortiuntur. Scordium optimum, ex Creta nobis aduehitur, quod quidem cadauera supra ipsum iacētia, diutissimè tueri à putredine proditur. Opobalsamum aduultera plurimis modis, quos premo, ne quis sorte doctrina mea abutatur. Quare neq; eos probō, qui scripturas letaliū medicamentorū inuulgant. Porro cinnamomum optimū debet odoratissimum esse, gustāci calidū, colore aut tale, ut si quis lactis colorē fusco admiscuerit, cum cœrulei pauxillo. At agaricum (quod sanè adulterium nullum admittit) laudatissimum est quod leuissimum: ut densum, graue, & lignosum, deterriū.

Sagapenum
aqua rigatum
soluitur.

Chalbanipars
transit in sagapenum.

Cassia in cinnamomum conuertitur.

Opocalpason
est letale, reperiturq; in myrrha.

Præstantissimum esse medicamentū quod propriū generis sui odorem ualentissimum possidet.

Scordiū cadauera incorrupta tuetur,

Letalium medicamentorum doctrinam inuulgandam nō esse.

Cinnamomi optimi notæ. Agarici optimi notæ.

Croci optimi nota.

Carpesij facultas.

Spica nardi radix est, sed ob similitudinem quam cum spicis habet, sic appellatur. Rheon adulterandi modus.

Rheon esse vehementer astringens gustui.

Crocus optimus est, qui flauissimus, odoratissimusque existens, longo tempore in uigore perdurat. Iam uero in cinnamomi penuria, duplicata cassiæ portio inijcienda est. Carpesio etiam sæpe loco phu utimur. Est enim similis genere cum eo facultatis, sed ualentioris: nonnihilque odoratum refert. Sunt enim tenues festucae, surculis cinnamomi persimiles. Nardus Indica, quæ radix quidem est (licet ob similitudinem formæ quâ cum spicis habet, spica nardi uocetur) non est emenda elota. Unguentarii quippe, coquentes prius eam, ut ad alia ipsius decocto utantur, postea inutilem uendunt. Rheon quoque ipsum adulteratur. Quandoquidem statim in regionibus ubi gignitur, recens nonnulli capientes ipsum, decoquunt, donec totum cremorem reddat: quem postea cremorem, ubi accuratius percoxerint, cum purum, atque ab aquæ mistura alienum, ad nos transmittunt: sicuti & rheon ipsum siccatum, tanquam neque id prius cocturam fuerit expertum. Cognoscetur tamen facile dolus: nam eiusmodi rheon nec densam, compactam uel substantiam possidet, ut quod integrum est, sed rarius apparet, astrictionemque aut obscuram, aut planè nullam gustanti exhibet: quam tamen rheon uigens ualidissimam possidet.

Deinceps Galenus modum præparandæ Theriacis tradit: qui quidem iam expositus est, in commentario ad Pisonem. Subiungit etiam compositiones eiusdem antidoti, à Damocrate, atque etiam Critone proditæ, quas quidem (quia descriptionem Andromachi unice commendat Galenus, eiusque esse inhærendum censet) studiosi breuitatis omittimus.

GALENI PERGAMENI DE ANTIDOTIS,

Liber Secundus.



QVANDOQVIDEM de the-
riace toto priore libro tractauimus,
in præsentī de cæteris antidotis disse-
ramus, ab ijs quæ Andromachus de-
scripsit, exorſi.

Antidotus Mi-
thridatia, ad letalia peculiariter effi-
cax, ad omnesq; internos affectus. Dulcis radiculæ,
drach. viij. S. obolos. iij. opij drach. iij. obol. ij. castorei,
drach. vj. polij, drach. v. obol. ij. costi tantundem. spice-
nardi, drach. vj. obol. ij. cassiæ drach. v. obol. ij. thuris
drach. vj. seseleos drach. v. obo. ij. hypocisthidis succi,
drach. vj. achori drach. ij. scordij drach. vj. obol. ij. fo-
lij drach. iij. salis drach. vj. cypheos. drach. vj. obol. ij.
myrrhæ drach. vj. croci drach. viij. obol. ij. cinnamomi
tantundem. styracis drach. v. obol. iij. dauci seminis
drach. vj. obol. iij. zingiberis drach. vj. obol. ij. plu Pō-
tici drach. ij. petroselini, drach. iij. obol. ij. nardi Gal-
licæ, fœniculi seminis, nardi Indicæ, sing. drach. iij. hy-
perici, acaciæ, utriusq; drach. ij. gentianæ drach. iij. ani-
ſi, drach. ij. Thlapsi drach. vj. obol. iij. meu athaman-
tici drach. iij. rosarum siccarum, cardamomi, sing. dra-
ch. iij. gummi, drach. ij. iunci odorati rotūdi. drach. vj.
obol. ij. opopanacis tantūdem. opobalsami drach. vj.
obol. iij. chalbani drach. viij. scinci drach. ij. obol. ij. re-
sinæ terebinthinæ drach. vj. obol. ij. uini Chii. quod sit
satis, mellis Attici cocti quantum sat esse uideatur.

Conficito.

Antidotus Aelii Gaii, ad letalia & ui-
rulenta omnia: quæ, si inspergatur ubi frequentant ser-
pentes, eos fugat. Facit ad omnem oculurum fluxum,
& reliquarum partium. Discutit omnes molestias ani-

Antidoti Mitri
datiæ descri-
ptio.

Antidotus.
Aelii fugans
serpentes, ad
cōpluresq; af-
fectus p. utilis.

mi, febresq; longas & circuitu repetentes per sanat. Ad hæc, menses, foetusq; abscq; difficultate educit, auxiliaturq; phthisicis, auellanæ nucis instar epota, cū aque cyathis quaternis. Ad uipereos tamen morsus, ex uino exhibetur. Myrrhæ drach. xij. croci, nardi, utriusq; drach. xij. iunci odorati rotundi, drach. xij. cinnamomi drach. ij. amomi drach. iij. chalbanī drach. ix. resinæ terebinthinæ drach. v. piperis albi drach. x. longi drach. xxxij. costi drach. viij. thuris drach. xij. lachrymę paueris tantūdem. scordii, drach. l. polii drach. iij. hypocisthidis succi drach. xij. petroselinī drach. viij. fœlis drach. xiiij. dauci seminis drach. xvj. opobalsami drach. xij. opopanacis tantundē. castorei, drach. viij. mellis Aetici, sextar. ij. Conficito.

Antidotus ex
sanguinibus a
Damocrate
scripta.

Damocratis Antidotus ex sanguinibus ad uenena. Sanguinis anserini, & marinæ testudinis, & anatis, & hædini, siccorū omnium, sing. drach. ij. Myrrhæ stillauitæ, spice nardi, sing. drach. x. cinnamomi drach. vj. rosę sol. sic. drach. viij. iunci rotundi, thuris, costi, sing. drach. j. amomi, piperis albi, utriusq; drach. iij. piperis longi, drach. j. S. croci drach. xij. cassiæ drach. viij. trifolij radicis, drach. v. polii tantundem. opobalsami drach. iij. petroselinī, drach. iij. baccarum iuniperi, acori, rheu pontici, meu, dictāni, phu, ammoniaci thymiamatis, fœniculi, sing. drach. ij. agarici drach. ij. S. saxatilis rutæ, drach. iij. dauci, drach. ij. anisi, asari, ameos, cumini, sing. drach. j. S. sem. napi syluestris, drach. iij. scordii Cretenis, drach. v. mellis optimi duplum omnium. Detrita omnia, coctoq; melle excepta, uasis indito.

Rosaceorū pa-
stillorū confe-
ctio ex Damo-
crate.

Rosacei pastilli confectio ex Damocrate. Rosę uirentis foliorum, lib. iij. iunci rotundi, drach. xx. myrrhę drach. xij. croci drach. viij. Contusis rosīs atq; per seraceum transmis- sis, addantur reliqua cōminuta: ac postea rursus simul tundantur, rediganturq; in prægrandes orbiculos.

Crocomagma
tis præparatio.

Crocomagmatis præparatio Croci Cilicii drach. C.

myrrhæ pinguis, rosarum siccarū, amyli, gummi sing. drach. L. Omnia uino odorato, marinæ aquæ experte, excipiātur & læuigētur, ac deniq; in trochiscos fringantur.

Antidotus præfagiens nomine: qua ebibita, uenenum cum cibo sumptum, prorsus reddetur uomitu. Lemniæ terræ, drach. j. obol. ij. baccarum iuniprii, drach. ij. læuigentur exactè cum olei dulcis paulillo. Propinatur ex mulsa, nucis ponticæ magnitudo.

Asclepiadis ad eos qui letalia biberunt, remedia.

Papaueris lachryma epota, confert mouere uomitum ex hydrelæo calente, uel ex oxycrato calido: aluum q; clysmis subducere. Opio epoto, merū copiosius, statim bibitum iuuat: aut piper cum uino. Conducit etiam lac asininum haustum: atq; clysmi mitiores. Sumpto aconito, iuuat manipulum rutæ, leuigatum uino meraciori, ebibere. Si altercū nocuit, lac asininum, uel quoduis aliud, cum mulsa calida opitulatur. Si tiriide coriādrum, auxiliatur uinum meracum potum, & pinguius gallinarū. Lepore marino assumpto prodest lac asininū bibere: sin minus, uaccinū, aut caprillum. Si toxium potum sit, uinum dulce adiuuat, oleum roseum, sanguis caprillus, semenq; napi cōtritum ex uino. Quibus fungi obsunt, dari debent raphani crudi q̄ plurimi: item uinum meracum, & cineris sarmentarū lixiuium: præterea nitrum aceto dilutum, aut sæx uini combusta, tritaq; cum aqua: aut absynthium ex aceto, aut deniq; ruta ex aceto trita, exhibetur. Si ixia fuerit ingesta, succurrit absynthium potum cum uino, castoreo, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & uomitiones ciere. Buprestis assumpto, passi plurimi potus, ac dein uomitus opitulatur: necnō lac calidum bibitum, decoctumq; ficuum in potu datum. Si cātharides haustæ sint, conducit passum ex oleo bibere, plurimumq; etiā lactis haurire, & plures nucleos pini esse: aut cantharidum alas, pedesq; cum melle detritos linctu assu-

Antidotus quæ præfagientem nominant.

Remedia ab Asclepiade scripta ad eos qui letalia biberūt

mere. Psilothro hausto, prodest calentis olei potio, & uomitio excitata: necnon lac caprillum, & maluæ coctæ succus, si cū oleo hauriatur. Spuma argenti pota, auxiliatur piper, apium, myrrha, cum uino læuigata, bibitaq; . Gypso ingesto, dari debet potui, cineris sarmentarij lixiuium, & thymus ex aquæ tritus. Lacte in grumos coacto, iuuat aceti potio. Item coagulum ex aqua fontana bibitum. Vel sulfuris, sulphuris equa lis portio, læuigata ex posca, bibitaq; . Hirudinē deuorata, alij muria, alij niuis, alij aceti potu expellere tentant. Asclepiades spongiam teneram frigida imbutam faucibus demittere iubet, ut hirudo spongiæ infixæ extrahatur. Qui cerusam hauserint, ijs confert, olei calidi potus, uomitusq; : necnon lactis asinini haustus. Quum autem ignoratur species deleteriorum quæ aut comesta, aut bibita sunt, aquam affatim calidā cum oleo propinare conuenit, ad uomitūq; incitare. Vtile etiam fuerit, & circuncidere somnum: subscriptisq; confectionibus uti. Apollonij pharmacum præseruatuum ueneni. Rutæ folia, xx. nuces iuglandes, ij. salis grumus unus, caricæ duæ. Offerantur simul ieiuno stomacho: noxam quippe à letalibus prohibent. Aliud, Baccarum iuniperi, drach. ij. lemnij sigilli, drach. ij. & obol. ij. trita exceptaq; oleo reponito. Porrigitur ex hydromelite instar auellane nucis. Hac antidoto Nicomedes Rex utebatur: si quando eorum qui inuitassent ipsum, habebat fidem suspectam. Antidotus Mithridatis, Athanasia dicta, ad letalia medicamenta, & cuiuslibet uirulenti ictum. Auxiliatur etiam uentriculo, in quo cibis acescit: necnon sanguinem spuētibus, diuturna tusi infestatis, ac breuiter iecorarijs & lienosis, uescicæq; & uteri affectibus. Piperis albi, grana. xl. costi, meu, asari, acori, dauci Cretici seminis, petroselini, nardi Indicæ, lapidis Nestoritis, sing. drach. iij. croci, myrrhæ, singul.

Antidot^o Apol
lonii a ueneno
præseruans.

Athanasia Mi
thridatia.

drach. viij. cinnamomi, cassiæ, singul. drach. xij. mellis Attici cocti, quod sit satis. Datur nucis auellanae magnitudine, ex mulso temperato. Antidotus Zopyria uocata, ad prædicta omnia, ad aliosq; affectus efficacissima. Opobalsami, drac. iij. nardi, Indici, myrrhæ Troglodyticæ, iunci rotundi floris, cinnamomi, characi, costi recentis, piperis longi, hypocisthidis, polij, piperis pereatici, scordij, meu Cretici, cardamomi, singul. drach. iij. thuris masculi, carpobalsami, dictamni, singul. drach. vj. petroselini, cassiæ rubentis, sing. drach. vij. croci Corycij, drach. viij. mellis Attici quod sit satis. Datur nucis auellanae instar, si febris abest, ex uino: febrientibus, ex hydromelite.

Antidotus Zopyria.

Mithridatis Theriace, qua Rex Mithridates utebatur perpetuo, ut se à letali ueneno assereret. Quum itaq; à Romanis captus esset, nec bis epoto ueneno mori posset, gladio sibi ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum. Pastillorum scillinorum, drach. xlviij. pastillorum theriacorum, piperis nigri, hedychroi magmatis, lachrymæ papaueris nigri, sing. drach. xxiiij. rosarum siccarum, iunci rotundi odorati floris, polij, scordij, seminis napi, iridis Illyricæ, agarici, cinnamomi, dulcis radiculae succi, opobalsami, sing. drach. xij. roris marini, drac. viij. myrrhæ, croci, zingiberis, rheupontici, quinque folij radicis, nepitæ mōtanæ, marrubij, petroselini, stœcados, costi, piperis albi, thuris, sing. drac. j. obol. ij. cassiæ nigrae, drach. iij. piperis nigri, drach. j. longi tantundem. meu, asari, acori, dauci seminis, anserini sanguinis sicci, anatis sanguinis, sing. drach. ij. Excipiantur melle Attico, & cocto.

Mithridatis Theriace, qua præmunitus, quum postea ueneno extingui nō posset, sese gladio premit.

Theriaca Aelij admodum efficax. Bryoniæ radicis drach. xvj. trifolij seminis, opopapnatis, sing. drach. viij. aristolochiæ tenuis, drach. xij. roris marini radicis, iris Illyricæ, Zingiberis, opij, singul. drach. viij. rutæ syluestris seminis, drac. xij. cum

Theriace Aelij.

ni Aethiopici, drach. xvj. myrrhæ, casfiæ, castorei, felis, eryngij radicis, serpylli, lachrymæ Cyrenaicæ, sing. drach. vj. Medicæ, drach. xij. sagapeni drach. vj. croci drach. v. erui farinæ drach. xxiiij. Finguntur pastilli ex aqua triobolares, danturq; cum uino.

Theriace. Euclidis.

Theriaca Euclidis, ad internos dolores, aspidū morfus, pleuritidesq; & quartanam febrem, si post uomitum, instar auellang nucis sumatur. Castorei drac. vj. opopanacis, sagapeni, felis, cachreos, chamedryos, chamæpityos, marrubij, sing. drach. xvj. styracis, bituminis Iudaici, myrrhæ, sing. drach. vij. lachrymæ papaueris, drach. viij. mellis lib. j. Conficito. Alia ad febres omnes repetētes per circuitus, Harpalo autore. Myrrhæ drac. iiij. piperis longi, uel albi, opij, sing. drach. ij. castorei obol. iiij. S. cardamomi, drach. iiij. sagapeni drach. ij. Trita cum aqua in pastillos cogitur, qui obolos duos pendeant. Propinentur singuli cum cyathis duobus Adriani uini, & aquæ fontanæ coctæ, quaternis. Si febris urgeat, cum hydromelite.

Morsui rabidi canis potio Cratippi.

Potio Cratippi ad morsui rabidi canis. Cancrorum ustorum, drach. xx. myrrhæ drach. ij. croci drach. j. S. gentianæ drac. j. piperis albi, grana. x. uini quod ad excipiendū sit satis. Datur drachma. j. cum uini cyathis tribus temperati.

Candidum Baphulli.

Album Emplastrum Baphulli, quod rabidorum moribus commodissimè extrinsecus admouetur: daturq; etiam catapotium ex eo nucis auellanæ instar, ad dies. xl. Est autem alternis diebus amouendum à uulnere, ac rursus, ubi elueris sordes, imponendum. Ceræ pōticæ, lib. ij. spumæ argenti, cerusæ, sing. lib. olei ueteris, sextarium. myrrhæ, medullæ ceruinæ, utriusq; drach. ij. thuris drachma. Argenti spuma oleo cogitur, & quum mutata fuerit, cerusa inspergitur, ac cera miscetur. Vbi tam spissum euaserit, ut manus non inficiat, ab igne sublato, medullā, myrrham, & thus iniicit. Diophanti medicamentum,

ad scorpionum ictus, & phalangiorum morsus. Aristolochiæ drach. iij. piperis drach. ij. opij drach. j. pyrethri drach. iij. Fingatur pastilli, fabæ Aegyptiæ magnitudine: danturq; duo deglutiendi, & uini meracicyathi duo.

Aliud ad periculosos scorpionum & phalangiorum ictus. Rutæ sylvestris seminis, erucæ seminis, pyrethri, styracis, sulfuris uiui, sing. drach. vj. castorei drach. ij. Excipito testudinis sanguine, ac ternos obolos ex meraco uino exhibeto.

Aliud ad eadem optimum, conferens etiam parturientibus ægrè, Myrrhæ, castorei, styracis, singulæ drachmæ. Opij, drach. ij. chalbani drach. iij. Apij seminis acetabulum. Anisi tantūdem. Piperis grana. xxx. Fingitur ex uino, daturq; drachma una, ex uini hemina.

Epithema ad phalangiorum ictus, & omnis serpentis: qđ etiam in potu auxiliatur. Sulfuris uiui, chalbani, utriusq; denarij. iiii. Liqueoris libyci, nucum auellandarum purgarum, sing. drac. ii. uino di. soluta, & melle excepta imponuntur.

Ad uiperarum morsus optimum pharmacum ab Apollodoro compositum. Cumini sylvestris seminis, acetabulum. testudinis marinis sanguinis drach. iiii. coaguli hinnuli, uel leporini, drach. iiii. hœdini sanguinis, drach. iiii. Omnia mista, uinoq; optimo excepta, reponito: atq; o liuæ magnitudinem, ex uini optimi cyatho dimidio, dum usus postulabit, porrigito.

Heræ antidotus, qua Marcus Cathegetes est usus. Trifolii bituminosi seminis. aristolochiæ rotundæ, rutæ sylvestris, erui insolati, sing. drach. vi. Vino excipiuntur, fiuntq; pastilli drach. iiii. daturq; unus ex uino & oleo.

Alia ad letalia, iecinorosos, inflationes uentris, & incipientes aquæ subter cutem suffusiones efficacissima. Myrrhæ drach. v. cardi Syriacæ, drach. v. S. iunci rotundi floris, drach. ii. S. casfiæ drach. iiii. cinnamomi drach. iiii. piperis albi sesquidrach. i. thuris drachma & obolus. costi drachma. Excipiuntur

Diophanis medicamentū ad scorpionum & phalangiorum ictus.

Parturientibus ægrè, medicamentū conueniēs.

Viperarū morfibus.

Apollodori pharmacum.

Attico melle, fingunturq; nucis auellanæ instar: ac dantur ex mulso uel aqua.



FINIS.



Complura alia ad eosdem affectus, ex diuersis authoribus congerit Galenus remedia. Nos uerò ex omnibus ea in tuam gratiam, Cādide Lēctor, elegimus, quæ & præstantissima uidebantur, & facilius parari possunt. Habes itaq; omnes commentarios Galeni, in compendium enchiridionq; redactos, excepto forte uno uel altero, ex quibus nihil succi exprimi potuit. Nam quod pertinet ad cōmentaria in Hippocratem, quicquid in eis continetur crēmoris (nisi fatalia decreta consiliū nostrum hoc intercipient) hoc est uniuersas sententias, instar indicis atq; alphabeti digestas, breui in lucem edemus.

Tuum igitur est, illis bene precari, qui in hoc sunt toti, ut tuis commodis seruīāt, recteq; tuis studiis consulant.

AD ORNATISSI.

MVM VIRVM, D. D. GASPAREM

de la Hoz, Canonicum Secobiensem, Scripto=
 rem Apostolicum, ac bonarum literarum
 cultorem maximum, Andreæ La=
 cunæ, Secobiensis, Militis San=
 cti Petri, de ponderibus
 & mensuris medici=
 nalibus cōmen=
 tarius.



ETVS Prouerbum, &
 q̄uerissimū est, mi Gaspar,
 Vir Ornatissime, optimam
 esse mensuram in rebus om=
 nibus: quum nimirum om=
 nia quæ in uita & sunt &
 geruntur, ab ea suam abso=
 lutionem, suam lucē, suumq;
 ornamentum sortiantur: ni=
 hilq; iustum, rectum, aut inculpabile sit, quod mensura

(quæ sola uirtus inest omnibus rebus) destituatur. Quā=
 obrem, si exquisitè expendamus singula, quæ cœlesti il=
 la mackina ambiuntur, quæq; supra cœlos consistunt,
 omnia certè inueniemus, exactam quandam mensuram,
 commodationemq; à suo conditore accepisse: quā per=
 petuò tuentur, dum naturæ leges non transgrediuntur.
 Quippe uniformes illæ orbium cœlestium lationes, pe=

sanitas

morbus

rennes astrorum cursus, ordinatæ uicissitudines temporum, conspirationes elementorum, generationes denique omnium quæ supra terram & subter illam fiunt, non aliunde quàm à symmetria quadam, quæ in accurata partium mensura consistit, proficiscuntur. Iam uerò, quod sanitas quidem corporum, aliud sit nihil, quàm debita & absoluta mensura eorum ex quibus constantur: morbus autem, ab hac symmetria recessus quidam & lapsus, quis ambigit? Nemini etiam est dubium, decreta & leges Reip. mensuras quasdam existere, quæ singulis suum ius dispensant. Vt autem ipsius mensuræ summam efficaciam & uim, exemplo familiarissimo exponam, poemata optimis documentis & sententijs exulta, si metro claudicent, hoc est, mensura non constent, confestim stomachum mouet, nauseamque & fastidium gignunt. Contra uerò, quæ symmetria existunt, etiamsi pudicitiam offendant, moresque iuuentutis corrumpant, magnifice ab omnibus celebrantur: tantum authoritatis uendicare sibi uidetur emmetron. Caterum quum in alijs omnibus humanis actionibus, si rectè perfici debeant, mensura quædam exquisita desideretur, tum uel maximè in arte Medica ea ipsa requiritur: ut in qua, uel minima à pondere ac mensura aberratio, soleat semper ægris perniciofa & piacularis existere. Nam quum generatio nostra, incolumitasque, miscellæ quatuor elementorum debeat, certa quadam mensura confluentium & conspirantium in unam eandemque temperiem: sanè si quando rhythmus huius soluatur, necessum est ad recuperandum habitum pristinum, reducamur eò, iusta etià, exploratissimaque mensura eius, quod
lapsus

lapsum corrigere possit, administrata. Qua neglecta, si quis-
 piam admoliatur præsidia corpori, morbi seminarium augebit,
 aut affectum alium maligniorem inducet: ita ut non minus ca-
 uendum à tali medico sit, q̃ à morbo ipso. Quū igitur inter alia
 Galeni opera, redegissem nuper in succinctam Periochen com-
 mentarios illos de compositione medicamentorum κατὰ γένν
 καὶ κατὰ τόπους, ditissimos naturæ humanæ thesauros: per
 suasumq; haberem, neutiq; ex eorum lectione percepturos ali-
 quid frugis, qui in ratione ponderum & mensurarum non es-
 sent adamsim exercitati: sed potius occasionem capturos, qua
 sibi ignominiae notam: ægris conciliarent summam internicio-
 nem: precium operæ me facturum existimaui, si quæ ueteribus,
 ac præcipue Galeno, circa pondera & mensuras medicinales
 conscripta sunt, aggerans, ea omnia paucis exposita, sub præfa-
 tione nominis tui, in publicam studiosorum commoditatē ade-
 rem: ut uel ex hoc argumento, amicitia nostra, & nunq̃ peritu-
 ra necessitudo, omnibus innotesceret: tibi autem, si quis hinc fru-
 ctus ab aliquo hauriendus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec
 uerò collectanea hæc de mensuris cuiq; aptius q̃ tibi nuncupari
 potuissent, qui (ut cæteras ingenuissimas tui animi dotes impræ-
 sentiarum subdiceam) diu noctuq; astronomicis studijs indulgēs,
 in eisq; foelices tuas horulas, haud oscitater collocans, nō modò
 plagas has inferiores, sed cœlos etiam ipsos metiris, menteq; su-
 pra illos eueheris: contra q̃ faciunt pleriq; alij, qui ubi semel
 quæ pertinent ad cutem curandam sunt nacti, adeò ingenuarum
 artium, bonorumq; omnium institutorum infœlices obliuiscun-
 tur, ut ne inesse quidē sibi animā recordentur: ac pinde obruti,
 demersi q; cœno suarū cupiditatum, corporisq; mole depressi,
 eam, quocunq; tandem irruat, sequantur: tātum abest ut (exem-

plo tui) cœlum unq̃ suspectent, aut in meditatione rerũ pulcher-
 rimarum asininas suas cogitationes exerceant. Hi tamen manci-
 pia umbilici sunt: à quorum ingenio tam abes ipse, q̃ qui longis-
 simè. Quippe ita uteris fortunæ bonis, quæ tuo Marte acquisi-
 ta, tibi q̃ largissimè suppetunt, ut eorũ quidem quæ ex usu sunt,
 nihil desit corpusculo, amicisq; omnia communia fiant: animus
 autem ipse, minimè ab eis præpediatur, sed ad altiora aspirans,
 excolatur atq; locupletetur alijs ornamentis & opibus, quæ
 tanto illis splendidiore & augustiores sunt, quanto mens no-
 stra corpori dignitate antecellit. Quo sanè tam admirabili amo-
 re sapientiæ accensus, & si fluctibus negotiorum nunquam non
 obruaris, quæ maxima cum dexteritate administras: semper ta-
 men philosophiæ studijs incumbis, in eisq; tam foeliciter pro-
 moues, ut Diuinum istud ingenium tuum sæpenumero admira-
 ri compellar. Ne autem huic nostro commentariolo contingat,
 quod patriæ utriusq; nostrum communi Secobiæ accidit, cuius
 quidẽ suburbia sunt ciuitate ipsa ampliora, non agam hic tecum
 pluribus: quum tēpestiuum iam sit, ut promissis satisfaciamus.

Eorum quę metiri homines solent, quædam solida, cor-
 pulēta, grauiā & sibi cōtinua sunt, ut lapis, cera, lignũ, &
 ferrũ: quædam solida quidẽ & sicca, sed dissoluta & mi-
 nutula, qualia accumulare consueuimus: ut hordeũ, oriza, &
 triticum: quædam dæmum in liquidis fluidisq; consistunt: è
 quorum numero est oleum, uinum, & mel. Quæ igitur sub
 prima differentia cōprehenduntur, grauitate dijudicantur:
 cui negotio statera est inuenta. Quæ uerò humidā consisten-
 tiam possident, uasculi cauitatē expendunt. At ea quę quum
 sint arida, aggerari in cumulũ possunt, medio genere ambi-
 gunt: modò quippe ipsa librare: modò uasculis mensurare
 consueuimus: quemadmodum liquores fluentes. Quanq̃ hi
 quoq; sæpenumero reuocātur ad staterā. Liquida q̃ppe omi-

nia quę corp̃i administrantur, uniuerſi ferē iam ponderant, ſi Hiſpanos pharmacopolas excipias. Hi nanq; non ponderē, quēadmodū in Italia, Gallia, Germania, & Anglia moſ eſt, ſed uasculi cavitare liquida medicamenta metiuntur: id quod eqdem probare ullo modo non poſſum. Nā quum ex liquoribus, hi quidē grauioreſ ſint: illi autem leuioreſ, atq; tenuiū partium: certē neceſſum eſt, dum eos omneſ ex quo pari uasculi cavitare diſpenſant, grauiſimē interdum hallucinentur, capitaliq; errore labātur. Nemini ſiquidem in ambiguo eſt, quę craſſarum ſunt partium, ea contracta & exigua mole plurimum continere ſubſtantię: ut paucillum ſub tumore laxiori, quę raram conſiſtentiam ſortiūtur. Etenim ſi accipias unam heminam olei: uini aliā: ac tertiam deniq; mellis: cōperieſ planē, oleum quidem ipſum, uncias. ix. pendere: uinum autem. x. Mel tredecim cum dimidia: ita ut hoc ad uinum ſit ſeſquiplus. Quod uerō aiunt, ſe non una eademq; meſſura, oleū, mel, atq; uinum metiri: ſed eorum li- quorum ſinguliſ habere ſuā deſtinatam: id illoſ non reddit à culpa immuneſ. Nā quum in generib; ſinguliſ non paruum diſcrimen ſit penes grauitatem & leuitatem (omphacinum enim oleum, exempli gratia, quod oliuę immature fuderūt, hyoſcyaminum uē, tenuitate partiū & leuitate, multiſ numeris ab irino relinquitur) contingit ſanē, ut dum cuiuſq; indiuidui unciam unā ſeſe adminiſtrare arbitrantur, alteriuſ quidem pluſ: alteriuſ autem longē minus exhibeant: ac ſic artiſ præcepta euertant. Deberent itaq; aut liquoreſ uniuerſoſ librare: aut ſinguliſ eorum ſpeciebuſ, meſſuram peculiarem præſcribere: quam quidem inueſtigare, eſſet nimis oſeroſi negotij.

Porrō meſſura olei erat Galeni tēpore apud Romanos cornea, pellucidaq; & lineiſ quibuſdam orbicularibuſ, quibuſ uncia diſcernerentur, inciſa. Sunt autē innumera ponderum ac meſſurarum genera, ſecundū uarietateſ regionum ac morū. Quamobrē ea deſcribemus impræſentiarū duntaxat, quę urbi Romę, antiquiſſimę totiuſ orbis Metropoli,

semp̄ fuerunt familiarissima: quū præsertim Galenus uniuersas ferè pharmacorū cōpositiones, ad mēsuras Romanorū, pondera q̄; reduxerit: cū q̄bus, ubi exposita fuerint, facillimū cuiq̄; erit, q̄ apud alias ciuitates in usu habent, cōferre.

De ponderibus.

Nomina pōderum medicinaliū, in quē medici passim incidunt, sunt, mina, libra, vncia, drachma, Scriptulus, obolus, filiqua, & granū. Romana igitur mina continet libras. xx. Nam Aegyptia, & Attica. xvj. tantū constant. Libram aut. xij. vnciæ constituunt, quarū singule ex drachmis octo conflant. Porro drachmam Galenus idē esse uult cum Romano denario: q̄uis contendat aliqui, eam esse partem septimam vnciæ. Constat aut drachma scriptulis tribus, quē à Græcis γράμματα, scrupuli à neotericis, corrupta uoce, appellatur. Quorū quisq̄ duos obolos continet: ut horum singuli, filiquas tres, quē & ceratia dicuntur. At uerò unaquēq̄; filiqua, grana quaternapendet. Reperiuntur etiā creberri- mē inter nomenclaturas ponderū, faba Græca & Aegyptia: ac præterea nux iuglans, & Pontica. E quibus Græca quidē faba, duos obolos pēdit: Aegyptia autem drach. j. S. At iuglans nux, filiquas. lxxij. ut Pontica. xvij. Quæ omnia ordine resolutorio explicata, facile ex hac tabella discernes.

Mina Aegyptia.

vnc. xvj.

Mina Romana.

vnc. xx.

Libra Romana.

vnc. xij.

Vncia.

drach. viij.

Drachma, siue denarius, siue olca.

script. iij.

Scriptulus, siue scrupulus.

obolos. ij.

Obolus

filiquas. iij.

Siliqua

grana. iiij.

Faba Græca,

obol. ij.

Faba Aegyptia

drach. j. S.

Nux iuglans.

filiquas. lxxij.

Nux Pontica.

filiquas. xvij.

Si igitur ubiq; locorum & gentium, libræ, uncia, & drachmæ, essent inter se eadē, liceret profecto nobis, iuxta Galeni dogmata, in quavis orbis plaga & regione, medicamenta citra discrimen præscribere. Quum aut euariet passim ea pondera, certè nisi quis omnia illa ad tabellā præscriptam reuocet, singulaq; adamusim expēdat, priusq; alicui, pharmacum catharticum porrigat, fieri ullo modo non potest, qn ab scopo aberret, uidelicet aut plus q̄ sit ex usu, propinans: aut minus q̄ morbus postulet. Equidem experiētia didici Hispanicam uncia Romana esse obolis duobus maiorem. Parisiensem, ferè integra drachma. Coloniensis, Bruxellensis, atq; Antuerpiensis uncia, sunt similes: quarū singulæ Romanani tribus obolis superant. Ab hac, uncia Veneta (quā experiundi gratia, nuper in officina quadā libraui) propemodū sesquidrachma relinquitur. Siquidem Veneta libra medicinalis Romanæ libræ uncias. x. cum dimidia, plus minus, pendet. Pro ratione itaq; harum differentiarum possem ipse iam in singulis horum locorum, numerum drachmarū intrepidè & augere, & detrahare: id quod mihi non perinde liceret absq; summa egrotantium clade, si proportionem ponderum quā habent inter se mutuo, accuratè prius non explorassem. Quam quum haberem per spectam, cuidam adolescenti, quem in ædibus Illustrissimi D.D. Ioannis à Mendoza, Cæsariei apud Venetos Oratoris Splendidiss. suscepi curandum, unciam unam soluentis pharmaci exhibui: cuius in urbe Roma propinare drach. vii. ausus non fuissē.

De notis ponderum quibus Medici in officinis utuntur.

VT autem Græcorum characteres, quibus pondera expriment, in præsentiarū præteream, ceu nihil ad nos pertinentes: Medici recentiores pro uncia, hanc notam. ℥ . usurpant: quemadmodū hanc, ℥ . pro drachma: similiterq; illam. ℥ . pro scriptulo: subdentes postea numerū quem expēdire arbitrantur. Ut si ori uentriculi confirmando huiusce modi unguen instituerimus. ℞ olei absinthij, & cydonio

rum, anā 3. ij. Nardini, vnc. S. ceræ elotæ, drach. v. pulu. corallij, & mentæ, anā 3. j. perinde sonāt ac si scribamus. Olei absinthij & cydoniorum, singulorū vnc. ij. Nardini unciā dimidiam. ceræ elotæ drach. v. pulueris corallij & mentæ, singulorum scriptulum unū &c. Quippe uox (anā) quæ aliquando etiam in Galeni cōmentarijs occurrit, cuiusq; ptes equas significat. Præstaret autem medicamenta ipsa, quæ in se humani generis uitam, necemq; gerunt, minimè quidem notis aut numericis, sed literis extensis exprimere. Qñquidem iota unum sublatum aut additū, imò uerò ēt apiculus unus, sæpe ægros ipsos in exitium atq; internicionem adegit. Porro ut flores solent dispensari pugillis, sic manipulis herbæ. Cōmuniter autem uolunt esse pugillum, q̄tum tribus digitis apprehēdi possit: manipulum uerò, q̄tum tota manu. Ac pugillum quidem, hac nota P. manipulum autem, hac. M. nostri Medici exprimunt.

Græcæ liquidorum mensuræ (quæ maximè sunt in usu etiam apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex cōmentarijs Iacobi Syluij, Medici hac nostra ætate Clarissimi, excerptæ.

CADVS, siue Ceraunium, capit choas, hoc est Romanos congios. xij. uel libras mensurales. cvij.

CHOA, siue Congius, sextarios sex capit, seu Atticas cotylas. xij. seu libras. ix.

SEXTARIVS cotylas. ij. seu libram unā & dimidiam, seu cyathos. xij. continet.

COTYLA, quam nonnulli heminam appellant, quartarios. ij. seu uncias mensurales. ix.

SEMICOTYLA recipit acetabula. ij. uel uncias. iij. cum dimidia, existens quarta sextarij pars.

ACETABVLVM (Græci οἶζυ βαφον uocant) sesquicyathum, seu uncias. ij. & drach. ij. pendet.

CYATHVS conchas. ij. seu mystra. iij. seu chemas. v. seu cochlearia. x. seu fescunciam.

CONCHA mystra. ij. seu chemas. ij. cū dimidia, seu drac. vj.

MYSTRVM chemē unam, & quartam eius partem, seu cochlearia.ij. cum dimidio, seu drach.iiij.

CHEME cochlearia.ij. seu drach.ij. script. j. & grana.iiij. & quatuor quintas grani.

COCHLEARIVM, drachmam. j. scriptulū dimidium, grana.ij. & duas quintas grani.

Porro uinum nona parte pōdus olei excedit. Mellis autem ad uinum proportio est sesquipla: hoc est tertia parte mel ipso uino est grauius, ut liquet ex tabella subdita.

Ceraunium Ita- licum habet	} }	Olei lib. xc.	Vini lib. c.	Mellis lib. cl.
Congius		lib. viij. & semissem.	lib. viij. vnc. iiij.	lib. xij. & semissem.
Sextarius,		vnc. xv.	vnc. xvj. drach. v. script. j.	lib. ij. vn- cia. j.
Cotyla		vnc. viij. drac. iiij.	vnc. viij. drach. ij. script. ij.	libra. j. drach. iiij.
Oxybaphum		fescunciam drach. ij.	vncias. ij. script. ij.	vnc. ij. drach. j.
Cyathus		drach. x.	vncia. j. drach. ij. siliquas. iiij.	vnc. ij. script. ij.

Mensuræ aridorum quibus Medici maximè utuntur.

MEDIMNVS capit choenicas. xlviij.

CHOENIX cotylas. iiij. uel sesquiseptarium, seu libras. ij. & quadrantem. j. & vnc. iiij.

SEXTARIVS cotylas. ij. seu vnc. xiiij.

COTYLE oxybapha. iiij. seu vnc. ix.

OXYBAPHVM, sexquicyathum, seu vnc. ij. & drach. ij.

CYATHVS cochlearia. x. seu fescunciam.

COCHLEARIVM drach.j. script.S. grana.ij. & duas quintas grani.

Crebro autē usurpat Galenus hanc uocem Besslem: quæ quotiescunq; occurrerit, pro vncijs octo accipiat.

Hæc sunt itaq; Vir Ornatisime, quæ sub tuo nomine uoluit omnibus fierent communia studiosis: quare pro tua feceris dignitate, si ea contra uiligatorum morsus defenderis. Vale feliciter, plurimumq; saluta meo nomine communes utriq; nostrum amicos, atq; integerrimos Viros, D. Berrocalem, Scriptorem Apostolicum: necnon. D. Falconæum à Gueuara, Iuris prudentiæ licentiatum absolutissimum.

Venetijs. iij. Idus Aprilis. M. D. XLVIII.

SERIES CHARACTERVM.


Aaaa Bbbb Cccc Dddd Eeee Ffff Gggg
Hhhh Iiii Kkkk Llll Mmmm Nnnn Oooo
Pppp Qqqq Rrrr Ssss Tttt Vuuu Xxxx
Yyyy Zzzz.

AAaa BBbb CCcc DDdd EEee FFff
GGgg HHhh.

Omnes sunt quaterni, præter HHhh, qui est duernus.

V E N E T I I S

Apud Hieronymum Scotum.



COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

R

126

G29 L2

v.4

RARE BOOKS DEPARTMENT

